

# كاندور 8، 16

## أقراص

التركيز:

- كل قرص من كاندور 8 يحتوي على: كانديسارتان سيليكتينيل 8 ملغم.
  - كل قرص من كاندور 16 يحتوي على: كانديسارتان سيليكتينيل 16 ملغم.
- للمائمة المغادرة الفعالة، الرجاء أخذ الفقرة 6 - "معلومات إضافية".
- اقرأ النشرة حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.
- حافظ على هذه النشرة من المازن أن تتحاجها ثانية.
- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
- وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن جالتهم الجبلية مشخصة لحالتك.
- الدواء مخصوص لكيار فوق عمر 18 سنة.

### (1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لمعالجة إرتفاع ضغط الدم ولمعالجة قصور القلب.

#### الفصيلة العلاجية:

- كنت تتناول إحدى الأدوية التالية التي تستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم:
  - مثبطات الإنزيم ACE (مثلـ إنانابيريل، ليسينوبيريل ورامابيريل) خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل كلوية تتعلق بمرض السكري.
  - الأيسكيرين، aliskiren.
  - إذا كنت معالجاً بأدوية من فصيلة مثبطات الإنزيم ACE سوية مع أدوية لعلاج فشل القلب التي تعرف بمضادات مستقبل القشرانية المعدنية (MRAs).
  - في هذه الحالة من الجائز أن يضطر الطبيب لشخص ومراقبة القيم التالية - الأداء الوظيفي الكلوي، ضغط الدم ونسبة الشوارد الكهربائية (مثلاً البيوتاسيوم) في الدم بتفاصيل زمنية محددة.
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى:
  - إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإنضافات غذائية، إحدى الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
  - لا يجوز استعمال كاندور إذا كنت تتناول دواء لتخفيف ضغط الدم يحتوي على أيسكيرين، aliskiren.
  - لا يجوز استعمال كاندور إذا كنت تتناول دواء لتخفيف ضغط الدم يحتوي على أيسكيرين.
- يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول:
  - أدوية أخرى لتخفيف ضغط الدم - بما في ذلك المدرات البولية، حاجيات بيتا، ديازوكسيد، مثبطات الإنزيم ACE مثل إنانابيريل، كابتيوبيريل، ليسينوبيريل ورامابيريل.
  - أدوية مدرة للبول (Diuretics). اطرح السوائل من الجسم.
  - إذا كنت تتناول بأدوية من فصيلة مثبطات الإنزيم ACE سوية مع أدوية لعلاج فشل القلب التي تعرف بمضادات مستقبل القشرانية المعدنية (MRAs) مثلـ سبيرونولاكتون، إلابيرينون.
  - مستحضرات تستعملها دون وصفة طبية.
  - مزيج لدوائين لعلاج تلوث جنثومي - تريميتوبريم وسلفامونيتوكسازول (مثل ديسبريم).
  - أدوية مضادة للالتهابات استيرويدية (NSAIDs) (المستعملة أيضاً لتسكين الألم مثل إيبوبروفن، نابروكسين، ديكوكفيدين، أسيبدين) (إذا كنت تتناول أكثر من 3 غرام في اليوم) أو تريوكسيبيت، وسليلوكوكسيبيت.
  - مدربات بوالية حافظة للبيوتاسيوم، إضافات البيوتاسيوم، بدائل الملح الحاوية بيوتاسيوم أو أدوية أخرى التي قد ترفع من نسبة البيوتاسيوم.
  - هيلبرين - دواء يستعمل لتنقية الدم.
  - ليثيوم (دواه يستعمل للعلاج في المشاكل النفسية).

#### استعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

#### استعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

يجب التحدث مع الطبيب حول عادات استهلاك الكحول لديك. بعض الأشخاص الذين يتناولون كاندور قد يشعرون بدور وضعف عند إستهلاكه للکحول.

#### الحمل والإرضاخ:

- عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعقدنين بذلك حامل أو تحظين للحمل. غالباً يوصي الطبيب بالتوقف عن استعمال كاندور وإنطلاق إلى استعمال دواء آخر قبل الحصول على حمل أو مباشرةً بعد إكتشاف حصول حمل. لا يوصى بإستعمال كاندور في بداية الحمل ويمنع استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للجنين إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.
- إذا كنت في فترة الرضاعة أو تحظين للرضاع الرواجي إعلام الطبيب. توصي الأمهات المرضات بعد إستعمال كاندور خلال فترة الرضاعة خاصة لدى حديثي الولادة والخدج. إذا رغبت في الإرضاخ فمن الممكن أن يوصي الطبيب بعلاج بديل.

#### السياسة واستعمال الماكولات:

قد يسبب هذا الدواء الدوار أو الإرهاق لأشخاص معينين.

تجنب سيادة المركبات، تشغيل الماكولات الخطرة وأي نشاط يقتضي اليقظة وذلك إذا شعرت بذلك الأعراض.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

الأعراض تحوى لكتور الذي يعتبر نوع من السكر. إنما قيل لك من قبل الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل

لسكريات معينة، إستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

#### لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت في فترة الحمل بعد الشهر الثالث (يُفضل أيضًا الامتناع عن إستعمال الدواء في بداية الحمل، لمعلومات إضافية انظر فقرة "الحمل والإرضاخ أدناه").
- علم بوجود سلسية إمامية الغاعلة - كانديسارتان سيليكتينيل أو لأحد مركبات الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية أدناه").
- كنت تعاني من خلل خلقي في وظائف الكبد أو من إنسداد في الطرق الصفراوية.
- كنت تتناول دواء لتخفيف ضغط الدم يحتوي على أيسكيرين، aliskiren.
- كنت تتناول دواء لتخفيف ضغط الدم يحتوي على أيسكيرين، aliskiren.
- كنت تعاني من مرض يسمى بمتلازمة كونس (Conn's syndrome)، إذا وجده لديك مشكلة في وظيفة الكلى.

#### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال كاندور:

- قبل العلاج بـ كاندور، إحدى الطبيب إذا:
  - كنت تعاني في الماضي من خلل في وظيفة القلب، الكبد، الكلية أو تضخم للعلاح بالدببة.
  - كنت تعاني في الماضي من اسهالات ونفقوات أو عاليت موكراً من تقويات شديدة، إذا كنت تعاني من مرض يسمى بمتلازمة كونس (Conn's syndrome)، إذا وجده لديك مرض دم متعدد، إذا عانيت في الماضي من مسكنة.
  - عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعقدنين بذلك حامل أو تحظين للحمل. لا يوصى بإستعمال كاندور في بداية الحمل ومنع استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للجنين (معلومات إضافية انظر فقرة "الحمل والإرضاخ").
  - كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية. يجب إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول كاندور.
  - كنت حساساً لأي طعام أو أي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

### 3. كيفية إستعمال الدواء

- يجب الإستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب. على الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا.
  - الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
  - لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
  - الدواء مخصوص للكبار الذين تجاوزوا عمر 18 سنة.
  - ارشادات الاستعمال:
    - إذا اقتضت الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات حول سحق أو ضغط الفرسن.
    - يجب بلع الدواء مع الماء.
    - بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.
    - يوصى بتناول الأقراص كل يوم في نفس الوقت (في الصباح مثلًا).
    - إذا نسيت تناول هذا الدواء في وقت المحدد، فيجب تناول الجرعة التالية كالمعتاد، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين معاً!
    - إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل الخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وإرشاره عليه الدواء ممك.
    - على إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حاليك الصحية.
    - لا يجوز تناول الأدوية في الغعمته يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تناول فيها دواء، وضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
    - إذا توقف لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.
- الجرعة الدوائية الإعتمادية في حال عدم توفر تعليمات أخرى من الطبيب:**

#### لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

- الجرعة الدوائية الإعتمادية هي 8 ملء في اليوم. بإمكان الطبيب رفع الجرعة الدوائية حتى جرعة دوائية إجمالية قدرها 16 ملء لليوم. من الجائز أن يوصي الطبيب بإستعمال جرعة دوائية إعتمادية أكثر إنخفاضاً وذلك لإبعاد المرضي الذي يعانون من مشاكل في الكلى، الكبد أو أقراص في الفترة الأخيرة سوا (متلازمة قيود وآسيا) التي تتطلب إستعمال مدرات بولية. من الجائز أن يستجيب بعض المرضى بشكل أقل للدواء عندما يعطيه علاج واحد. إذاً من الجائز أن يتحاج هؤلاء المرضى لجرعة دوائية أعلى.
- لعلاج قصور القلب:**

- الجرعة الدوائية الإعتمادية الإعتمادية هي 2 ملء مرتين في اليوم. بإمكان الطبيب رفع الجرعة الدوائية بمضاعفتها كل أسبوعين حتى جرعة دوائية إجمالية قدرها 32 ملء لل يوم.

### 4. الأعراض الجانبية

- كما بكل دواء، إن إستعمال كاندور قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض التي تقتضي الاهتمام خاصةً (أدار)

#### الأعراض التي تقتضي الاهتمام خاصةً (أدار)

- يحب التوقف عن تناول الدواء، تتفاقق أو لا تتفاقق في تناوله في الواقع، الشفتين، اللسان والحنجرة.
  - صعوبات في التنفس، تتفاقق أو لا تتفاقق في تناوله في الواقع، الشفتين، اللسان والحنجرة.
  - إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة، التي قد تسبب صعوبات في البلع.
  - حكة شديدة في الجلد تترافق بحوميات باردة.
  - قد يسبب كاندور إنخفاضاً في نسبة خلايا الدم البيضاء، نتيجة لذلك قد تكون لديك مقاومة أقل للتلورات ومن الجائز أن تشعر بارهاق، التهابات أو سخونة في هذه الحالة عليك الاتصال حالاً بالطبيب لإجراء فحوصات دم (للتبيح حدوث عرض نقص الكريات المحببة).
  - في أي حالة شعورك بأعراض جانبية لم تذكر في هذه التشرفة، أو إذا طرأ تغير على شعورك العام، عليك إشتارة الطبيب حالاً.
- أعراض جانبية شائعة، تظهر في أوقات متقاربة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين 10):**

- الشعور بدوار
- صداع
- تلوث في الطرق التنفسية
- ضغط مد منخفض قد يسبب دوار وإنفاس)
- تغيرات في خصوص الدم، إرتفاع نسب البوتاسيوم في الدم، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية أو من قصور القلب، إذا كان ذلك شديداً، من الجائز أن تشعر بارهاق، ضغط عام، إضطرابات في نظم القلب، والشعور بـ "إيد ودبابيس"
- مشاكل في وظائف الكلية، وفي أحياناً مادة أكثر، فمثل كلوبي

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعداده في تشرين الأول 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة.