

القوس 50 ملخ أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على: Vildagliptin 50 mg
فليداجلبيتين 50 ملخ

المواد غير الفعالة: أنتن الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

إنها النشرة تتعذر حتى نهائتها قبل استعمال الدواء. إن توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
فلا يجوز تناول الدواء و يجب التحدث مع الطبيب.
لا يجوز إستعمال جالقوس إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟
جالقوس بياردة عن دواء يتم تناوله عن طريق الفم، مخصص للمساعدة على

ضبط نسبة السكر في الدم
جالقوس مخصوص كإضافة للحمبة الغذائية والنشاط البدني لدى مرضى يعانون من سكري من نوع 2 غير المضطرب.

يصف طبيب جالقوس بمفرده أو معاً كدوية مبنية إضافية للسكرى التي تتناولها حالياً، وذلك إذا لم يثبت بأنها تاجحة بشكل كافٍ كملاءة لموازنة السكرى.
جالقوس يمكن أن يعطى كإضافة للحمبة الغذائية والنشاط البدني عندما لا تكون كافية للموازنة، وذلك في الحالات التالية:
• جالقوس كإضافة علاج

• إضافة دواء يحتوي على ميتغورمين أو سولفونيل يوريا
• إضافة ثالث لمريض تناوله منزجاً من ميتغورمين وسولفونيل يوريا

• إضافة دواء يحتوي على ثيازوليدينوبينون
يتطور السكرى من نوع 2 عندما لا ينجز التبتكرياس ما يمكنه أن ينجزه
جلوكاجون أكثر مما ينبغي.

يساعد الإنسولين على خفض نسبة السكر في الدم، خاصة بعد جيجات الطعام، يحفز في الدم، يفتح التبتكرياس المادتين جلوكاجون وإنسولين، يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر

الجلوكاجون على إنتاج السكر عن طريق الكبد، ويؤدي إلى انخفاض جالقوس إلى أن ينجز التبتكرياس المزيد من الإنسولين وإلى خفض إنتاج الجلوكاجون.
وبذلك يساعد على موازنة نسبة السكر في الدم.

أثبت بأن الدواء خافض لنسب السكر في الدم، الأمر الذي يمكن أن يساعدك على منع مضاعفات السكري.

من المهم أن تواصل إيتاكي للحمبة الغذائية الخاصة بك / أو النشاط البدني الموصى بهما من أجل ذلك وذلك بالرغم من أنه تبدأ حالياً علاجاً دوائياً لمرض السكري.

الفصيلة العلاجية:

أدوية تستعمل لعلاج السكري: مثبطات الإنزيم ديبتيديل بيتيبار - 4 (DPP-4).

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicي) لـ vildagliptin أو أحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا كنت تعقد بذلك قد تكون حساساً - لكل واحد من مركبات الدواء چالقوس، فلا يجوز تناول الدواء و يجب التحدث مع الطبيب.
- لا يجوز إستعمال جالقوس إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ جالقوس، إحدى الطبيب إذا:

- وجد لديك سكري من نوع 1 (حالة ينبع فيها الجسم إنسولين)، أو إذا كنت تعاني من الحمبة الكيتوسي السكري (diabetic ketoacidosis)، فهذا يضرهم حتى ولو بـ جالقوس.
- كنت تتناول دواء لعلاج السكري من فصيلة الـ سولفونيل يوريا (من الجائز أن يرغب طبيبك في خفض المقادير الدوائية للدواء الحاجي على سولفونيل يوريا عندما يعطي سوية مع جالقوس بهدف من إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم) (hypoglycemia).
- وجد لديك مرض كولي متعدد أو خطير (ستحتاج إلى تناول مقداراً دوائياً مختلفاً من جالقوس).
- كنت تجتاز علاج غسيل الكلي.
- كنت تعاني من مرض كيدي.
- كنت تعاني من قصور قلب.
- وجد لديك مرض في التبتكرياس.

إن اضطررت في الماضي إلى التوقف عن تناول دواء يحتوي على vildagliptin جراء مشكلات في الكبد، لا يجوز معاودة إستعمال الدواء.
إن الآفات الجلدية من المضاعفات الشائعة لمرض السكري. يوصى باتباع توصيات الطبيب أو الممرضة المفاظ على الجلد والقدمين. كما أنه من الموصى به انتباه بشكل خاص لتشكل حويصلات أو تقرحات جديدة خلال فترة تناول جالقوس.
في حال حدوثها، عليك استشارة الطبيب فوراً.

الأطفال والمراهقون:

لا يوصى بإستعمال جالقوس لدى أطفال و مراهقين حتى عمر 18 سنة.

المحظوظ والمتغيبة:

قبل العلاج بـ جالقوس ستجتاز فحص وظائف الكبد. خلال سنة العلاج الأولى ستجتاز فحص وظائف الكبد كل 3 أشهر وألاقاً الخضوع لفحص دوري، وذلك لإتاحة الكشف المبكر قدر الإمكان لعلامات زيادة إنzymات الكبد.

التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأشخاص إذا كنت تستعمل:

- تيابازيدات أو مدرات بول أخرى
- كوتريكتوسينورينات (عادة تستعمل لعلاج الالتهاب) (DPP-4-4).

أدوية معينة تؤثر على الجهاز العصبي

استعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول جالقوس مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتمدين بذلك حامل أو تحظين للحمل، واستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

لا تستعمل جالقوس خلال فترة الحمل. لا يُعرف فيما إذا كان جالقوس ينفع إلى حين الأأم. لا تستعمل جالقوس إذا كنت معرضة أو تحظين للإرضاع.

السياسة وأستعمال الماكولات:

عليك الامتناع عن السياقة وعن تشغيل الماكولات، إذا شعرت بدوران خلال تناول جالقوس.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي جالقوس على الكتونز (سكر الحليب). يحتوى كل قرص على 47.82 ملخ الكتونز.

توجه للطبيب قبل تناول الدواء، إذا قيل لك من قبل الطبيب، بأن لديك عدم تحمل لسكريات مغيبة.

جالقوس يحتوى على الصوديوم، يحتوى هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ) في القرص، لذلك يعتبر خالياً من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال حسب تعلميات الطبيب.

بإمكان الطبيب رفع أو خفض المقادير الدوائية من الدواء وذلك وفقاً لاستجابتك للعلاج.

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج - جالقوس.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددهما من قبل الطبيب فقط.

المقادير الدوائية الاعتيادي عادة من جالقوس هو عادة 50 أو 100 ملخ في اليوم.

إذا كنت تتناول جالقوس بمفرده، فإن المقدار الدوائي الاعتيادي هو 50 ملخ في اليوم الذي يتم تناوله بجرعة دوائية واحدة في الصباح، أو 100 ملخ في اليوم الذي يتم تناوله بجرعة دوائية قدرها 50 ملخ في الصباح - و 50 ملخ في المساء.

إذا كنت تتناول جالقوس بمشاركة دواء إضافي يحتوى على سولفونيل يوريا، فإن المقدار الدوائي الاعتيادي هو 50 ملخ في اليوم الذي يتم تناوله بجرعة واحدة في الصباح

التلقيح عن أعراض جانبية

بالممكان التلقيح عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تلقيح عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النسخة المنشورة على الرابط: أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عنتناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا سحب التقويم بدون تعليمات من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين:

يجب التخزين دون 30 درجة مئوية. يجب الحماية من الرطوبة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, Lactose anhydrous, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص بلون أبيض حتى أصفر فاتح، مستدير، ذو سطح مسطوح وأطراف مائلة. ختم على جانب واحد "NVR" وعلى الجانب الثاني "FB". حجم العلبة: 56 قرص.

صاحب الامتياز والمستورد وعنوانه: بوفاريس إسرائيل. م.ض.، ص.ب. 7126، تل - أبيب.

تم إعادتها في كانون الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة: رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 139 87 31692

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكورة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

التشخيص عن أعراض جانبية

- مرض كبد (hepatitis) (نادر): الأعراض تشمل إصفرار الجلد والعينين، غثيان، فقدان الشهية للطعام، بول داكن، أعراض التي تدل على أمراض في الكبد (بركان).
- التهاب البنكرياس (pancreatitis) (شائع غير معروفة): الأعراض تشمل آلام حاد ومستمر في منطقة البطن الذي قد يرتد إلى الظهر وكذلك غثيان وقيءات.

أعراض جانبية أخرى:

- أعراض جانبية شائعة (أعراض ظهرت لدى حتى مستعمل 1 من بين 10):
 - إرتجاف: صداع: دوار؛ غثيان: إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم.
 - أعراض جانبية غير شائعة (أعراض ظهرت لدى حتى مستعمل 1 من بين 100): إرهاق.
- أعراض جانبية محتملة خلال فترة تناول جالفلوس وسولفونيل يوريا:
 - أعراض جانبية شائعة: إرتجاف: صداع: دوار؛ ضفت: إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم.
 - أعراض جانبية غير شائعة: إمساك.
 - أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض ظهرت لدى حتى مستعمل 1 من بين 10,000): آلم في الحنجرة: رعش.

- أعراض جانبية محتملة خلال تناول جالفلوس وصليازون:
 - أعراض جانبية شائعة: زيادة في الوزن: إنخفاض راحتي البدين، الكاحلين أو القدمين (وذمة).
 - أعراض جانبية غير شائعة: صداع: ضفت: إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم.
 - أعراض جانبية محتملة خلال فترة تناول جالفلوس بمقدار:
 - أعراض جانبية شائعة: دوار.
 - أعراض جانبية غير شائعة: صداع: إمساك: إنخفاض راحتي البدين، الكاحلين، أو القدمين (وذمة): آلم في المفاصل: إنخفاض نسبة السكر في الدم.
 - أعراض جانبية نادرة جداً: آلام في الحنجرة: رعش: سخونة.
- أعراض جانبية محتملة خلال فترة تناول جالفلوس، ميتوفورمين وسولفونيل يوريا:
 - أعراض جانبية شائعة: دوار؛ إرتجاف: ضفت: إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم؛ تزايد التعرق.

- أعراض جانبية محتملة خلال فترة تناول جالفلوس وإيسولين (مع أو بدون ميتوفورمين):
 - أعراض جانبية شائعة: صداع: قشعريرة؛ غثيان: إنخفاض نسبة الجلوكوز في الدم؛ حرقة.

- أعراض جانبية غير شائعة: إسهال: إنخفاض (غازات في الجهاز الهضمي).
 - منذ أن سوق المنتج، بلغ من الأعراض الجانبية التالية بشدة غير معروفة (لا يمكن التقدير من المعطيات المتوفرة): فحص حال: إنفاب البنكرياسي: نقشرات موضعية في الجلد أو حويصلات: الآم عضليه.

- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

• إذا كنت تتناول جالفلوس بمشاركة دواء إضافي يحتوي على ميتوفورمين أو كلبيازون، بمشاركة ميتوفورمين وسولفونيل يوريا، أو مع إنسولين (مع/بدون ميتوفورمين)، فإن المقدار الواعي الاعتيادي هو 100 ملг في اليوم الذي يتم تناوله بجرعة واحدة قبل داره 50 ملг في الصباح - 50 ملг في المساء لا يجوز تجاوز المقدار الواعي الموصى به.

فترة العلاج -

- يجب تناول جالفلوس كل يوم لطاوله أو أوصاف الطبيب بذلك. قد يكون العلاج مطلوباً.
- فحص الطبيب بذلك بشكل دائم وذلك للتتأكد من أن العلاج يؤثر بالشكل المطلوب.

طريقة التناول -

- لا يجوز المضمضة يجب بلع القرص بشكله الكامل مع كأس من الماء.
- بالممكان تناول جالفلوس مع أو بدون طعام.

إذا أوصاك الطبيب بتناول الدواء مرة واحدة في اليوم - فيجب تناوله في الصباح. إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك التوجه فوراً لطبيبك. إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء، يجب تناول جرعة دوائية حال تذكر ذلك.

- يجب تناول الدواء الواعية التالية في الموعد المحدد الموصى، لكن، إذا حان تقريباً موعد الجرعة الواعية التالية، فيجب تقويف المرة السابقة. لا يجب تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً، يجب استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

- لا تتوقف عن تناول جالفلوس إلا إذا أخبر الطبيب بفعل ذلك.
- توجه لطبيبك إذا توقف لديك أستالة بخصوص مدة العلاج بالدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الواعي في كل مرة تناول فيها دواء. وضع النظارات الطبية إذا نزم الأمر ذلك.

إذا توقفت لديك أستالة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

- كما بكل دواء، إن استعمال جالفلوس قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.
- لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه فوراً للطبيب إذا وجد لديك عرض أو أكثر من الأعراض التالية:

- و دمة وعانية (نادر): عرض الذي يؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 1,000):
 - الأعراض تشمل إنفاس، الوجه، اللسان أو الحنجرة، صعوبة في البلع، صعوبات في التنفس، ظهور مفاجئ لطفح أو شرى (أعراض تدل على رد فعل تحسسي شديد ونادر يسمى "وذمة وعانية")