



מרץ 2021

רופא/ה נכבד/ה

רוקח/ת נכבד/ת

חברת תרו מבקשת להודיעכם כי העלון לרופא והעלון לצרכן עבור התכשיר מרוקן (MEROKEN) התעדכנו.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים. תוספות סומנו בצבע **אדום**.
 העלונים המעודכנים נשלחו למשרד הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
www.health.gov.il וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום:
 תרו תעשיה רוקחית בע"מ, רחוב הקיטור 14, ת.ד. 10347 מפרץ חיפה 2624761.

בברכה,

מרינה גולדמן

רוקחת ממונה

מרוקן®

אבקה להכנת תמיסה בטעם לימון

הרכב:

כל בקבוק מכיל:

Polyethylene glycol 3350	315.0 g	315.0 גר'	פוליאיתילן גליקול 3350
Sodium chloride	8.424 g	8.424 גר'	סודיום כלוריד
Sodium bicarbonate	4.284 g	4.284 גר'	סודיום ביקרבונט
Potassium chloride	1.118 g	1.118 גר'	פוטסיום כלוריד

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

Bowel cleansing prior to colonoscopy and barium enema x-ray examinations.

תרו תעשיה רוקחית בע"מ

הקיטור 14,

ת.ד. 10347, מפרץ חיפה 2624761

טל: 04-8475700

פקס: 04-8727165

...

2.2 Administration Instructions Prior to Dosage

...

It is essential not to eat two hours before drinking the solution and until the examination is completed.

Only drink clear fluids:

- On the day before the examination
- When drinking the solution
- After finishing drinking the solution **until 2 hours before the colonoscopy**

...

2.3 Dosage

The following is the recommended dose of reconstituted Meroken solution for adults. **Instruct patients they may consume water or clear liquids during the bowel preparation and after completion of the bowel preparation up until 2 hours before the time of the colonoscopy.**

The solution is more palatable if chilled prior to administration.

...

להלן העדכונים בעלון לצרכן:

...

2. לפני שימוש בתרופה

...

שימוש בתרופה ומזון

רצוי לא לאכול מזון מוצק ביום שלפני הבדיקה וכן 3-4 שעות לפני שתיית התמיסה. הכרחי שלא לאכול שעתיים לפני שתיית התמיסה ועד סיום הבדיקה. יש לשתות רק נוזלים צלולים:

- ביום שלפני הבדיקה
- במהלך שתיית התמיסה
- לאחר סיום שתיית התמיסה **ועד שעתיים לפני הבדיקה**

...

3. כיצד תשתמש בתרופה?

...

רצוי לא לאכול מזון מוצק ביום שלפני הבדיקה וכן 3-4 שעות לפני שתיית התמיסה. הכרחי שלא לאכול שעתיים לפני שתיית התמיסה ועד סיום הבדיקה. יש לשתות רק נוזלים צלולים:

- ביום שלפני הבדיקה
- במהלך שתיית התמיסה
- לאחר סיום שתיית התמיסה **ועד שעתיים לפני הבדיקה**

...