

إكسيلون لصقة 5**إكسيلون لصقة 10****إكسيلون لصقة 15**

لصقة جلدية لإعطاء الدواء عبر الجلد

المادة الفعالة:

تحتوي كل لصقة على:

إكسيلون لصقة 5: لصقة بقياس 5 سم² للإعطاء عبر الجلد تحوي 9 ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة تحرير الدواء هي: 4.6 ملغ خلال 24 ساعة.إكسيلون لصقة 10: لصقة بقياس 10 سم² للإعطاء عبر الجلد تحوي 18 ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة تحرير الدواء هي: 9.5 ملغ خلال 24 ساعة.إكسيلون لصقة 15: لصقة بقياس 15 سم² للإعطاء عبر الجلد تحوي 27 ملغ ريفاستيجمين (Rivastigmine). وتيرة تحرير الدواء هي: 13.3 ملغ خلال 24 ساعة.

المواد غير الفعالة:

أنظر الفقرة 6 'معلومات إضافية'.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إكسيلون لصقة 5 وإكسيلون لصقة 10: لعلاج مشاكل الذاكرة - الخرف (dementia) الخفيفة حتى المتوسطة من نوع الأزهايمير.

إكسيلون لصقة 15: لعلاج مشاكل الذاكرة - الخرف (dementia) من نوع الأزهايمير. تم إثبات النجاعة لدى مرضى يعانون من مرض الأزهايمير خفيف، متوسط وخطير.

يتنمي ريفاستيجمين لمجموعة المواد المسماة مثبطة كولين إستيراز، لدى متعالجين لديهم خرف (dementia) ناجم عن مرض الأزهايمير، تتواءم خلايا العصبية معينة في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى نسب مخفضة للناقل العصبي (neurotransmitter) أسيتيل كولين (Acetylcholine)، مادة تسمح للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض. يعمل ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات المفحة للأسيتيل كولين: أسيتيل كولين إستيراز وبوتييريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، يتبع إكسيلون ارتفاع نسب الأسيتيل كولين في الدماغ، ويساعد في تقليل أعراض مرض الأزهايمير.

إكسيلون مخصص لعلاج المرضى الكبار الذين يعانون من خرف طفيف، متوسط وخطير، مرض متقدم (progressive) لإضطراب في الدماغ الذي يؤثر بالتدريج على الذاكرة، القدرة العقلية والسلوك.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطة الإنزيم كولين إستيراز (anticholinesterases)

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة ريفاستيجمين أو لك واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المفصلة في الفقرة 6 'معلومات إضافية'.

• حدث لديك ذات مرتدة فعالة تحسسي للدواء من نوع مشابه (مشتقات الكربامات) رد فعل جلدي الذي ينتشر بما يتجاوز حجم الصدقة، إذا حدث

رد فعل موضعي قوي (مثل حويصلات، تزايد إنتفاخ الجلد، انتفاخ) وإذا لم يتحسن هذا الوضع خلال 48 ساعة بعد إزالة الصدقة

إذا كانت هذه الحالات تتطابق عليك، يجب إبلاغ الطبيب ولا يجوز إستعمال إكسيلون أصنافات.

تعديلات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إكسيلون لصقة، إحك للطبيب إذا:

• وجد لديك، أو كان لديك في الماضي نقص غير منتظم أو بطيء

• وجدت لديك، أو كانت لديك في الماضي قرحة معدية نشطة

• وجدت لديك، أو كانت لديك في الماضي صعوبات في التبول

• وجدت لديك، أو كان لديك في الماضي إختلاجات

• كنت تعاني من إرتجاف

• كان وزن جسمك منخفضاً

من الجائز أن يلائم لك الطبيب المقدار الدوائي أثناء العلاج ليتناسب مع احتياجاته الشخصية.

في حالة عدم إستعمالك إكسيلون لصقة لفترة تزيد عن ثلاثة أيام، فلا يجوز لصقة اللصقة التالية قبل إستشارة طبيبك. بالإمكان إستئناف العلاج بلصقة من نفس المقدار الدوائي وذلك إذا لم يتم التوقف عن العلاج لأكثر من ثلاثة أيام. وإلا، فسوف يستأنف الطبيب العلاج بلصقة إكسيلون 5 ملغ في 24 ساعة.

أين يجب لصق إكسيلون لصقة؟

• قبل لصق إكسيلون لصقة يجب التأكد من أن الجلد:

-

- نظيف، جاف وبدون شعر، خال من أي مسحوق، زيت، مرطب (كريم الترطيب) أو مستحلب التي يمكنها أن تؤثر على اتصاق اللصقة للجلد بشكل سليم، جلد بدون شروخ، طفح و/أو تهيقات.

يجب نزع اللصقة الحالية بحذر قبل لصق لصقة جديدة، إذا أُلصقت على جسمك عدة لصقات، فإن جسمك قد يكون معرضًا للكمية فائضة من الدواء، حالة التي قد تكون خطيرة.

يجب لصق لصقة واحدة فقط في اليوم، في أحد الأماكن التالية فقط في الرسوم أدناه:

- القسم العلوي الأيسر من الذراع الأيسر أو الأيمن


- الجانب العلوي الأيسر من الصدر أو الجانب العلوي الأيمن من الصدر، (يجب الإمتناع عن اللصق على الشيء)

- الجانب العلوي الأيسر من الظهر أو الجانب العلوي الأيمن من الظهر


- الجانب الأيسر من أسفل الظهر، أو الجانب الأيمن من أسفل الظهر

كل 24 ساعة، يجب نزع اللصقة الحالية قبل لصق لصقة جديدة واحدة على أحد الأماكن التالية فقط:


الجانب العلوي من الذراع، أيمين أو أيسر



الصدر، جانب أيمين أو أيسر



أعلى الظهر، الجانب الأيمن أو الأيسر




أعلى الظهر، الجانب الأيمن أو الأيسر

عندما تقوم بتبديل اللصقة، عليك نزع اللصقة اليوم السابعة قبل لصق اللصقة الجديدة في كل مرة في مكان آخر على الجلد (متلاً على الجانب الأيمن للجسم في اليوم الأول وعلى الجانب الأيسر في اليوم التالي، في القسم العلوي من الجسم في اليوم الأول وفي الجزء السفلي من الجسم في اليوم التالي). لا يجوز لصق لصقة جديدة في نفس المكان بالضبط مرتين خلال 14 يوماً.

كيف يجب لصق إكسيلون لصقة؟


إن اللصقة دقيقة، غير شفافة، مصنوعة منiplastik وتلتصل على الجلد. كل لصقة مغلفة بكيس مغلق يحميها حتى تكون جاهزاً للصقها. لا يجوز فتح الكيس أو إخراج اللصقة إلا فقط قبل إصاقتها فعلاً.

يجب نزع اللصقة الحالية بحذر قبل لصق لصقة جديدة.




للمتعالجين الذين يبدأون العلاج للمرة الأولى وللمتعالجين الذين يبدأون العلاج من جديد بعد توقف عن العلاج، الرجاء البدء من الرسم الثاني.

• كل لصقة مغلفة بكيس مغلق الذي يحميها. يجب فتح الكيس فقط عندما تكون جاهزاً لـ إستعمال اللصقة، يجب تضييق الكيس بواسطة مقص على طول الخط المتقطع وإخراج اللصقة من الكيس.



• هناك طبقة تحمي الجانب اللاصق للصقة. يجب نزع جانب واحد من الطبقة الواقية، وعدم ملامسة القسم اللاصق للصقة بالأصابع.



• وجدت لديك ردود فعل للجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ وإسهال. قد تصيب بالتجفاف (جراء فقدان سوائل أكبر مما ينبغي) وذلك إذا استمر التقى أو الإسهال.

• وجد لديك خلل في الأداء الوظيفي للقلب في هذه الحالات، من الجائز أن يراقب طبيبك وضعك بصورة حثيثة أكثر أثناء العلاج بالدواء.

في حالة عدم إستعمالك إكسيلون لصقة لفترة تزيد عن ثلاثة أيام، لا يجوز لصقة اللصقة التالية بدون إستشارة الطبيب المعالج.

الأطفال والمراهقون

إكسيلون لصقة غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

لا يجوز إستعمال إكسيلون بنفس الوقت مع أدوية تأثير ذات تأثير مشابه له إكسيلون.

قد يؤثر إكسيلون على أدوية مضادة لإفراز الكولين حيث إن بعضها هي أدوية تستعمل للتخفيف من تشنجات أو تقلصات المعدة (مثل ديسيكولومين)، العلاج

مرض الباركيتون (مثل أماناتدين) أو لمنع «مرض دوار السفر» (مثل ديفينيدرامين، سكوبولامين أو ميكليزين).

لا يجوز إستعمال إكسيلون لصقة في نفس الوقت مع ميتوكلوبراميد (دواء يستعمل لتخفيف أو لمنع الغثيان والتقيؤات). إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مثل تصلب الأطراف وإرتجاف اليدين.

إذا كنت قدماً على إجتياز عملية جراحية خلال فترة العلاج بـ إكسيلون لصقات، يجب إبلاغ طبيبك عن تأثيره النبض (نبض بطيء) الذي قد يؤدي إلى حدوث إغماء

أن يزيد من تأثيره مرحبات عضلية معينة خلال التخدير (أدوية مثل أتبولول المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مثل تباطؤ النبض (نبض بطيء) الذي قد يؤدي إلى حدوث إغماء أو فقدان الوعي

يجب إتخاذ جانب الحذر عند إستعمال إكسيلون لصقة مع حاجبات بينما (أدوية مثل أتبولول المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مثل تباطؤ النبض (نبض بطيء) الذي قد يؤدي إلى حدوث إغماء أو فقدان الوعي

يتمي ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات المفحة للأسيتيل كولين: أسيتيل كولين إستيراز وبوتييريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، يتبع إكسيلون ارتفاع نسب الأسيتيل كولين في الدماغ، ويساعد في تقليل أعراض مرض الأزهايمير.

إكسيلون مخصص لعلاج المرضى الكبار الذين يعانون من خرف طفيف، متوسط وخطير، مرض متقدم (progressive) لإضطراب في الدماغ الذي يؤثر بالتدريج على الذاكرة، القدرة العقلية والسلوك.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطة الإنزيم كولين إستيراز (anticholinesterases)

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

إذا كنت تتناول أدوية مثل أتبولول المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى، إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مثل تصلب الأطراف وإرتجاف اليدين.

إذا كنت قدماً على إجتياز عملية جراحية خلال فترة العلاج بـ إكسيلون لصقات، يجب إبلاغ طبيبك عن تأثيره النبض (نبض بطيء) الذي قد يؤدي إلى حدوث إغماء

أن يزيد من تأثيره مرحبات عضلية معينة خلال التخدير (أدوية مثل أتبولول المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). إن إستعمال هذين الدوائين سوية من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل مثل تباطؤ النبض (نبض بطيء) الذي قد يؤدي إلى حدوث إغماء أو فقدان الوعي

يتمي ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات المفحة للأسيتيل كولين: أسيتيل كولين إستيراز وبوتييريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، يتبع إكسيلون ارتفاع نسب الأسيتيل كولين في الدماغ، ويساعد في تقليل أعراض مرض الأزهايمير.

إكسيلون مخصص لعلاج المرضى الكبار الذين يعانون من خرف طفيف، متوسط وخطير، مرض متقدم (progressive) لإضطراب في الدماغ الذي يؤثر بالتدريج على الذاكرة، القدرة العقلية والسلوك.

(4) قبل إستعمال الدواء

إكسيلون لصقة 5 وإكسيلون لصقة 10: لعلاج مشاكل الذاكرة - الخرف (dementia) الخفيفة حتى المتوسطة من نوع الأزهايمير.

إكسيلون لصقة 15: لعلاج مشاكل الذاكرة - الخرف (dementia) من نوع الأزهايمير. تم إثبات النجاعة لدى مرضى يعانون من مرض الأزهايمير خفيف، متوسط وخطير.

يتنمي ريفاستيجمين لمجموعة المواد المسماة مثبطة كولين إستيراز، لدى متعالجين لديهم خرف (dementia) ناجم عن مرض الأزهايمير، تتواءم خلايا العصبية معينة في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى نسب مخفضة للناقل العصبي (neurotransmitter) أسيتيل كولين (Acetylcholine)، مادة تسمح للخلايا العصبية بالتواصل مع بعضها البعض. يعمل ريفاستيجمين عن طريق حجب الإنزيمات المفحة للأسيتيل كولين: أسيتيل كولين إستيراز وبوتييريل كولين إستيراز. من خلال حجب هذه الإنزيمات، يتبع إكسيلون ارتفاع نسب الأسيتيل كولين في الدماغ، ويساعد في تقليل أعراض مرض الأزهايمير.

إكسيلون مخصص لعلاج المرضى الكبار الذين يعانون من خرف طفيف، متوسط وخطير، مرض متقدم (progressive) لإضطراب في الدماغ الذي يؤثر بالتدريج على الذاكرة، القدرة العقلية والسلوك.

(5) تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إكسيلون لصقة، إحك للطبيب إذا:

• وجد لديك، أو كان لديك في الماضي نقص غير منتظم أو بطيء

• وجدت لديك، أو كانت لديك في الماضي قرحة معدية نشطة

• وجدت لديك رد فعل جلدي الذي ينتشر بما يتجاوز حجم الصدقة، إذا حدث رد فعل موضعي قوي (مثل حويصلات، تزايد إنتفاخ الجلد، انتفاخ) وإذا لم يتحسن هذا الوضع خلال 48 ساعة بعد إزالة الصدقة

إذا كانت هذه الحالات تتطابق عليك، يجب إبلاغ الطبيب ولا يجوز إستعمال إكسيلون أصنافات.

(6) تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ إكسيلون لصقة، إحك للطبيب إذا:

• وجد لديك، أو كان لديك في الماضي نقص غير منتظم أو بطيء



• وجدت لديك، أو كانت لديك في الماضي صعوبات في التبول

• وجدت لديك، أو كان لديك في الماضي إختلاجات

• وجدت لديك، أو كان لديك في الماضي ربو أو مرض تنفسى خطير

• كنت تعاني من إرتجاف

• كان وزن جسمك منخفضاً



- يجب وضع القسم الالاصلق المصنقة على المنطقة العلية أو السفلية من الظهر، في القسم العلوي من الذراع أو على الصدر ومن ثم نزع القسم الثاني للطبقة الواقية.

- الآن يجب الضغط على اللصقة بشدة لمدة 30 ثانية على الأقل بمساعدة راحة اليد من أجل التأكيد من إتصاق كل الأطراف كما ينبغي.

هناك إمكانية للكتابة مثلاً اليوم من الأسبوع على اللصقة بواسطة قلم حبر دقيق وذلك إذا كان هذا الأمر يساعدك على التذكر.

يجب إبقاء اللصقة في المكان بإستمرار إلى حين موعد تبديلها بلصقة جديدة. من الجائز أن ترغب في تجربة أماكن مختلفة للصقة الجديدة من أجل إيجاد الأماكن الأكثر راحة والأماكن التي لا تحتك فيها الشاب باللصقة.

كيف يجب نزع إكسيلون لصقة؟

يجب السحب بطفف وببطء طرف واحد من اللصقة من أجل تزعها عن الجلد. في حال بقاء آثار مادة لاصقة على الجلد، قم بترطيب المنطقة بطفف بما دافئ وصابون لطيف أو إستعمل زيت الأطفال لإزالة بقية المادة الالاصقة.

لا يجوز إستعمال الكحول أو سوائل أخرى مذيبة (مزيل طلاء أظافر أو مذيبات أخرى). يجب شطف اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة.

في حالة التماس مع العينين أو إذا ظهر إحمرار في العينين بعد العلاج باللصقة، يجب شطف العينين حالاً بالكثير من الماء. إذا لم تزول هذه الأعراض فتوجه لاستشارة طبية.

هل بالإمكان إستعمال اللصقة أثناء الإغتسال، السباحة أو أثناء المكوث في الشمس؟

إن الإغتسال في حوض الاستحمام، السباحة أو الحمام من غير المفترض أن تؤثر على اللصقة. يجب مراعاة اللصقة حتى لا ترتخي أثناء ممارسة هذه النشاطات.

لا يجوز تعريض اللصقة لأي مصدر حرارة خارجي (مثل ضوء الشمس بكثرة، حمام بخار (ساونا)، حجرة التسخن) لفترات زمنية طويلة.

ماذا يجب عمله في حالة سقوط اللصقة؟ إذا سقطت اللصقة يجب لصق لصقة جديدة لما تبقى من اليوم، وبعد ذلك يجب تبديلها في اليوم التالي في الموعد المحدد.

متى ولأي فترة زمنية يجب إستعمال إكسيلون لصقة؟

من أجل تحقيق الفائدة من الدواء الخاص بك إستعمال لصقة جديدة كل يوم، يستحسن تبديل لصقة في نفس الساعة من كل يوم.

يجب إستعمال لصقة واحدة فقط في كل مرة وتبديلها بلصقة جديدة بعد 24 ساعة.

إذا استعملت بالخطأً لصقات إكسيلون أكثر من المطلوب

إذا استعملت أكثر من لصقة واحدة، فيجب نزع كل اللصقات عن جلدك وبعد ذلك إبلاغ الطبيب المعالج بأنك إستعملت بالخطأً أكثر من إكسيلون لصقة واحدة.

من الجائز أن تحتاج لمرأة طبية. لقد شعر قسم من الأشخاص الذين إستعملوا بالخطأً إكسيلون أكثر مما ينبغي بأنهم مرضى: غثيان، تقيؤ، إسهال، ضغط دم مرتفع وهلوسة.

نبض بطء وإغماء قد يحدثان أيضاً. إذا قام طفل بالخطأً بألصق لصقة إكسيلون، يجب التوجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال إكسيلون لصقة

إذا اكتشفت أنك نسيت إستعمال إكسيلون لصقة، فعليك لصق لصقة جديدة حالاً. بالإمكان إستعمال اللصقة التالية في الوقت المعتاد في اليوم التالي.

لا يجوز إستعمال لصقتين معاً من أجل التعويض عن اللصقة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن إستعمال إكسيلون لصقة

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. توجه وإنك للطبيب أو للصيدلي إذا توقفت عن إستعمال اللصقة.

لا تستعمل الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إكسيلون لصقة قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندمج من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

شيوخ الأعراض الجانبية يكون أكبر عند بدء العلاج أو عند زيادة المقدار الدوائي للدواء.

في أغلب الحالات تختفي الأعراض الجانبية بالتدرج، نظراً لتعود الجسم على الدواء.

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم.
- لا تنسَب التقىء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين دون 25 درجة مئوية.
- إحفظ اللصقة داخل الكيس الخاص بها إلى حين إستعمالها.
- لا يجوز الإستعمال اللصقة إذا كانت معطوبة أو إذا توجد علامات لفتحها.
- بعد نزع اللصقة، قم بطيئها من النصف بحيث تكون الجوانب المستعملة إلى الكيس الخاص بها وقم برميها بحيث لا يكون بإمكان الأطفال التعامل معها. لا يجوز لمس عينيك بواسطة أصابعك، يجب غسل اليدين بالصابون والماء بعد نزع اللصقة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من اللصقات المستعملة أو تلك التي لا حاجة بها بعد.
- يفضل التخلص من اللصقات المستعملة بحيث تكون في العلبة الأصلية.
- يجب تخزين في العلبة الأصلية.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Acrylic pressure sensitive adhesive; silicone pressure sensitive adhesive; poly (butylmethacrylate, methylmethacrylate); silicone oil 12,500 cSt, dimethicone; tocopherol (all-rac- α), vitamin E

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

تشمل العلبة أكياس، في كل كيس لصقة إكسيلون واحدة. اللصقة هي لصقة رقيقة للجلد، مصنوعة من ثلاثة طبقات.

الجزء الخارجي هو بلون بيج، وعليه علامات:

إكسيلون لصقة 5: AMCX

إكسيلون لصقة 10: BHD1

إكسيلون لصقة 15: CNFU

أحجام العلبة:

إكسيلون لصقة 5، إكسيلون لصقة 10: 3.7، 30، 60 لصقة.

إكسيلون لصقة 15: 7.7، 30 لصقة.

من الجائز أن تستيقظ كافة أحجام العلبة.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه:

نوثاريس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم إعدادها في آذار 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إكسيلون لصقة 5: 31674 139 69

إكسيلون لصقة 10: 31675 139 70

إكسيلون لصقة 15: 33884 150 97

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

إنزع اللصقة وبلغ الطبيب المعالج حالاً، إذا شعرت بوحد أو أكثر من الأعراض التالية التي قد تكون خطيرة:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10):

فقدان الشهية للطعام

الشعور بدوران

الشعور بهيجان أو بميل للنوم

عدم السيطرة على التبول (عدم القدرة على التبول كما ينبغي)

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 100):

مشكل في ضربات قلب مثل تباطؤ ضربات القلب

رؤية أشياء التي في الواقع ليست موجودة (هلوسة)

قرحة في المعدة

تجفاف (فقدان سوائل أكثر مما ينبغي)

فرط نشاط (مستوى مرتفع من النشاط، قلة راحة)

عدوانية (Aggression)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 1,000):

سقوطات

تصلب اليدين أو الرجلين

إرتجاف في اليدين

أعراض جانبية شديدة غير معروفة (لا يمكن تقدير الشيوخ بالإعتماد على المعطيات المتوفرة):

رد فعل تحسسي في مكان لصق اللصقة، مثل حويصلات وإلتهاب الجلد

تقاوم علامات مرض الباركينسون (رعاش) - مثل إرتجاف، تصلب وتبخر أثناء المشي

إلتهاب البنكرياس - العلامات تشمل ألم شديد في أعلى البطن، غالباً يترافق بالشعور بوعدة من الغثيان وتقىؤات

ضربات قلب سريعة وغير منتظمة

ارتفاع ضغط الدم

نوبات إختلاج

اضطرابات في الكبد (اصفرار الجلد، إصفرار بياض العينين، بول داكن شاذ أو غثيان غير مشخص، تقىؤات، إرهاق وفقدان الشهية للطعام)

تغيرات في نتائج الفحوص التي تدل على مستوى سلامة وظائف الكبد

الشعور بعدم هدوء

كوابيس ليلية

إنزع اللصقة وتجوّه إلى طبيبك حالاً إذا شعرت بحدى الأعراض الجانبية أعلاه.

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها بخصوص إكسيلون كبسولات وقد تظهر عند إستعمال اللصقات:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10):

فائق من اللعب، فقدان الشهية للطعام، الشعور بعدم هدوء، شعور عام سيء، إرتجاف أو الشعور بغير تاربكاً، فرط تعرق.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 100):

عدم إنتظام نظم القلب (مثل نظم قلب سريع، صعوبات في النوم، سقوطات عرضية).

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 1,000):

نوبات إختلاج، قرحة في الأمعاء، ألم في الصدر الذي قد ينجم عن تشنج في القلب.

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10,000):

ارتفاع في ضغط الدم، إلتهاب البنكرياس - العلامات تشمل ألم شديد في أعلى البطن، غالباً يترافق بالشعور بوعدة مع غثيان وتقىؤات، نزف في الجهاز الهضمي - براز دموي أو قيء دموي، رؤية أشياء غير موجودة (هلوسة). بعض المتعالجين الذين عانوا من تقىؤات شديدة عانوا من تمزق في أنبوب المرء الذي يربط بين الفم والمعدة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، او عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>