

كتافلام 50 ملخ

أعراض

يحتوي كل قرص على:

ديكوفيناك بوتاسيوم 50 ملخ

Diclofenac as potassium 50 mg

المركبات غير الفعالة وكثيرها، انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

ووصف هذا الدواء لعلاج مرضك، فهو قد يضره حتى ولو بدا لك أن مرضم ضروري شابه لمرضك.

١) لأى غرض مخصص الدواء؟
المستحضر مخصص للسيطرة على الآلام والألم ما قبل الطمث عندما يراد تخفيف سرطان للألم.

الفصيلة العلاجية:
من مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية (NSAIDs)، تقلل من الألم والإلتهاب.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت تعتقد بأنه قد تكون لديك حساسية لـ ديكوفيناك بوتاسيوم، أسيبرين، أيبوفينين أو أي مستحضر NSAID آخر، أو لكل واحد من مركبات كاتافلام (المفصلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء»، علامات فرفط الحساسية تشمل: إنفاس الوحة والقم (وذمة وعائية)، مشاكل في التنفس، ألم في الصدر، رعش، طفح جدلي أو أي رد فعل تحسسي آخر).

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قرحة في المعدة أو في الأمعاء، أو من ازدواج في الطرق الهضمية (هذا يشمل: دم في القيء، نزف أثناء تقديم الأمعاء والتقطور، دم ملتحم في المعدة أو في الأمعاء بعد تناول NSAIDs آخر).

• عانيت من مشاكل في القلب، الكلبة أو في الكبد.

• إذا إجتررت نوبة دماغية، سكتة، نوبة اقفاربة عابرة (TIA) أو من إنسداد الشرايين الدموية للقلب أو للدماغ، أو إذا إجتررت عملية جراحية لفتح أو لتجاوز إنسداد.

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الدورة الدموية (مرض شريان محبطي).

• إذا كنت في الثلث الأخير من الحمل.

ننشر للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:
قبل العلاج بـ كاتافلام، إحكام طببك إذا:

لديك

إضطرابات في المعدة أو في الأمعاء، بما في ذلك إلتهاب القولون التقرحي (Ulcerative colitis)، أو من مرض إلتهاب الأمعاء المزمن (Crohn's disease).

لديك

مشاكل في الكلى أو الكبد أو كنت مسنًا.

كنت

تعاني من حالة تسمى پورفيريا (Porphyria)، خلل في استقلاب مواد

البورفيريات.

كنت

تعاني من آية إضطرابات في الدم أو من نزف، في حال معانتك، فمن الجائز أن طلب منك طببك القدوء لإجراء فحوص دورية أثناء إستعمال كاتافلام.

كنت

مرضعة.

كنت

تعاني من ذبحة صدرية (angina)، خثرات دموية، ضغط دم مرتفع، عدم سلامه نسب الشحوم في الدم (ارتفاع الكوليستيرول أو ارتفاع نسبة الشحوم الثلاثية).

لديك

مشاكل في القلب، أو عانيت من سكتة أو كنت تعتقد بأنك قد تكون معرض لخطورة حدوث هذه الحالات (مثال: إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، السكري، إرتفاع الكوليستيرول أو كنت من المدخنين).

كنت

تعاني من السكري.

كنت

من المدخنين.

كنت

تعاني من الذئبة الإحماريه الجهازية (lupus) أو من حالة مشابهة.

الأطفال والمهorchون

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر 14 سنة.

التداللات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إستعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأشخاص إذا كنت تستعمل:

أدوية لعلاج السكري.

المدرات البولية (زيادة كمية البول).

لينيوم (يسخدم لمعالجة مشاكل نفسية معينة).

ميتوتريلوكس (المعالجة للأمراض الالتهابية وبعض أنواع السرطان).

سيكلوسوزين وتاكريلوموس (استعمل لمنع أو لعلاج التهاب المسالك البولية).

تربيتنيوريبور (دواء يستعمل لمنع أو لعلاج التهاب المسالك البولية).

مضادات بيوية من نوع النيكيلونات (المعالجة للثروات).

NSAIDs

أخرى أو مثبطات COX-2 (cyclooxygenase-2) مثل أسيبرين أو إيبوبروفين.

ميقيريستون (دواء يستعمل لإيقاف الحمل).

الجاكيزيريدات القلبية (مثل: ديموكسين)، مستعمل لمعالجة المشاكل القلبية.

SSRIs

المستعملة لمعالجة الاكتئاب.

ستيرويدات تؤخذ عن طريق الفم (دواء مضاد للإلتهاب الذي يؤخذ عن طريق الفم).

الأدوية المستعملة لمعالجة المشاكل القلبية أو ارتفاع ضغط الدم، مثلًا حاجبات بيتا، أو مثبطات ACE.

فووريونازول (دواء يستعمل لمعالجة الثروات الفطرية).

فينتيونين (دواء يستعمل لعلاج الاختلالات).

كوليستيماين (كوليستيماين) (ستعمل لتخفيض الكوليسترول).

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الأدواء معوجة الطعام أو بعد وجبة الطعام. يجب بلع القرص بشكّل الكامل مع سائل، لا يجب ضغط أو تقطيم القرص.

الحمل الإبراري والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو تخطيطين للحمل، فقد يبلغ عن شدود لدى رضيع لأمهات تناولن أقراص كاتافلام في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، لأن هذا الأمر من شأنه أن يلحق الضرار بالجنين.

بلغني الطبيب إذا كنت مرضعة. فإن كميات ديكوفيناك تنتقل إلى حليب الأم، لذا لا يجب تناول ديكوفيناك خلال الرضاعة لتجنب أعراض غير مرغوبية لدى المولود.

إذا كنت تخطيطين للحمل، فإن تناول كاتافلام من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة في حصول حمل. عليك استشارة الطبيب إذا كنت تخطيطين للحمل أو إذا وجدت لديك صعوبات في حصول حمل.

السيادة وإستعمال الماكولات

بلغ من زين آخر على أن إستعمال الدواء قد يسبب دوار، إرهاق أو نعاس. يبلغ أيضًا عن حدوث إضطرابات في الرؤية. إذا كنت تشعر بذلك الأعراض، فعليك الإبتعاد عن سيادة المركبات وعن تشكيل الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي أقراص كاتافلام 50 ملخ على سكرور، إذا قيل لك من قبل الطبيب المعالج بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، بلع طببك قبل تناول الدواء.

يحتوي كل قرص على حوالي 68 ملخ سكرور.

معلومات حول محتوى الصوديوم:

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ) في القرص، وبهذا يعتبر "حال من الصوديوم".

تحذيرات إضافية

يجب عليك إستعمال المقدار الدوائي الأخفض من كاتافلام ولفترات الزمنية الممكنة الأقصى، خاصة إذا كنت ذو وزن منخفض أو مسنًا.

هناك زيادة قليلة في الحرارة لحدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية أثناء تناولك لأدوية دادًأً، يجب متابعة تلقيمات الطبيب بالنسبة للكمية التي يتوجب عليك تناولها ولادي مدة.

إذا كنت، في أية مرحلة خلال فترة إستعمال كاتافلام تقاسى من آية علامات أو أعراض لمشاكل في القلب أو الأوعية الدموية مثل أم في الصدر، ضيق تنفس، ضغط أو كلام غير واضح، إنصل بطببك في الحال.

متى وكيفية تناول الدواء

يفضل تناول الدواء أثناء أو بعد وجبة الطعام.

لقد تم تصميم أقراص كاتافلام ل服用 بسرعة، يجب بلع القرص بأكمله مع شراب أو ماء، لا يجوز شربه، سحق أو مضخة القرص، لا توجد معطيات حول هذا الأمر.

إذا تناولت بالخطأً مقدارًا دوائيًا أكبر

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأي الرضيع، وذلك لتقديري إصابتهم بالتسمم. لا تسبب القنبلة بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنخفاض تاريخ الصلاحية (exp. date) (الذي يظهر على ظهر العلبة). يشير تاريخ إنخفاض الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية. يجب الحفاظ على الماء.
- إذا أبلغ الطبيب بتوقف عن تناول أقراص كاتفالم، قد يعاني الطبيب من الماء المتبقية الصيدلانية، من أجل إنذارها، لا يجوز رمي الأقراص في المجاري أو القمامه، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية:

- تحتوي كل قرص على 50 ملجم من المركب الفعال ديكوليوفيناك بوتاسيوم. يحتوي القرص بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على مواد غير فعالة: Calcium phosphate; Maize starch; Sodium starch glycolate; Silica, colloidal anhydrous; Povidone; Magnesium stearate; Sucrose; Talc; Povidone; Dispersed Red 15881 (Iron Oxide red EEC 172; Titanium dioxide EEC 171); Macrogol 8000; Cellulose, microcrystalline
- أنتظر أيضاً الفرقعة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء».
- كيف يبدو الدواء وما هو محتواه الخليط.
- كتافالم 50 ملجم مسقوق على شكل أقراص مطلية بالسكر. على كاتفالم تحتوي على 10 أو 20 قرصاً من الجائز لـ أتسوق كافة أحجام العلب.
- أقراص كاتفالم هي ذات للاء سكري لونها بني - مثل للأحرم، مستديرة ومحدبة الجانبين.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه:
نووارتبس إسرائيل، م.رض، ص.ب. 7126، تل أبيب.
تم إعدادها في كانون الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
069 40 28459 من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

<https://sideeffects.health.gov.il>

تأثيرات على المعدة والجهاز الهضمي:

إمساك، الإسهال، السنان، تقرحات في الفم، الإتهاب القسم الداخلي من الفم أو الشفتين، اضطرابات في أسلف الأمعاء [تشمل الإتهاب القولون أو تفاقم الإتهاب القولون التقرحي [ulcerative colitis] أو مرض الإتهاب الأمعاء المزمن [Crohn's disease]]، الإتهاب البنكرياسي.

تأثيرات على الصدر وجهاز الدوران:
ضغط دم مرتفع، ضغط دم منخفض [علامات إنخفاض ضغط الدم تشمل إغماء، دوار، أو الشعور بدوخة، الإتهاب الأوعية الدموية (vasculitis)]، الإتهاب الرئتين، اضطرابات في الدم [تشمل نقر الدم].

تأثيرات على الكبد أو الكلى:
اضطرابات في الكلى أو اضطرابات خطيرة في الكبد، تشمل فشل كبدي، تواجد دم أو بروتين في البول.

تأثيرات على الجلد أو الشعر:
إنفصال الوجه، طفح جلدي شديد يشمل متلازمة ستيفنس - جونسون ومتلازمة لайл وحالات طفح جلدي أخرى التي تتفاقم عند التعرض لضوء الشمس، فقدان الشعر.

تأثيرات على جهاز التكاثر:
جزع جنسي.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):
اضطرابات في الجنين، إرباتك هذيان، الشعور بوعكة [شuron عام بعدم الراحة)، الإتهاب في أعضاء البطن، اضطرابات حسية.

أدوية مثل كاتفالم قد يكون لها علاقة بزيادة طفيفة في خطرة حدوث ثوبات قلبية أو سكتة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عدمنا تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

ألم متواصل في الخدمة أو سخونة مرتفعة.
تغير غير متوقع في نتاج البول / أو في مظهره،
تضقلصات متعدلة، وحساسية البطن، التي تبدأ بعد فترة قصيرة من بدء العلاج بأقراص كاتفالم وفي أعقابه نزف من المستقيم أو سهل دموي، عادة خلال 24 ساعة بعد بدء الألم البطن.

ألم في الصدر، الذي يمكن أن يشكل علامه لرد فعل تحسسي خطير يسمى syndrome Kounis.
إذا كنت تلاحظ بأنك تصاب بكميات بشكل أسهل من المعتاد أو لديك ألم في الخدمة أو ثلثوات بوية أكبر لديك، بلغ الطبيب.

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):
ألم في البطن، حرقان، غثيان، تقيؤات، إسهال، صعوبات في الهضم، غازات، فقدان الشهية للطعام

صداع، دوار، الشعور بدوخة (غيرتيغو)
طفح أو بقع على الجلد
إرتقان سبب إنزيمات الكبد في الدم

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):
نفاس سريع أو غير منتظم [خفقان القلب)، الماء في الصدر، اضطرابات في القلب، تشمل نوبة قلبية أو ضيق تنفس، صعوبات في التنفس أثناء الاستقلاء، إنفصال راحتي القدمين والرجليين [علامات لقصور القلب)، خاصة إذا استعملت مقداراً دوائياً مرتفعاً (150 ملجم للاليوم) على مدى فترة طويلة

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):
ترחרحات أو نزف في المعدة (كان هناك بلاغات نادرة جداً على حدوث انتهت بالوفاة، خاصة لدى المسنين)

• الإتهاب المعدة (التهاب، تهيج أو إنفصال جدار المعدة)
تنقيء دم
إسفلات دموي أو نزف من فتحة الشرج

براز أسود، كالزفت
نفاس، إرهاق
طفح جلدي وحكة
إحتباس السوائل، الأعراض تشمل إنفصال الكاحلين
اضطرابات في وظائف الكبد، تشمل الإتهاب الكبد ويرقان
ربو (العلامات تشمل صفير، ضيق التنفس، سعال والشعور بضغط في الصدر)

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

تأثيرات على الجهاز العصبي:
الإتهاب السحايا الدماغي (meningitis)، وخز أو خدر في الأصابع، رجفة، اضطرابات في الرؤية مثل تشوش أو ازدواج الرؤية، تغير المناق، فقدان أو خلل في السمع، طنين في الأذنين، أرق، كوايسيل ليلية، تغيرات في المزاج، إكتتاب، قلق، سخط، اضطرابات نفسية، توهان، فقدان الذاكرة، نوبات، صداع يترافق بحساسية للضوء الساطع، سخونة وتصلب الرقبة.

إذا تناولت أنت أو شخص آخر، بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً، أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك. يجب الموافقة على العلاج حسب توقيع الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة دوائية حال تذكر. لكن إذا حان تقريباً موعد المقادير الدوائية القائم، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة المناسبة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب. لا يجوز تجاوز مقداراً دوائياً تقدر 150 ملجم (3 أقراص ذات 50 ملجم) خلال 24 ساعة.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالي التصفيه.
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أستيلاً إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال كاتفالم قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز الا تعاني اي منها.

بالإمكان تقليل الأعراض الجانبية وذلك بإستعمال المقدار الدوائي الناجع الأخفض للفتره الزمنية المطلوبة للأقصر.

من شأن التوقف عن تناول أقراص كاتفالم وإبلاغ الطبيب بشكل فوري إذا كنت تلاحظ حدوث:

ألم ماجي وضاغط في الصدر (علامة لإحتشاء عضلة القلب أو لنوبة قلبية).

ضيق تنفس، صعوبات في التنفس أثناء الاستقلاء، إنفصال راحتي القدمين أو الرجليين (علامات لقصور القلب).

ضعف أو خدر مفاجئين في الوجه، في الذراعين، أو في الرجلين خاصه بجانب واحد من الجسم، فقدان أو اضطراب مفاجئين في الوجه، صداع ماجي يشبه الشقيقة يحدث للمرة الأولى، أو بدون اضطراب في الرؤية. هذه العلامات قد تكون علامات مبكرة لحدوث سكتة دماغية.

ألم في البطن، صعوبات في الهضم، حرقان، غازات، غثيان (الشعور بمرض)، تقيؤات (وعكة).

أي علامة لنزف في المعدة أو الأمعاء، مثلثأً تيزن، دم في القيء أو براز أسود، كالزفت.

ردد فعل تحسسية التي تشمل طفح جلدي، الشعور بحكمة، كدمات، مناطق حمراء مؤلمة، تقرش الجلد أو حروصلات.

صعوبات في التنفس مع صفير أو ضيق تنفس (تشنج القصبات الهوائية).

إنفصال الوجه، الشفتين، اليدين أو الأصابع.

إصفار الجلد أو إصفار بياض العينين.