

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيادلة
(مستحضرات) 1986
يُسوق هذا الدواء بوصفه طيب فقط.

كلورامفينيكول مرهم للجلد

التركيب: Chloramphenicol 3%

للقائمة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر فقرة 6
- "معلومات اضافية".

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء.
تحوي النشرة معلومات موجزة عن الدواء، اذا كانت لديك
استفسارات، فتوجه الى الطبيب او الى الصيدلي.
وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين. فقد
تضرهم حتى لو ظننت انه وضعكم الطبيعي متشابه.

1. لماذا هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لمعالجة تلوثات الجلد السطحية
التي تسببها مجهريات عضوية حساسة للكلورامفينيكول.
المجموعة العلاجية: مضاد بكتيري لاستعمال موضعي.

2. قبل استعمال الدواء:

■ يُمنع استعمال الدواء اذا:

• إذا كانت لديك حساسية لاحظ مركبات الدواء او لادوية
تحتوي على الكلورامفينيكول.
• اذا كنت تعاني او يعني احد افراد العائلة من مشاكل
في جهاز الدم او مرض نخاع العظام بما في ذلك انيميا
"فقر الدم" (نقص في عدد كريات الدم الحمراء). اعراض
ممكنة: تعب، شحوب غير عادي او ارتفاع التلوثات.

■ تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال المستحضر:
يحتوي المستحضر على الكلورامفينيكول الذي قد يسبب
تغييرات في بنية الدم عند الاستعمال الطويل الامد، لذا يجب
الامتناع عن الاستعمال المستمر للمستحضر.
لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة او لفترة
طويلة بدون استشارة الطبيب.

يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك ل الطعام او لدواء قبل
استعمالك للدواء.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال على العينين، لا تدع
المستحضر يمسها. في حالة اصابة العينين يجب الغسل
فوراً بالماء.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة
الطبيب مقدماً :

• اذا كنت حاملاً او مرضعة.
• اذا كنت تعاني او اذا عانيت في الماضي من خلل في
وظيفة نخاع العظام.
اذا كنت تتعاطى دواء إضافياً او إذا أنهيت العلاج الآن
بدواء آخر بما في ذلك ادوية بدون وصفة طبيب ومكملات
الغذاء، فيجب اعلام الطبيب او الصيدلي. خاصة يجب
اعلام الطبيب او الصيدلي اذا كنت تتعاطى:

• الادوية التي تجمع وظيفة نخاع العظم (الادوية التي قد
تسبب انخفاضا في كريات الدم الحمراء، والبيضاء او
في الصفائح).
• العلاج الكيميائي (مثل ميثوتريكسات).
• عقاقير لكتب المناعة مثل الأزوبيثوبرين.

■ الحمل والرضاعة:

يُمنع استعمال الدواء في فترة الحمل، وذلك بسبب عدم
معرفة تأثيراته، الا في حالة توصية الطبيب لك باستعماله.
لا تستخدمي الدواء في فترة الرضاعة الا في حالة توصية
الطبب لك باستعماله.

إذا كنت حاملا، تخطبين للحمل، أو مرضعة فيجب استشارة
الطبب قبل استخدام هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب الحرص دائمًا على الاستعمال حسب تعليمات الطبيب.
يجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي اذا لم تكون متأكداً
تحدد الجرعة وطريقة العلاج بواسطة الطبيب فقط.

الجرعة المقبولة عادة هي:

ادهن كمية قليلة من المرهم على المنطقة المصابة 3-4
مرات في اليوم.

لا تتجاوز المقادير الموصى بها.

يجب مراجعة الطبيب ثانية اذا لم يطرأ تحسن على حالتك
الصحية خلال عدة أيام.

ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.
اذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة او اذا ابتلع ولد بالخطأ
من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى
واحضر عبوة الدواء معك.

اذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيُمنع تناول جرعة مزدوجة. تناول الجرعة المقلبة في الوقت العادي واستشر الطبيب.

يجب الاستمرار بالعلاج كما وُصف من قبل الطبيب.

يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع اي نظارات اذا كنت بحاجة اليها. اذا كانت لديك اسئلة اخرى تخص استعمال الدواء، فاستشر الطبيب او الصيدلي.

4. اعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام كلورفينيكول مرهم للجلد قد يؤدي لاعراض جانبية لدى بعد المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تعاني من اي عرض منها. اعراض تلزم اهتماماً خاصاً

يجب التوقف عن العلاج والتوجه الى الطبيب او الصيدلي فوراً في حالة ظهور احد الاعراض الجانبية التالية:

• اعراض حساسية التي تشمل: ضيق تنفس، سخونة، تورم في الوجه، الشفاه او اللسان، حكة او طفح مع تورم في الجلد (الطفح قد يرافقه تورم مع تغير في لون الجلد، او بظهور بثور صغيرة) تقرحات في الفم او التهاب الحلق التي تسبب صعوبة في البلع او التنفس. تورم في اليدين، القدمين او الكاحلين: توجه لطبيبك فوراً!

• انخفاض في عدد كريات الدم ويظهر ذلك بسخونة، آلام في الحنجرة، ارهاق، نزف دموي او ضعف عام، ردود فعل لزيادة الحساسية ويتجلّى ذلك بإحمرار، تهيج، طفح، حكة، تورم او التهاب موضعي (لم تكن هذه الاعراض قبل استعمال المستحضر) نزيف او اصابة خفيفة - نزيف دموي (نادر) توقف عن العلاج وتوجه للطبيب.

• عدم القدرة على التغلب على العدوى.

• في حالات نادرة، استخدام كلورفينيكول قد يؤدي الى تغيرات في خلايا الدم (تكون الاعراض لذلك ارهاق او بسهولة الاصابة والنزف).

• اعراض جانبية التي تظهر لأول مرة بعد نهاية العلاج: السخونة، التهاب الحلق: يجب استشارة الطبيب فوراً.

اذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، او اذا كنت تعاني من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

5. كيف تخزن الدواء؟

امض اي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسرب بالتقىء بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

يجب حفظ الدواء في مكان جاف تحت درجة حرارة 25°C. يمكن استعمال الدواء حتى 28 يوم بعد فتح العبوة للمرة الاولى، بشرط ان لا يزيد عن تاريخ انقضاء الصلاحية. يجب كتابة تاريخ فتح المرهم على العبوة.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط. حتى ولو ظلت في علبتها الاصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين ادوية مختلفة في نفس العبوة.

6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على: Anhydrous Lanolin, Yellow Soft Paraffin.

كيف يبدو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

مرهم أصفر تعبئتها في أنبوب من 10 غ.

صاحب الامتياز، اسم المنتج وعنوانه:

ريكاف لصناعة الادوية مض.

شارع هملخاه 30، حولون، اسرائيل

فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة

وزارة الصحة في تاريخ 2015/02.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الادوية

في وزارة الصحة: 00 30148 25 140

من اجل التحفيظ وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.