



ريني آيس أقراص مضغ

المواد الفعالة:

كربونات الكالسيوم ٦٨٠ ملغ (٢٧٢ ملغ كالسيوم متوفر) Calcium carbonate 680 mg
كربونات المغنيزيوم ٨٠ ملغ Magnesium carbonate (heavy) 80 mg
المواد غير الفعالة: ٦ «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر ١٢ سنة. دون هذا العمر يجب مراجعة الطبيب. يجب إستعمال هذا الدواء على الشكل الصحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.
يجب مراجعة الطبيب إذا تقاطعت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد ١٤ يوماً.

١) **لأي غرض مخصص للدواء؟**
الدواء مخصص للتخفيف في حالات فرط حموضة المعدة والحرقان. كل قرص عدل حوالي ١٦ ميلي مكافئ (mEq) من الحمض.
الفصيلة العلاجية: من مضادات الحموضة

٢) قبل إستعمال الدواء

❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا

- كنت حساساً لكربونات الكالسيوم أو لكربونات المغنيزيوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (القائمة كافة المركبات، أنظر الفقرة ٦).
- كنت تعاني من مرض كلوي خطير.
- كنت تعاني من ارتفاع نسب الكالسيوم في البول أو من حصي في الكلى.
- كنت تعاني من ارتفاع نسب الكالسيوم أو من انخفاض نسب الفوسفات في الدم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال هذا الدواء لفترة أكثر من أسبوعين إلا بمشورة طبيية. إذا إستمرت الأعراض لأكثر من ١٤ يوماً منذ تناول الدواء، راجع الطبيب، وذلك من أجل نفي وجود حالات طبية أكثر خطورة.

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر ١٢ سنة.

قبل بدء العلاج بالدواء بلع الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في الإداء الوظيفي للكلى/المسالك البولية. من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوص الدم.
- كنت تعاني من مرض سركونيدية (مرض إنتهائي يصيب أعضاء مختلفة من الجسم) أو إذا كنت تعاني من مشاكل/أعراض مزمنة في الجهاز الهضمي.
- كنت حساساً لأي طعام، أو لأي دواء.

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحد الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- مستحضرات تحتوي على حديد أو فوسفات.
- مضادات حيوية من فصيلة التتراسيكلينات أو الكورينولونات.
- ديجوكسين وديجيتوكسين (تستعمل لمعالجة إضطرابات وقصور القلب).
- أدوية من فصيلة التيازيدات (أدوية مدرة للبول).
- مستحضرات الفلور.
- ليفوتيروكسين (هورمون الغدة الدرقية).
- إتروميوباج (دواء يستعمل لزيادة عدد الصفيحات الدموية). يوصى بالإنتظار ٤ ساعات على الأقل قبل أو بعد تناول إتروميوباج وتناول ريني.

❗ إستعمال الدواء والطعام

خلال فترة العلاج بالدواء، يجب الإمتناع عن إستهلاك كميات كبيرة من الحليب أو منتجات الحليب.

❗ الحمل والإرضاع

بالإمكان إستعماله لدى النساء الحوامل أو المرضعات. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها. يجب تجنب الإستعمال المطول وتجنب الإستهلاك الزائد للحليب ومنتجات الحليب، ذلك لأن الدواء يحتوي على كمية جديية من الكالسيوم. يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الإستعمال.

❗ السياقة وإستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر الدواء على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكينات.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

الدواء يحوي سكرور. إذا قيل كل من قبل الطبيب أنك تعاني من حساسية لسكريات معينة، إستشر الطبيب قبل تناول ريني.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيحاء من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واقفاً.

الجرعة الدوائية الاعتيادية عادة هي:

- كبار وأطفال ما فوق عمر ١٢ سنة: ٢-١ أقراص للمص أو للمضغ، حسب الحاجة، بفضل حوالي ساعة بعد الأكل وقبل النوم.
- لمعالجة الحرقان بالإمكان تناول ٢-١ أقراص إضافية بين تلك الأوقات.
- لا يجوز تناول أكثر من ١٠ أقراص في اليوم.
- المستحضر غير مخصص لأطفال دون عمر ١٢ سنة.

- يجب الإمتناع عن الإستعمال المطول.
- يوصى بالإنتظار حوالي ساعة - ساعتين بين تناول أدوية أخرى وتناول ريني.
- لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

الفحوص والمتابعة

خلال فترة العلاج المطول بهذا الدواء يفضل إجراء فحوص نسب الكالسيوم، المغنيزيوم والفوسفات بالدم، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي.
قبل إستعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول حالياً دواء من فصيلة التيازيدات، لأنه من الجائز أن يرغب الطبيب بمتابعة نسب الكالسيوم في دمك.

قد يؤدي الإستعمال المطول بجرعات كبيرة من الدواء لحداث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل: غثيان، تقيؤات، إمساك، وإتهاك وضعف عضلي شاذ. في هذه الحالات يجب التوقف عن إستعمال الدواء، التوجه في الحال إلى الطبيب، وضمان إستهلاك كميات ملائمة من الماء. أنظر أيضا الفقرة ٤ «الأعراض الجانبية» بند «يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه في الحال إلى الطبيب عند ظهور».

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة بأي حال من الأحوال. لا يجوز تناول الأدوية في العتمة؛ يجب تخصيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة لتتأكد فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إسال الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال الدواء قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

من غير المحتمل أن تحدث أعراض جانبية في المقادير الدوائية الموصى بها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه في الحال إلى الطبيب عند ظهور:

• بلع عن حدوث أعراض حساسية متدرة مثل: طفح، حكة، صعوبات في الإنتفس وإنتفاخ الوجه، الألم أو الحنجرة وصدمة إستهدافية (رد فعل تحسسي شديد ويشكل خطراً على الحياة، الأعراض المحتملة هي: إنخفاض ضغط الدم، صدمة، ضربات قلب، صعوبات في الإنتفس، تقلص القصات الهوائية، ردود فعل جلدية، آلام في البطن أو تقلصات، تقيؤات وإسهال).

• قد يؤدي الإستعمال المطول بجرعات كبيرة من الدواء لحداث ارتفاع بنسب الكالسيوم/المغنيزيوم في الدم، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الإداء الوظيفي للكلى. قد يتجلى هذا الأمر بالأعراض التالية: غثيان، تقيؤات، مشاكل في المعدة، إسهال، إتهاك، ضعف العضلات، إرتباك، زيادة إنتاج البول، زيادة الشعور بالعطش وتحجاف.

• إن الإستعمال المطول بجرعات كبيرة أو بالمشاركة مع كميات كبيرة من الحليب أو منتجات الحليب قد يؤدي لحداث متلازمة «الحليب القوي» التي تتجلى بارتفاع نسب الكالسيوم في الدم، وقد تظهر الأعراض التالية: فقدان حاسة المذاق، صداع، إضطرابات في الكلى، إتهاك وكذلك ظهور كتل من تحت الجلد.

• أنظر أيضاً فقرة «كيفية إستعمال الدواء».

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تقاطعت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية. أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: حزن بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:
Sucrose, Talc, Xylitab 100, Pregelatinised maize starch, Cooling flavour, Mint flavour, Potato starch, Magnesium stearate, Light liquid paraffin.

يحتوي كل قرص على ٤٧٥ ملغ سكرور.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:

أقراص قابلة للمضغ، مربعة الشكل، مقعرة، لونها كريم أبيض، مع القليل من النقاط أحياناً، مطبوع عليها «RENNIE» من كلا الجانبين. الأقراص براءة التمتع المنعش.

حجم العلبة المرخص: ٤٨ قرصاً.

صاحب الإمتياز وعنوانه: باير إسرائيل م.ض. شارع هالهاراش ٢٦، هود هشارون ٤٥٢٤٠

إسم المنتج وعنوانه: ديلفارم جابر، فرنسا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحس ورُخص في تاريخ: شباط ٢٠١٦

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٤٧ ٩١ ٣٣٥١٦٠٠

من أجل سهولة تتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.