

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

Ренни Айс

Жевательные таблетки



Активные ингредиенты:

Карбонат кальция 680 мг (272 мг элементарного кальция)
Calcium carbonate 680 mg
Карбонат магния 80 мг
Magnesium carbonate (heavy) 80 mg

Вспомогательные вещества - см. в разделе 6 "Дополнительная информация". Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту. Данный препарат не предназначен детям младше 12 лет. Если ребенок младше - следует обратиться к врачу. Правильно применять данный препарат. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усиливаются или не улучшаются через 14 дней.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Препарат предназначен для облегчения состояний избыточной желудочной кислотности и изжоги. Каждая таблетка нейтрализует приблизительно 16 мEq кислоты.

Фармацевтическая группа: Антациды

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

X Не применяйте препарат, если

- У Вас имеется повышенная чувствительность к карбонату кальция или карбонату магния или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате (список всех ингредиентов см. в разделе 6).
- Вы страдаете тяжелым заболеванием почек.
- Вы страдаете повышенным уровнем кальция в моче или камнями в почках.
- Вы страдаете повышенным уровнем кальция или пониженным уровнем фосфата в крови.

Общие предостережения, касающиеся применения препарата

• Не применяйте данный препарат более двух недель, при отсутствии иных указаний врача. Если симптомы продолжают более 14 дней с момента начала приема препарата, обратитесь к врачу, чтобы исключить более серьезные медицинские проблемы.

• Данный препарат не предназначен детям младше 12 лет.

И До начала лечения препаратом сообщите врачу, если:

- Вы страдаете или страдали в прошлом нарушением функции почек/мочевыводящих путей. Возможно врач направит Вас на сдачу анализа крови.
- Вы страдаете саркоидозом (воспалительное заболевание, поражающее различные органы тела) или Вы страдаете хроническими нарушениями/заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
- Вы чувствительны к какому-либо пищевому продукту, или какому-либо лекарственному препарату.

И Если Вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. В особенности, если Вы принимаете:

- Препараты, содержащие железо или фосфат.
- Антибиотики из группы тетрациклинов или хинолонов.
- Диоксин и дигитоксин (применяемые для лечения сердечных нарушений и сердечной недостаточности).
- Препараты группы тиазидов (диуретики).
- Фториды.
- Левотиросин (гормон щитовидной железы).
- Эльтромбопаг (препарат, применяемый для увеличения количества тромбоцитов в крови). Принимая Ренни, рекомендуется подождать по крайней мере 4 часа до или после приема препарата эльтромбопаг.

И Применение препарата и пища

В период применения препарата воздержитесь от употребления большого количества молока или молочных продуктов.

И Беременность и кормление грудью

Можно применять беременным и кормящим грудью женщинам. Не превышайте рекомендуемую дозу. Воздержитесь от длительного применения и чрезмерного употребления молока и молочных продуктов, поскольку препарат содержит кальций в значительном количестве. Перед применением посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

И Вождение транспортных средств и управление механизмами

Препарат не должен влиять на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами.

И Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Препарат содержит сахарозу. Если врач сообщил Вам, что у Вас есть повышенная чувствительность к некоторым сахарам, посоветуйтесь с врачом перед началом приема Ренни.

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены.

Обычная доза как правило:

- **Взрослые и дети старше 12 лет:** 1-2 таблетки рассосать или разжевать, по мере необходимости, предпочтительно, приблизительно через один час после еды и перед сном.
- Для лечения изжоги можно принять еще 1-2 таблетки в этих временных промежутках.
- Не принимайте более 10 таблеток в день.

- Препарат не предназначен детям младше 12 лет.
- Избегайте продолжительного применения.
- Желательно выдержать интервал примерно в час-два между приемом других препаратов и приемом Ренни.
- **Не превышайте рекомендуемую дозу.**

Лабораторные анализы и наблюдение

- В период длительного применения данного препарата желательно осуществлять проверки уровня кальция, магния и фосфата в крови, особенно у пациентов, страдающих почечной недостаточностью.
- Перед применением препарата поставьте врача в известность, если Вы уже принимаете препарат из группы тиазидов, поскольку возможно, врач захочет наблюдать за уровнем кальция у Вас в крови.

Продолжительное применение препарата в высоких дозах может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта, таким, как: тошнота, рвота, запор, к усталости и резкой мышечной слабости. В этих случаях следует прекратить применение препарата, немедленно обратиться к врачу и обеспечить достаточное потребление воды. См. также раздел 4 "Побочные явления", пункт "Прекратите применение и немедленно обратитесь к врачу, если возникло!". Если Вы приняли избыточную дозу или ребенок по ошибке проглотил препарат, немедленно обратитесь в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли принять препарат в положенное время, ни в коем случае не принимайте двойную дозу.

Не принимайте препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу каждый раз перед применением препарата. В случае необходимости пользуйтесь очками. Если у Вас имеются дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым лекарством, применение препарата способно вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них. При приеме в рекомендуемых дозах побочные явления маловероятны.

Прекратите применение и немедленно обратитесь к врачу, если возникнут:

- **Редкие** аллергические явления, описанные как: сыпь, зуд, затруднение дыхания и припухлость лица, полости рта или горла и анафилактический шок (тяжелая аллергическая реакция, опасная для жизни; возможные симптомы: низкое артериальное давление, шок, сердцебиение, затрудненное дыхание, бронхоспазм, реакции кожи, спазмы или боли в животе, рвота и диарея).
- Продолжительное применение препарата в высоких дозах может привести к росту уровня кальция/магния в крови, особенно у пациентов, страдающих нарушениями функции почек. Это может проявиться следующими симптомами: тошнота, рвота, проблемы желудка, диарея, утомляемость, мышечная слабость, спутанность сознания, усиление мочеиспускания, усиление чувства жажды и обезвоживание.
- Продолжительное применение в высоких дозах или в сочетании с большими количествами молока или молочных продуктов может вызвать "молочно-щелочной" синдром, проявляющийся высокими уровнями кальция в крови; могут появиться следующие симптомы: утрата вкусовых ощущений, головная боль, почечные нарушения, утомляемость и появление подкожных узелов.
- См. также раздел "Как следует применять препарат?".

Если появилось побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.au) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или по следующей ссылке: <https://forms.gov.au/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.au>

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- **Избегайте отравления!** Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. **Не вызывайте рвоту** без получения точных указаний врача!
- Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Условия хранения: Храните при температуре ниже +25°C.
- Храните в оригинальной упаковке.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к активным ингредиентам препарат также содержит: Sucrose, Talc, Xylitol 100, Pregelatinised maize starch, Cooling flavour, Mint flavour, Potato starch, Magnesium stearate, Light liquid paraffin. В каждой таблетке содержится 475 мг сахарозы.

Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:

Таблетки для жевания, квадратной формы, вогнутые, белого цвета с кремовым оттенком, иногда с небольшим количеством крапинок, с надписью "RENNIE" на обеих сторонах. Таблетки имеют освежающий мятный аромат. Утвержденный размер упаковки: 48 таблеток.

Владелец лицензии и адрес:

Байер Израиль Лтд., ул. ха-Хараш 36, Ход ха-Шарон 45240.

Производитель и адрес:

Дельфарм Гайар, Гайар, Франция.

Формат данной инструкции установлен Министерством Здравоохранения, содержание проверено и утверждено в Феврале 2016 года.

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 147 91 33516 00

RENN ICE TAB PL SH 240416