

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ
(ПРЕПАРАТЫ) – 1986**

Препарат продается без рецепта врача

**Стрепсилс Имбирь
Таблетки для рассасывания**

Действующие вещества:

Каждая таблетка для рассасывания
включает:

1.2 мг 2,4-дихлоробензилового спирта,
0.6 мг амилметакресола.

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg,
Amylmetacresol 0.6 mg.

Список неактивных компонентов:

см. пункт 6 – дополнительная информация.

**Перед началом применения данного
препарата внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.** Настоящая инструкция
включает краткую информацию о препарате.
Если у Вас имеются дополнительные
вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
Данный препарат выдается без рецепта
врача. Препарат предназначен для взрослых
и детей старше 6 лет. Лицам младше этого
возраста необходимо обратиться к врачу. Вам
следует использовать препарат надлежащим
образом. Проконсультируйтесь с фармацев-
том, если Вам необходима дополнительная
информация. При обострении признаков
(симптомов) заболевания или отсутствии
улучшения через 3 дня обратитесь к врачу.

1. Для чего предназначен препарат?

Антисептический препарат для облегчения
болей в горле у детей и взрослых.

Терапевтическая группа

Оба действующих вещества являются
антисептическими (обеззараживающими).
Применение таблетки для рассасывания
позволяет активным веществам
действовать в больном месте, а также
помогает смазать и успокоить больное
место.

2. Перед применением препарата

**Не следует пользоваться препаратом,
если:**

- Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к действующим веществам или к одному из других компонентов препарата (описаны в пункте 6).
- Препарат не предназначен для детей и младенцев младше 6 лет.
- Вы страдаете от нарушения толерантности к некоторым углеводам, таким как фруктоза, недостаточности всасывания глюкозы-галактозы и дефицита фермента сахарозы-изомальтазы. Эту информацию, как правило, следует уточнить у Вашего врача.

**Особенные предостережения, касающиеся
использования препарата:**

- Следует проконсультироваться с врачом, если Вы страдаете или страдали в прошлом от других заболеваний горла.

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и лактация

Не рекомендуется использовать этот препарат если Вы думаете, что Вы беременны, если Вы беременны или если Вы кормите грудью. Проконсультируйтесь с врачом перед приемом каждого препарата во время беременности или кормления грудью.

**Важная информация о некоторых
компонентах данного препарата**

Этот препарат содержит сахарозу и глюкозу. Если врач сказал Вам, что Вы страдаете от нарушения толерантности к некоторым углеводам, следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений Вам следует обратиться к врачу или фармацевту. Препарат должен раствориться во рту. Не жевать и не ломать таблетку для рассасывания. Следует медленно сосать таблетку, одну таблетку для рассасывания каждые 2-3 часа, максимум 12 таблеток для рассасывания в течение 24 часов.

**Не предназначено для детей младше 6 лет.
Необходимо помнить, что у маленьких
детей существует опасность удушья от
таблеток для рассасывания.**

Если Ваше состояние не улучшается в течение 3 дней, или если происходит какое-то необычное изменение Вашего состояния, следует обратиться к врачу.

**Не превышайте рекомендуемую
дозировку.**

**Если Вы по ошибке допустили передози-
ровку**

- Возможно Вы будете страдать от боли в животе.
- Прекратите прием препарата и проконсультируйтесь с врачом.

Не принимайте лекарственные препараты в темноте! При каждом приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся приема препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты

Как и при приеме любого лекарственного препарата, прием Стрепсилс Имбирь может привести к побочным эффектам у части потребителей.

**Побочные эффекты, проявляющиеся
редко**

- повышенная чувствительность
- кожный зуд

Необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

**Если один из побочных эффектов
обострился**, или Вы страдаете от побочных эффектов, не указанных в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

5. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту, не получив на это четких указаний врача.
- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке/картонной коробке/этикетке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- **Условия хранения:** храните при температуре ниже 25°C. Храните в оригинальной упаковке.

6. Дополнительная информация

- **В дополнении к действующим
веществам препарат включает:**
Tartaric acid, Anthocyanins (E163), Fruity plum flavour, Soothing cream flavour, Warm sensation flavour, Warm ginger spice flavour, Medium chain triglycerides, Liquid sucrose (1384 mg/таблетка для рассасывания), Liquid glucose (1102 mg/таблетка для рассасывания)
- **Как выглядит лекарство и что
включает упаковка:**
Круглые таблетки для рассасывания от красного до фиолетового оттенка. Каждая упаковка содержит 2, 8, 16 или 24 таблетки для рассасывания (возможно не все размеры упаковок будут выпущены в продажу).
- **Владелец лицензии и его адрес:** Рекит Бенкизер (Нир Ист) Лтд., ул. Ха-Нагар 6, Неве Неэман, Ход ха-Шарон 45240
- **Изготовитель и его адрес:** Рекит Бенкизер Хелфкер Интернешионал Лтд., Ноттингем, Англия.
- Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в сентябре 2013
- **Регистрационный номер лекарства из
государственного реестра Министер-
ства здравоохранения:**
150-72-33821-00