

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סטרפסילס® ג'ינג'ר לכסניות למציצה

חומרים פעילים:

כל לכסנית למציצה מכילה:

1.2 מ"ג 2,4-דיכלורובנזיל אלכוהול,

0.6 מ"ג אמילמטהקרוסול.

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg,

Amylmetacresol 0.6 mg.

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

תכשיר אנטיספטי להקלת כאבי גרון אצל ילדים ומבוגרים.

קבוצה תרפויטית

שני החומרים הפעילים הם אנטיספטיים (מחטאים). מציצת הלכסנית מאפשרת למרכיבים הפעילים לפעול באזור הכואב וכן עוזרת לסכך ולהרגיע את האזור הכואב.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).
- תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת גיל 6 שנים.
- אתה סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים כגון פרוקטוז, אי ספיגה של גלוקוז-גלקטוז ומחסור באנזים סוכראז-איזומלטהאז. מידע זה בדרך-כלל יש לוודא עם רופאך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- יש להתייעץ עם הרופא אם הינך סובל או סבלת בעבר מבעיות נוספות בגרון.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

לא מומלץ להשתמש בתרופה זו אם את חושבת שהינך בהריון, אם הינך בהריון או אם את מניקה. התייעצי עם הרופא לפני נטילת כל תרופה בעת הריון או הנקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה סוכרוז וגלוקוז. אם נאמר לך על-ידי רופאך כי אתה סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתכשיר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. התרופה חייבת להיות מומסת בפה. אין ללעוס או לשבור את הלכסנית. יש למצוץ הלכסנית לאט, לכסנית אחת כל 2-3 שעות, עד למקסימום של 12 לכסניות ב-24 שעות. לא מיועד לילדים מתחת לגיל 6 שנים. יש לזכור כי בילדים צעירים קיימת סכנת חנק מהלכסניות. אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים, או אם חל כל שינוי לא רגיל במצבך, יש לפנות לרופא. אין ליטול מעל המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

- ייתכן ותסבול מכאב בטן.
- הפסק ליטול את התכשיר והתייעץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס ג'ינג'ר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

תופעות המופיעות לעיתים רחוקות:

- רגישות יתר
- גירוד בעור

יש להפסיק את השימוש בתכשיר ולהתייעץ עם רופא. אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/קרטון/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C. אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Tartaric acid, Anthocyanins (E163), Fruity plum flavour, Soothing cream flavour, Warm sensation flavour, Warm ginger spice flavour, Medium chain triglycerides, Liquid sucrose (1384 mg/לכסנית), Liquid glucose (1102 mg/לכסנית)

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

- לכסניות עגולות בגוון אדום עד סגול. כל אריזה מכילה 2, 8, 16 או 24 לכסניות (ייתכן ולא כל גדלי האריזה ישווקו).
- בעל הרישום וכתובתו: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, רח' הנגר 6, נווה נאמן, הוד השרון 45240.
- שם היצרן וכתובתו: רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם, אנגליה.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: ספטמבר 2013.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 150-72-33821-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.