

فترص المَصَّ. يجب مَصَّ فترص المَصَّ ببطء، فترص المَصَّ واحد كل ٣-٢ ساعات، حتى الحد الأقصى ١٢ فترص للمَصَّ في ٤ ساعات. غير مخصص للأطفال دون عمر ٦ سنوات. يجب التذكرة أن خطر الاختناق من أفراد المَصَ قائم لدى الأطفال الصغار. إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال ٣ أيام، أو إذا طرأ أي تغيير غير عادي على حالتك، يجب التوجه إلى الطبيب. لا يجوز تناول أكثر من الجرعة الموصى بها.

- إذا أفرطت بالخطأ في تناول الجرعة
- من المحتمل أن تتعاني من آلام في البطن.
- توقف عن تناول المستحضر واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام!تحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

كل أي دواء، قد يسبب استعمال ستريپسيلس جينجر أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين.

الأعراض الجانبية التي تظهر في أوقات متباude:

- فرط التحسس
- حكة في الجلد

يجب إيقاف استعمال المستحضر واستشارة الطبيب.

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

٥. كيفية تخزين المستحضر؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) الذي يظهر على العبوة/الكرتون/الملصق. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:** يجب تخزين بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية. يجب تخزين في العبوة الأصلية.

٦. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Tartaric acid, Anthocyanins (E163), Fruity plum flavour, Soothing cream flavour, Warm sensation flavour, Warm ginger spice flavour, Medium chain triglycerides, Liquid sucrose (1384 mg), Liquid glucose (1102 mg) (فترص للمَصَ 1102 mg/فترص للمَصَ 1384 mg)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أفراد المَصَ مستديرة بلون أحمر إلى بنفسجي. تحتوي كل عبوة على ٢،٨،١٦ أو ٢٤ فترص للمَصَ (من المحتمل أن لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوقة).

صاحب التسجيل وعنوانه: ركيت بتكيزر (تيبر إبست) م.ض، شارع هنغار ٦، نفي نمان، هود هشارون ٤٥٢٤٠

اسم المنتج وعنوانه: ركيت بتكيزر هيلث كير إنترنشيونال م.ض..، نوتينغهام، إنكلترا.

فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: أيلول ٢٠١٣

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٥٠-٧٢-٣٣٨٢١-٠٠

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من هذا، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

نشرة طبية للمسنهاك بموجب أنظمة الصيادلة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

يُسوق الدواء بدون وصفة طبيب

ستريپسيلس جينجر أفراد المَصَ

المواد الفعالة:

كل فترص للمَصَ يحتوي على:

١.٢ ملغ ٤،٤ دي كلورو بنزيل الكحول،

٦ ملغ أميل ميتا كريسبول.

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2 mg,

Amylmetacresol 0.6 mg.

المواد غير الفعالة: أنظر بند ٦ - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. يصرف هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب. الدواء مخصص للبالغين والأطفال فوق عمر ٦ سنوات. ما دون هذا العمر يجب التوجه إلى الطبيب. يجب عليك استعمال الدواء بطريقة صحيحة. قم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم يطرأ عليها تحسن بعد ٣ أيام.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

مستحضر مطهر لتخفيف آلام الحق لدى الأطفال والبالغين.

الفصيلة العلاجية

كلتا المادتين الفعاليتين هما مُطهرتان. مَصَ فترص للمَصَ يمكن المركيبات الفعالة العمل بالمنطقة المؤلمة وأيضاً يساعد على ترلق وتلطيف المنطقة المؤلمة.

٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

٠ كنت حساساً (لديك حساسية) للمواد الفعالة أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (مفصلة ببند ٦).

٠ هذا الدواء غير مخصص للأطفال والرضع دون عمر ٦ سنوات.

٠ كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة مثل الفروكتوز، سوء الامتصاص للجلوكوز-چاكتوز ونقص باينزيم سوكراز إيزومالتاز. بشكل عام يجب التأكد من هذه المعلومات مع طبيب.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

٠ يجب استشارة الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل إضافية في الحق.

إذا كنت تتناول، أو تتناولت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

لا يوصى باستعمال الدواء إذا كنت تعقدين بأنك حامل، إذا كنت حاملاً أو مرضعة. استشيري الطبيب قبل تناول أي دواء أثناء الحمل أو الإرضاع.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

هذا الدواء يحتوي على السكروز والجلوكوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال المستحضر.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

يجب على الدواء أن يكون مذاباً في الفم. لا يجوز المصفع أو كسر