

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו ניבדק ואושר על ידו 02.2016
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מווקס טבליות

החומר הפעיל:

כל טבליה מכילה: ברומהקסין הידרוכלוריד 8mg Bromhexine Hcl
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6- "מידע נוסף"
ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו משווקת ללא מרשם רופא.

**תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם
נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.**

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים מתחת לגיל שנתיים-
עליך להשתמש בה בצורה נכונה. עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה מחמירים או אינם
משתפרים לאחר שבעה ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

מפחיתה צמיגות הליחה והכיח. התרופה מיועדת להקלה על הוצאת הכיח בזמן שיעול במצבים בהם
ישנה הצטברות ליחה בדרכי הנשימה

קבוצה תרפויטית: מפחיתי צמיגות הליחה והכיח.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים- ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
--

לפני הטיפול בתכשיר ספר לרופא אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת העיכול (כגון אולקוס), או מבעיות בכבד או בכליה.
- הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע לרופא המטפל לפני נטילת התרופה.
- הנך סובל משיעול עקשני או כרוני כדוגמת השיעול המתלווה לעישון, אסתמה, דלקת כרונית של הסימפונות, נפחת (emphysema), או שיעול המלווה בעודף ליחה, עליך להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

יש להפסיק את הטיפול באופן מיידי ולפנות לרופא מיד :

- קיימים דיווחים נדירים מאוד של תגובות עוריות חמורות כגון תסמונת Stevens Johnson ותסמונת Lyell's עם תכשירים המכילים ברומהקסין.
- אם הופיעו תגובות אלרגיות עם שלפוחיות ודימום בשפתיים, בעיניים, אף או איברי המין אלו יכולים להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה הדורשת התערבות רפואית מיידיית.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- טבליות מווקס מכילות לקטוז. אין לתת תכשיר זה לחולים הסובלים מבעיות תורשתיות נדירות של חוסר סבילות לגלקטוז (מרכיב בתוך הלקטוז) כגון מחלת galactosemia (ליקוי בתהליך הפיכת הגלקטוז לגלוקוז).
- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אנטיביוטיקה כגון אמפיצילין, אמוקסיצילין, אריתרומיצין, או אוקסיטטרהציקלין.

הריון והנקה

עליך להיוועץ ברופא טרם נטילת התרופה אם הינך בהריון או מניקה.

שימוש בילדים:

ילדים בגיל 2-6 שנים מומלץ להשתמש בתמיסה. שימוש בהוראת רופא בלבד.

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים מתחת לגיל שנתיים

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה לקטוז. אם אתה רגיש ללקטוז, יש לידע את הרופא לפני נטילת תרופה זו (ראה סעיף 6).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

מינון מקובל הוא בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: טבליה אחת, שלוש פעמים ביום.

ילדים 6-12 שנים: חצי טבליה, שלוש פעמים ביום

ילדים 2-6 שנים: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. מומלץ להשתמש בתמיסה.

מבוגרים: בשבוע הראשון של הטיפול ניתן להגדיל את המינון עד ל-2 טבליות, שלוש פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

אופן השימוש:

אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם הרבה מים. יש ליטול את התרופה עם או אחרי הארוחה. אפשר לחצות או לכתוש את הטבליה במידת הצורך.
אם נטלת בטעות מנת יתר מן התרופה, או בטעות הילד בלע מן התרופה יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו:

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בטבליות מווקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק השימוש בתרופה ופנה לרופא באופן מיידי אם:

- מתפתחות תגובות אלרגיות כולל פריחה, פריחה מגרדת בעור, עווית הסימפונות, תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות הפנים, הפה, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, העלולה לגרום לקשיי נשימה או בליעה (אנגיואדמה), אנפילקסיס (תגובה אלרגית חריפה).
- מופיעים פצעים חדשים בעור או ברירית, או הופעת קילוף בעור, שלפוחיות קשות עם דימום בשפתיים, בעיניים, בפה, באף או באיברי המין

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (משפיעות על פחות מ 1 מתוך 100 מטופלים)

בחילה
הקאה
אי נוחות בקיבה ובמעי
שלשול

תופעות לוואי נדירות (משפיעות על פחות מ 1 מתוך 1000 מטופלים)

תגובות אלרגיות
פריחה בעור
רגישות-יתר

תופעות לוואי המתחרשות במספר לא ידוע של מטופלים

הפרעות עיכול
כאב ראש
סחרחורת
עווית הסימפונות
שוק אנאפילקטי
עליה באנזימי הכבד (במחקרים)
הזעה
לחץ בבית החזה

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד! ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן במקום יבש וחשוך, מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose DC , microcrystalline cellulose (Avicel ph 102), croscarmellose sodium (Ac-Di-Sol), colloidal silicone dioxide (Aerosil 200), magnesium stearate, quinoline yellow lake (Color yellow dc 10)
כל טבליה מכילה 104 מ"ג לקטוז.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: טבליה צהובה, צד אחד עם כיתוב R, צד שני עם קו חצייה. 20 טבליות ארוזות בבליסטר.

בעל הרישום: ויטמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.
היצרן: רקח תעשייה פרמצבטית בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות **22.02.2016**

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

124-50-27560- 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.