

עלון לצרכן לפי תקנות הרחיקים (תכשירים) התשמ"א – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טפינלר 50 מ"ג

כל כמוסה מכילה: דבראפניב (כ-חמילטאט) 50 מ"ג dabrafenib (as mesilate) 50 mg

טפינלר 75 מ"ג

כל כמוסה מכילה: דבראפניב (כ-חמילטאט) 75 מ"ג dabrafenib (as mesilate) 75 mg

רשימת הרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה פנה למידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות בנושא, שאל את הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

טפינלר אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.

- למה מיועדת התרופה?**

טפינלר מיועדת היא תרופה המכילה את החומר הפעיל דבראפניב. היא משתמשת כטיפול יחיד או בשילוב עם תרופה אחרת המכילה סרמטיניב, לטיפול במבוגרים סבוג של סרטן עור הנקרא מלנומה:

• אשר כולל שינוי מסוים (מוטציה) בגן הנקרא "BRAF",

• אשר התפשט גם לחלקים אחרים בגוף או שלא ניתן להסירו באמצעות ניתוח

יתכן שהמוטציה בגן היא שגרמה להתפתחות המלנומה. טפינלר מיועד כלפי מלבוים שנוצרו מהגן השונה, ומאטה או עוצרת את התפתחות הסרטן שלך.

קבוצה תרפויטית: מעכב פרוטאין קינאזות.

- לפני שימוש בתרופה**

טפינלר יכולה לשמש רק לטיפול במלנומות עם שינוי (מוטציה) בגן ה- BRAF, כך שעלול כל הרופא שלך חיוב לקחת מתר דגימות של רקמת הגידול כדי לבדוק האם טפינלר מתאימה לך.

אם הרופא שלך מחליט שאתה תקבל טיפול משולב של של טפינלר וטרמטיניב, **קרא את העלון של טרמטיניב בעיון, כמו גם את העלון הזה**.

<div><div></div>אין להשתמש בתרופה אם: </div>
<div>אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).</div>
<div><div></div>בדוק עם הרופא שלך אם אתה סבור שזה חל עליך.</div>

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני הטיפול בטיפינלר, ספר לרופא אם אתה:**
 - סובל או שאי פעם סבלת **מבעיות כליה** כלשהן.
 - הרופא שלך עשוי לקחת דגימות דם לניטור לפקודי הכבד והכליה שלך בזמן שאתה לוקח טפינלר.
 - סבלת מסוג שונה של סרטן שאינו מלנומה, משום שאתה עלול להיות נסיכון גבוה יותר לפתח סוגי סרטן שאינם עוריים במשך נטילת טפינלר.**

א לפני שאתה לוקח טפינלר בשילוב עם טרמטיניב, הרופא שלך צריך לדעת אם:

יש לך בעיות לב כמו א ספיקת לב או בעיות באופן ה לבך פועם.

יש לך בעיות עיניים, כולל חסימה של הוריד המנקז את העין (*retinal vein occlusion*), או נפיחות בעין שיכולה לגרום על ידי דליפת נוזל (*chorioretinopathy*).

יש לך בעיות ריאה או נשימה כלשהן, כולל קושי בנשימה שלעיתים מלווה בשיעול יבש, קוצר נשימה ועייפות.

בדוק עם הרופא שלך אם אתה סבור שאחד מאלה חל עליך.

א מצבים שעליו להיזהר מפניהם

חלק מהאנשים הלוקחים טפינלר מפתחים בעיות אחרות, העלולות להיות חמורות. עליך לדעת על סימנים ותסמינים חשובים שעליו להיזהר מפניהם בזמן שאתה לוקח תרופה זו. חלק מהתסמינים הללו (דימום, חום, שינויים בעור של בועיות עיניים) מוזכרים בקצרה בסעיף זה, אך מידע מפורט יותר נמצא בסעיף 4 'תופעות לוואי'.

א דימום

נטילת טפינלר בשילוב עם טרמטיניב יכולה לגרום לדימום חמור, ובכלל זה במוח, במערכת העיכול (כמו בקיבה, בפי הטבעת או במעי), בריאות ובאזורים אחרים, ועולה לגרום למוות. תסמינים יכולים לכלול:

- כאבי ראש, סחרחורת, או הרגשת חולשה
- דם בצואה או צואה שחורה
- דם בשתן
- כאבי בטן
- שיעול דמי/הקאה דמית

א ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי באם אתה חווה אחד מתסמינים אלו.

א חום גבוה

תרופה זו עלולה לגרום לחום (למעלה מ-4) בסעיף 4). במקרים מסוימים, אנשים עם חום עלולים לפתח לחץ דם נמוך, סחרחורת או תסמינים אחרים. **ספר מיד לרופא או לרוקח שלך אם יש לך חום** בזמן שאתה לוקח תרופה זו.

א בעיות לב

• טפינלר עלולה לגרום לבעיות לב או לגרום להחמרה של בעיות לב קיימות, באנשים הלוקחים טפינלר בשילוב עם טרמטיניב.

• **ספר לרופא שלך אם יש לך בעית לב.**
הרופא שלך יבצע בדיקות על מנת לבדוק שלך עובד בצורה תקינה לפני ובמהלך הטיפול המשולב שלך של טפינלר וטרמטיניב. ספר לרופא שלך אם אתה מרגיש כאילו הלב שלך הולם, מאיץ או פועם בצורה בלתי סדירה, או אם אתה חווה סחרחורת, עייפות, קוצר נשימה או נפיחות של הרגליים. במידת הצורך, הרופא שלך עשוי להחליט לקטוע את הטיפול שלך באופן זמני, או להפסיק אותו לחלוטין.

א שינויים בעור במהלך הטיפול ואחריו
הרופא שלך יבדוק את העור שלך לפני שתתחיל לקחת תרופה זו ובאופן קבוע בזמן שתלך אותה.

ספר מיד לרופא שלך אם אתה מבחין בשינוים כלשהם בעורך בזמן נטילת תרופה זו או לאחר הטיפול (ראה גם סעיף 4).

א בעיות עיניים

עליך לעבור בדיקת עיניים על ידי הרופא שלך בזמן שאתה לוקח תרופה זו.

ספר מיד לרופא שלך אם יש לך אדמומיות בעון וגירוי, ראייה מטושטשת, כאב בעיניים או שינויים אחרים בראייה במהלך הטיפול שלך (ראה גם סעיף 4).

• כאשר טפינלר ניתנת בשילוב עם טרמטיניב, היא עלולה לגרום לבעיות עיניים, כולל עיוורון.
טרמטיניב אינה מומלצת אם אי פעם הייתה חסימה של הוריד המנקז את העין (*retinal vein occlusion*). ספר לרופא שלך מיד אם אתה חווה את התסמינים הבאים של בעיות עיניים:
ראייה מטושטשת, איבוד ראייה או שינויים אחרים בראייה, נקודות צבעוניות בראייה או תילות (מראות של קווים מטושטשים סביב עצמים) במהלך הטיפול שלך. במידת הצורך, הרופא שלך עשוי להחליט לקטוע את הטיפול שלך באופן זמני, או להפסיק אותו לחלוטין.

קרא את העלון לגבי חום, שינויים בעור שלך ובעיות עיניים בסעיף 4 של עלון זה. ספר לרופא או לרוקח הרשומים. אם אתה מפתח כל אחד מהסימנים והתסמינים הבאים:

א בעיות כבד

כאשר טפינלר ניתנת בשילוב עם טרמטיניב, היא עלולה לגרום לבעיות בכבד שלך שעלולות להפתח למצבים חמורים כמו דלקת כבד (הפטטיס) וכשל כבד, העלולים להיות קטלניים. הרופא שלך יבדוק אותך באופן תקופתי. סימנים לכן שהכבד שלך אינו מתפקד כראוי יכולים לכלול:

- אובדן תיאבון
- בחילה
- הקאות
- כאב בטן
- הצהבת העור או לובן העיניים שלך (צהבת)
- שתן בצבע כהה
- גרד בעור שלך

פנה לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה.

א כאב בשריר

כאשר טפינלר ניתנת בשילוב עם טרמטיניב, היא עלולה לגרום לפירוק של רקמת השריר (תמש שריר - ראדומיוליוזיס). **פנה לרופא שלך** בהקדם האפשרי אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה.

• כאב בשריר

• שתן צהוב כתוצאה מנוזק לכליה

במידת הצורך, הרופא שלך עשוי להחליט לקטוע את הטיפול שלך באופן זמני, או להפסיק אותו לחלוטין.

א ילדים ומתבגרים

טפינלר אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים.
השפעותיה של טפינלר בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 אינן ידועות.

א תרופות אחרות וטיפנלר

לפני שאתה מתחיל טיפול ספר לרופא או לרוקח שלך אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או אם אתה עשוי לקחת, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חזונה.

תרופות מסוימות עשויות להשפיע על אופן פעילותה של טפינלר, או לגרום לעליה בסיכון לתופעות לוואי. טפינלר יכולה גם להשפיע על אופן פעילותן של תרופות אחרות.
אלו כוללות:

- תרופות **למניעת הרתה** (*אמצעי מניעה*) המכילות הורמונים כגון גלולות, זריקות או מדבקות
- וארפארין ואצנוקומרול, תרופות המשמשות **לדילול דם**
- דיגוקסין, משמשת לטיפול **בבעיות לב**
- תרופות לטיפול **בזיהומים ספרייטיים**, כגון קטוקונאזול, איטראקונאזול, וזיקונאזול ופוסאקונאזול
- חוסמי תעלות סידן מסוימים, המשמשים לטיפול **ביתר לחץ דם**, כגון דיילטיאזם, פלודיפין, ניקרדיפין, ניפדיפין או ורפאזמיל
- תרופות לטיפול **בסרטן**, כגון קאבאזיטאקסל
- תרופות מסוימות **להפחתת שומנים (ליפידים)** בדם, כמו גמפיברוזיל
- תרופות מסוימות המשמשות לטיפול **בבעיות פסיכיאטריות** מסוימות, כגון האלפרידול

- אנטיביוטיקות** מסוימות, כגון קלאריתרומיצין, דוקסיצילין וטליתרומיצין
- תרופות מסוימות ל**טיפול בשחפת** (TB), כגון ריפאמפיצין
- תרופות מסוימות המורידות רמות **כולסטרול**, כגון אטורבאסטאטין וסימבסטאטין
- תרופות מסוימות **המדכאות את מערכת החיסון**, כגון ציקלוספורין, טאקרולימוס וסירוליומוס
- תרופות **המפחיתות את החומציות בקיבה** כגון אומפראזול
- תרופות מסוימות **נגד דלקת**, כגון דקסאמתאזון ומתילפרדניזולין
- תרופות מסוימות לטיפול ב-**HIV**, כגון ריטונאביר, אמפרנאביר, אינדינאביר, דרונאביר, דלאורידין, אפאבירנד, פוסאמפרנאביר, לופינאביר, נלפינאביר, טיפראנביר, סאקווינאביר ואטאזאנאביר
- תרופות מסוימות המשמשות **לשיכון כאבים**, כגון פנטניל ומתדון
- תרופות לטיפול בהתקפים (**אפילפסיה**), כגון פניטואין, פנובארביטאל, פרימידון, חומצה ולפרואית או קארבאמאזפין
- תרופות **נגד דיכאון** כגון פנאזולון והתרופה הצמחית St. John’s wort (*הפיריקום*)

ספר לרופא או לרוקח שלך אם אתה לוקח את אחת מהתרופות האלו (או אם אינך בטוח). הרופא שלך עשוי להחליט להתאים את המינון שלך.

שמור רשימה של התרופות שאתה לוקח, כדי שתוכל להראות אותה לרופא או לרוקח שלך.

א הרוין, הנקה ופוריות

טפינלר אינה מומלצת במהלך הרוין.

• אם את בהריון, חושבת שיתכן או את בהריון או מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילת תרופה זו. טפינלר אינה מומלצת במהלך הרוין, מאחר והיא עלולה לפגוע בעובר.

אם את אשה המסוגלת להרות עליך להשתמש באמצעי מניעה אמין למניעת הרוין בזמן שאת לוקחת טפינלר ובמשך 4 שבועות אחרי שהפסקת לקחת אותה ולמכר 4 חודשים אחרי המנה האחרונה של טרמטיניב, כאשר ניתנת בשילוב עם טפינלר.

• תרופות למניעת הרוין המכילות הורמונים (כגון גלולות, זריקות או מדבקות) עלולות לא לפעול באותה היעילות בזמן שאת לוקחת טפינלר או טיפול משולב (טפינלר בנוסף לטרמטיניב).
עליך להשתמש באמצעי אמין נוסף למניעת הרוין, כגון אמצעי מניעה חוסם (לדוגמא קונדום), כך שלא תכנסי לרויון בזמן שלך לוקחת תרופה זו. התייעצי עם הרופא או הרוקח שלך.

אם בכל זאת נכנסת להרוין בזמן שלקחת תרופה זו, ספרי מיד לרופא שלך.

טפינלר אינה מומלצת בזמן הנקה.

כדי **ידוע** אם מרכיביה של תרופה זו יכולים לעבור לחלב אם.

אם את מניקה, או מתכננת להניק, עלייך לספר לרופא שלך. את הורפא שלך תחליטי האם תקחי תרופה זו או תניקי.

א פוריות - הן בגברים והן בנשים

מחקרים בעלילי חיים הראו כי המרכיב הפעיל דבראפניב עלול להפחית לאיכות את פוריות הגבר. בנוסף, ספירת הזרע בגברים הלוקחים טפינלר עלולה להיות נמוכה ויתכן שספירת הזרע שלהם לא תחזור לערכים התקינים לאחר שהם יפסיקו לקחת תרופה זו.

לפני התחלת הטיפול בטיפנלר, התייעץ עם הרופא שלך לגבי האפשרויות לשיפור הסיכויים שלך להביא ילדים בעתיד.

נטילת טפינלר עם טרמטיניב: טרמטיניב עלולה לפגוע בפוריות הן של גברים והן של נשים.

כאמ לעיל, יש שאלות נוספות לגבי השפעת התרופה על ספירת זרע, שאל את הרופא או הרוקח שלך.

א הנגיה ושימוש במכונות

לטיפנלר יכולות להיות תופעות לוואי שעלולות להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונות.

היימנע מנהיגה או משימוש במכונות אם יש לך בעיות בראייה שלך או אם אתה מרגיש עיף או חלש או אם רמות האגרניה שלך נמוכות.

תיאור של התופעות הללו ניתן למצוא בסעיפים 4 ו-4. התייעץ עם הרופא או הרוקח שלך אם אינך בטוח על כל דבר. אפילו החמלה, תסמינים ומצב הטיפול שלך עלולים להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

היימנן ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

היימנן המוקבל בדרך כלל של טפינלר גם כשנלקחת לבד או פעמיים ביום (מקביל למנה יומית של 300 מ"ג).

היימנן המוקבל של טרמטיניב, כאשר נלקחת בשילוב עם טפינלר, הוא 2 מ"ג פעם ביום.

הרופא שלך עשוי להחליט שאתה צריך לקחת מנה קטנה יותר אם תפתח תופעות לוואי.

אם הפחתת מנה מומלצת, טפינלר זמינה גם בכמוסות של 50 מ"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת, מאחר וזה עלול להגביר את הסיכון של תופעות לוואי.

א לקחת

בדל את הכמוסות בשלמותן עם מים, אחת אחרי השניה.
אין ללעוס או לרסק את הכמוסות, מאחר והן יאבדו את יעילותן.

קח טפינלר פעמיים ביום, על קיבה ריקה.
כלומר:

• אחרי נטילת טפינלר, עליך להמתין **לפחות שעה** לפני שתאכל, או

• לאחר אכילה, עליך להמתין **לפחות שעתיים** לפני שתלך טפינלר

קח טפינלר בבוקר ובערב, בהפרש של כ- 12 שעות. קח את מנות הבוקר והערב של טפינלר באותם הזמנים בכל יום. זה יבטיח את הסיכוי שתזכור לקחת את הכמוסות. אין לקחת את מנות הבוקר והערב של טפינלר בו זמנית.

אם לקחת טבעות מינון גבוה יותר

אם לקחת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איחק.

אם שכחת לקחת את התרופה

אם המנה שנשכחה היא באיחור של פחות מ- 6 שעות, קח אותה ברגע שתיזכר.

אם המנה שנשכחה היא באיחור של יותר מ- 6 שעות, דלג על המנה הזאת וקח את המנה הבאה שלך בזמן הרגיל. לא תמנר מכן המשך לקחת את הכמוסות בזמנים הקבועים כרגיל.

אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ לך ידי הרופא. אל תפסיק אלא אם הרופא או הרוקח שלך המליץ לך על כך.

אין לקחת תופות בחשיתך עליון.
בדוק התוית העמלה בכל **פעם** שהנך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

כיצד עליך לקחת טפינלר בשילוב עם טרמטיניב

• קח טפינלר בשילוב עם טרמטיניב בדיוק כפי שהרופא שלך מורה לך. אל תשנה את המנה שלך ואל תפסיק את נטילת טפינלר או טרמטיניב אלא אם כן הרופא שלך אומר לך.

• קח **טפינלר פעמיים ביום** וקח **טרמטיניב פעם ביום**. יתכן ויהיה טוב יותר עבורך אם תאמץ הרגל שבו תלך את שתי התרופות באותו הזמן בכל יום. מנת הטיפנלר צריכות להיות במרווחים של כ- 12 שעות.
טרמטיניב, כאשר ניתנת בשילוב עם טפינלר, ידעף שתלכת **או** עם מנת הבוקר של טפינלר או עם מנת הערב של טפינלר.

• קח את טפינלר ואת טרמטיניב על קיבה ריקה, לפחות שעה אחת לפני או שעתיים אחרי ארוחה. קח אותן בשלמותן עם כוס מלאה של מים.

• אם אתה שוכח לקחת מנה של טפינלר או של טרמטיניב, קח אותן ברגע שתזכר. אל תשלים מנות מופוספות, ופשוט קח את המנה הבאה שלך בזמן הרגיל שלך.

- אם נותרו פחות מ- 6 שעות עד למנה המתוכננת הבאה של טפינלר, הגללקחת פעמיים ביום.
- אם נותרו פחות מ- 12 שעות עד למנה המתוכננת הבאה של טרמטיניב, הגללקחת פעם ביום.

• אם אתה חווה תופעות לוואי, יתכן והרופא שלך יחליט שעליך לקחת מינון נמוך יותר של טפינלר ו/או טרמטיניב. קח את המנות של טפינלר וטרמטיניב בדיוק כמו שהרופא אומר לך.

4. תופעות לוואי

למזם בכל תרופה, השימוש בטיפנלר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרה שישמת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

בעיות דימום

טפינלר עלולה לגרום לבעיות דימום חמורות, במיוחד במוח שלך, כאשר נלקחת בשילוב עם טרמטיניב. פנה מיד לרופא וקבל מיד עזרה רפואית אם יש לך סימנים חריגים כלשהם של דימום. כולל:

- כאב ראש, סחרחורת או חולשה
- שיעול דמי או המחיל קרישי דם
- הקאה המכילה דם או שנראית כ"גרגרי קפה"
- צואה אדומה או שחורה שנראית כמו זפת

חום גבוה

נטילת טפינלר עלולה לגרום לחום ביותר מ- 1 מכל 10 אנשים. **ספר לרופא שלך מיד אם אתה מפתח חום (טמפרטורה >38.5°C או יותר) בזמן שאתה לוקח תרופה זו.** הוא יבצע בדיקות כדי לברר אם יש גורמים אחרים לחום ויטפל בבעיה.

במקרים מסוימים, אנשים עם חום גבוה עלולים לפתח לחץ דם נמוך וסחרחורת. אם החום חמור, הרופא שלך עשוי להמליץ שתפסיק לקחת טפינלר בזמן הטיפול בחום עם תרופות אחרות. ברגע שהחום יאוזן, הרופא שלך עשוי להמליץ שתתחיל לקחת טפינלר שוב.

מצבים לבביים

טפינלר יכולה להשפיע על הדרך שבה הלב שלך מזרים דם, כאשר נלקחת בשילוב עם טרמטיניב. סביר יותר שהיא תשפיע על אנשים שיש להם בעיה קיימת בלב. אתה תעבור בדיקות לבעיות כלשהן בלב בזמן שאתה לוקח טפינלר בשילוב עם טרמטיניב. סימנים ותסמינים לבעיות בלב כוללים:

- תחושה שלברך הולם, מאיץ, או פועם בצורה לא סדירה
- סחרחורת
- עייפות
- תחושת סחרחורת
- קוצר נשימה
- נפיחות של הרגליים

פנה בהקדם האפשרי לרופא אם אתה חווה תסמינים אלה, בין אם בפעם הראשונה או אם יש החמרה.

שינויים בעור

אם אתה מבחין בשינויים כלשהם בעור שלך בזמן נטילת תרופה זו, פנה לרופא או לרוקח שלך בהקדם האפשרי.

עד 1 מכל 10 אנשים הלוקחים טפינלר עלול לפתח סוג של סרטן עור הקרוי **סרטן עור של תאי קשקש (cusec)**. אחרים עלולים לפתח סוג של סרטן עור הנקרא **סרטן עור של תאי בסיס (BCC)**. בדרך כלל, שינויי עור אלה נשאים מקומיים וניתן להסירם בנייתוח וטיפול עם טפינלר יכול להמשיך ללא הפרעה.

חלק מהאנשים הלוקחים טפינלר עלולים גם להבחין בהופעתן של מלנומות חדשות. מלנומות אלה לרוב מוסרות בנייתוח וטיפול עם טפינלר יכול להמשיך ללא הפרעה. הרופא שלך יבדוק את העור שלך לפני שתתחיל לקחת טפינלר, וזא יבדוק אותו שוב מדי חודש בזמן שאתה לוקח תרופה זו וכן למשך 6 חודשים לאחר שתפסיק לקחת אותה. זאת כדי לחפש אחר סרטני עור חדשים כלשהם.

הרופא שלך גם יבדוק את הראש, הצוואר, הפה, בלוטות הלמפה שלך ואתה תעבור סריקות של החזה ואזור הקיבה שלך (קרואת סריקות CT) באופן קבוע. יתכן ותעבור בדיקות דם. בדיקות