

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אופטיב®

טיפות עיניים

הרכב:

מרכיבים פעילים:

Carboxymethylcellulose sodium (type 7M8SFPH) 0.325% w/v קרבוקסימתילצלולוז סודיום

Carboxymethylcellulose sodium (type 7H3SXF 10-15) 0.175% w/v קרבוקסימתילצלולוז סודיום

Glycerin 0.9% w/v גליצרין 0.9%

לפירוט מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם תסמינים מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה זמנית בצריבה, גירוי ואי נוחות הנובעים מייבוש בעין או חשיפה לרוח או לשמש. יכול לשמש להגנה בפני גירוי נוסף.

קבוצה תרפויטית:

משמש כחומר סיכה לעיניים יבשות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) למרכיבים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לפירוט מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
התמיסה שינתה את צבעה או אם היא עכורה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

בכדי להימנע מזיהום, אין לתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור על הבקבוק סגור היטב.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

- **המינון המקובל בדרך כלל הוא** טיפה אחת או שתיים בעין היבשה, לפי הצורך. אם היובש בעיניך לא משתפר תוך 3 ימים או התסמינים מחמירים, יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.
- **אין לעבור על המנה המומלצת.**
- אין לבלוע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

ניתן להשתמש בטיפות אופטיב® אם הנך מרכיב עדשות מגע.

אופן השימוש:

לפני השימוש, יש לוודא כי אריזת המיכל סגורה. השתמש אך ורק אם הסוגר השקוף שעל הבקבוק שלם. אל תשתמש אם התמיסה שינתה את צבעה או אם היא עכורה.

1. בכדי להימנע מזיהום, אין לתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור את הבקבוק סגור היטב.

2. יתכן ובקבוק הטיפות אינו מלא. הדבר נועד לאפשר שליטה טובה יותר על קצב הטפטוף.

3. כיצד להשתמש בטיפות: ראשית, רחץ את ידיך. הטה את הראש לאחור. בעזרת האצבע המורה, משוך כלפי מטה את העפעף התחתון, ליצירת מעין "כיס". יש לטפטף את התרופה אל תוך ה"כיס" שנוצר. עצום עינייך בעדינות. אין למצמץ. השאר בעינים עצמות למשך 1 עד 2 דקות.

4. לאחר השימוש בתרופה, שטוף היטב את ידיך בכדי לנקותן משאריות של תרופה.

אם תרופה זו נרשמה לך בנוסף לתכשיר עיניים אחר יש להמתין כ-5 דקות בין תרופה אחת לשנייה.

אין להשתמש בתרופה זו מעבר ל-28 ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באופטיב® עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא מיד אם הנך מרגיש אחת מהתופעות הבאות:

כאב בעין, שינויים בראיה, אודם או גירוי מתמשכים בעין ליותר מ-72 שעות או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה. כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/בקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

חיי מדף לאחר פתיחה ראשונה: 28 ימים.

אל תאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

אל תשתמש באופטיב® אם אתה מבחין שהתמיסה שינתה את צבעה או אם היא עכורה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Boric acid, Erythritol, Levocarnitine, Sodium borate decahydrate, Sodium citrate dihydrate, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Stabilized oxychloro complex (Purite®) and Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
אופטיב® 15 מ"ל תמיסת טיפות עיניים סטריליות בבקבוק רב מנתי.

מספר רישום התרופה: 145-45-32038-00

היצרן: אלרגן, קליפורניה, ארה"ב

בעל הרישום: אלרגן ישראל בע"מ

יבואן: טרדיס גת בע"מ, ת.ד. 7775, פתח-תקוה 49170.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 16.03.2015

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.