



نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة
(مستحضرات) - ١٩٨٦

إقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

إي.زي.غاز II

التركيب:

كل كيس من ٤ غرامات يحتوي على:

المواد الفعالة وكميتها:

Sodium Bicarbonate 2.21g, Citric Acid Anhydrous 1.53g,
Simethicone 0.04g

المواد غير الفعالة:

Maltodextrin, Sodium Saccharin, Orange Flavor

الفعالية الطبية:

الدواء مخصص:
١) لتخفيف الحرقة , حموضة في المعدة, صعوبات الهضم, واضطراب معدة
والغازات المرافقة لهذه الأعراض.
٢) للاستعمال في معاهد تصوير الأشعة: كإضافة لمادة التباين في فحص
التباين المزدوج لجهاز الهضم العلوي.

متى لا يجوز استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال هذا المستحضر لتحريك أجسام غريبة.
لا يجوز الاستعمال إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركبات الدواء.
لا يجوز الاستعمال في حالات انسداد المريء أو الشك بانسداد المريء.

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج:

إذا كنت حاملاً.
إذا كان استهلاكك للصدوديوم ممتد (تتبع حمية قليلة الصوديوم).
إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب و/
أو الأوعية الدموية, الكبد, من وذمة, مقدمة الارتجاج (تستّم حيلي), نزيف
في جهاز الهضم, علامات التهاب الزائدة الدودية (مثل: آلام بطن شديدة,
سخونة, تقيؤ).

تحذيرات:

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية القصوى الموصى بها لمدة ٢٤ ساعة.
لا يجوز تناول الجرعة الدوائية القصوى لفترة تتجاوز أسبوعين دون استشارة
الطبيب. حتى إذا كان المستحضر يخفف الأعراض في الجهاز الهضمي, ففي
حالة تكرارها يجب مراجعة الطبيب.
إذا كانت لديك حساسية لطعام ما أو دواء ما, عليك إعلام الطبيب بها
قبل تناول الدواء.
إذا كنت بصدد إجراء فحص للعصارات المعدة, لا يجوز تناول المستحضر
في الصباح قبل الفحص.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً, أو إذا أنهيت للتو العلاج بدواء آخر, عليك
إعلام الطبيب المعالج وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن
التفاعلات بين الأدوية, خاصة بالنسبة للأدوية التي تنتمي إلى المجموعات
التالية: تتراسيكلينات, سيبروفلوكساسين, ونورفلوكساسين (مضادات
حيوية), كيتوكونازول (مضاد للفطر).

الأعراض الجانبية:

بالإضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء, قد تظهر أثناء فترة استعماله
أعراض جانبية مثل: فواق (حازوقة) وعدم الراحة نتيجة الانتفاخ.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

رد فعل أرجي- حساسية (شرى, طفح جلدي أو رد فعل تأقني), وذمة
في الرجلين, آلام عضلات, صداع متواصل, تنفس بطيء, مذاق كزيب, وهن





شديد، تواتر التبول، فقدان الشهية (نادراً)، توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.
أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام فعليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال والرضع:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن أي عرض جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتناوله/تتناوله.

إجرعة الدواء الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

كإضافة في فحص التنظير الداخلي؛
البالغون والمسنون: يجب وضع محتوى كيس واحد على الجزء الخلفي من اللسان والابتلاع مع ١٥ ملل من الماء.
الأطفال: يحدّد الطبيب الجرعة حسب السنّ، الوزن والتجربة السابقة.

كمضادّ للحموضة والغازات:

يجب وضع نصف محتوى كيس واحد على الجزء الخلفي من اللسان والابتلاع مع ١٥ ملل من الماء.
يجب تكرار العملية ثانية مع بقية محتوى الكيس.

البالغون ما دون سنّ ٦٠: كيس واحد كل ٦ ساعات أو حسب تعليمات الطبيب. لا يجوز تناول أكثر من أربع أكياس خلال اليوم (٢٤ ساعة).
البالغين ما فوق سنّ ٦٠: كيس واحد كل ٨ ساعات. لا يجوز تناول أكثر من ٣ أكياس خلال اليوم (٢٤ ساعة).

الأطفال من ٦ إلى ١٧: كيس واحد كل ٨ ساعات. لا يجوز تناول أكثر من ٣ أكياس خلال اليوم.
هذا الدواء غير مخصص للاستعمال عادةً لدى الأطفال والرضع ما دون ٦ سنوات من العمر.

إنتبه/ي!

لا يجوز تناول هذا الدواء مع كميات كبيرة من الحليب ومستحضرات الحليب.
يجب الانتظار فترة زمنية من ساعة حتى ساعتين بين تناول هذا الدواء وتناول الأدوية الأخرى.

كيفية الاستعمال:

لا يجوز المضغ! يجب بلع الدواء مع الماء.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع طفل/ة بالخطأ من الدواء، عليك التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء.
لا تنسب/ي التقبيل بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
لا تتناول/ي دواء في الظلام! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين الدواء. ضع/ي النظارات الطبيّة إذا لزم الأمر لذلك.

التخزين:

في مكان بارد وجاف دون ٢٥ درجة مئوية.
تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى في ظروف التعليب/التخزين الموصى بها. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر! في أي حالة شك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: ١٢٥ ١٤ ٣٠٤٣١٠٠

المنتج: E-Z-EM Inc، الولايات المتحدة.

صاحب التسجيل: بروميدكوم.ض.ص.ب.، ٣٣٤٠، بيتج تكفا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة وفحص محتواها ورخص من قبلها في آذار ٢٠٠٧.

