

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

קופגוס 200 מ"ג טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מכילה: ריבווירין 200 מ"ג (ribavirin 200 mg) * למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון על סופו בוטרם שתשתמש בתרופה מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב עבורך.

- שמור את העלון. ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא שלך או אל הרוקח.
- תרופה זו הרשמה עבורך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
- אם יש לך תופעות לוואי, פנה לרופא שלך או לרוקח. זה כולל תופעת לוואי אפשרית אשר אינה מצוינת בעלון זה (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

מידע חשוב לעיונך

- התרופה **קופגוס** ניתנת כחלק מטיפול משולב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או עם אינטרפרון אלפא-2a, לטיפול בדלקת כבד נגיפית מסוג C. כרונית מסוג C.
- תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.
- התרופה **קופגוס** עלולה לגרום נזק רק לעובר. לכן, חשוב מאוד שנשים המטופלות בתופעה **קופגוס** ימנעו מכניסה להיריון במהלך הטיפול ובמהלך 4 חודשים לאחר תחילת הטיפול (ראה סעיף - "היריון והנקה").
- הקדשה על החתום הרופא (מינון, ומשך טיפול) מגדילה את יעילות הטיפול, בכל מקרה, אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא המטפל. אנא עיין בסעיפים 2 ו- 4 למידע ביטחוני מורחב.

1) למה מיועדת התרופה?

ריבווירין, המרכיב הפעיל האנטי-ויראלי של התרופה **קופגוס**, עוצר את ההתרבות של סוגי וירוסים רבים, כולל וירוסים הגורמים לדלקת כבד נגיפית כרונית מטוג (הנקרזית הפטיטיס C).

התרופה **קופגוס** מטוג כחלק מטיפול משולב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או עם אינטרפרון אלפא-2a, לטיפול בדלקת כבד נגיפית כרונית מסוג C (זיהום ויראלי של הכבד). היא ניתנת לחולים מבוגרים אשר טופלו בעבר או לא טופלו בעבר בגין דלקת כבד נגיפית כרונית מסוג C.

התרופה מיועדת גם, בשילוב עם פגאניטרפרון אלפא-2a, לטיפול בזיהום משולב בגיטת ה- HIV ובדלקת כבד נגיפית כרונית מסוג C.

יש להשתמש ב**קופגוס** רק בשילוב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a. אין לטיפול **קופגוס** לבד.

קרא בעיון גם את העלון לצרכן של פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a בטרם תתחיל בטיפול.

קבוצה תרפויטית

תרופות אנטי-ויראליות מסוג מעכב נוקלואזיד.

2) לפני השימוש בתרופה

❗ אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך רגיש (אלרגי) לריבווירין או לכל אחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").
- הנך בהיריון או אם הנך מניקה (ראי סעיף "היריון והנקה").
- עברת התקף לב או סבלת ממחלת לב חמורה כלשהי בחצי שנה האחרונה.
- הנך סובל ממחלת כבד מתקדמת (למשל אם העור שלך מצהיב ויש לך עורף נוזלים באזור הבטן).
- הנך סובל מבעיה בדם כמו בתלסמיה או אנמיה חרמשתית (היחלשות והרס של תאי הדם האדומים).
- הנך סובל מזיהום משולב בנגיף ה- HIV ובדלקת כבד נגיפית כרונית מסוג C, והנך סובל גם ממחלת כבד מתקדמת - במקרים מסוימים אין להתחיל טיפול משולב ב**קופגוס** ופגאניטרפרון אלפא-2a. הרופא המטפל שלך יקבע אם זהו המצב.

קרא גם את העלון לצרכן של פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a לצורך קבלת מידע נוסף.

Ⓜ אזרות מיוחדת הנגועות לשימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הנך אישה בגיל הפוריות (ראי סעיף "היריון והנקה").

אם הנך גבר ובת-זוגך נמצאת בגיל הפוריות (ראה סעיף "היריון והנקה").

אם הנך סובל מבעיה לבבית. במקרה כזה עליך להיות במעקב. מומלץ לבצע רישום של פעילות הלב (א.ק.ג. או אלקטרוקרדיוגרם) לפני תחילת הטיפול ובמהלכו.

אם אתה מתכנן לפתח בעיה לבבית יחד עם עייפות מוגברת. זה יכול לנובע מאנמיה כתוצאה מהטיפול ב**קופגוס**.

אם הייתה לך בעבר אנמיה (באופן כללי, הסיכון להתפתחות אנמיה גבוה יותר בנשים בהשוואה לגברים).

אם הנך סובל מבעיה כלכלית. ייתכן שיהיה צורך להפחית את המינון של **קופגוס**.

אם עברת השתלת איבר (כמו השתלת כבד או השתלת כליה) או שמתוכננת עבורך השתלה כזו בעתיד הקרוב.

אם אתה פותח תסמינים של תגובה אלרגית, כגון: קשיי נשימה, צפצופים בנשימה, התנפחות פתאומית של העור ושל הקולנויים הריניים, גרד או פריחה. הפסק מיד את הטיפול ב**קופגוס** ופנה מיידי לקבלת עזרה רפואית.

אם סבלת בעבר מדיכאון או פיתחת תסמינים שקשורים בדיכאון (כגון): תחושת עצבות, ייאוש וכדומה) תוך כדי טיפול ב**קופגוס** (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

אם יש לך כעת או הייתה לך בעבר בעיית התמכרות (למשל התמכרות לאלכוהול או לסמים).

אם הנך מתחמת לגיל 18. היעילות והבטיחות של **קופגוס** בשילוב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a לא נבחנה בצורה מספקת במטופלים מתחת לגיל 18.

אם הנך סובל גם מזיהום בנגיף ה- HIV ומטופל בתכשירים רפואיים כנגד HIV.

אם הפסקת טיפול קודם בדלקת כבד נגיפית כרונית מסוג C עקב אנמיה או ספירת דם נמוכה.

אם הנך מעל גיל 65.

אם הנך אישה אחת להפריית, עליך לבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול ב**קופגוס**, בגיל לידוש במהלך הטיפול ובמהלך 4 חודשים לאחר סיום הטיפול (ראי סעיף "היריון והנקה").

תופעות הלוואי החמורות הבאות קשורות במיוחד לטיפול המשולב של **קופגוס** עם אינטרפרון אלפא-2a או פגאניטרפרון אלפא-2a, נא עיין בעלונים של תכשירים אלו למידע רחב יותר על הנושאים הבטיחותיים הבאים:

השפעות פסיכיאטריות ושל מערכת העצבים המרכזית (כמו דיכאון, מחשבות אובדניות, ניסיון התאבדות, התנהגות תוקפנית וכד'). עליך לפנות לחצר מידי אם הנך מרגיש דיכאון, חוסש מחשבות אובדניות או אם התנהגותך משתנה. ניתן מרשוק לבקש מקורב שמספה או מחבר קרוב לסייע לך להיות ערני לסימנים של דיכאון או לשינויים בהתנהגות. הפרעה חמורה בעיניים.

הפרעות בשיניים ובחניכיים - דווחו מקרים של הפרעות בשיניים ובחניכיים במטופלים אשר קיבלו טיפול משולב של **קופגוס** ופגאניטרפרון אלפא-2a. עליך לרצות שיניים בוסודיות פעמיים ביום ולעבור בדיקות דנטליות באופן סדיר. בנוסף, חלק מן המטופלים עלולים לסבול מהקאות. אם הנך סובל מהקאות, עליך לשתף את הפה ביסודיות לאחר מכן.
עצירת הגדילה ביולדים ובמתבגרים, אשר בחלק מן המטופלים עלולה להיות בלתי הפיכה.

קופגוס ותרופות אחרות

אם אתה לוקח או תוקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תרופות נגד HIV: כגון: זידובודין (zidovudine), סטאוודין (stavudine), אזאתיופריין (azathioprine) ודידאנוזין (didanosine).

חמצת לקטית (Lactic acidosis) (הצטברות של חומצה לקטית בגוף קשורתמ לדם להפוך להיות חומצית) והחמרה בתפקודי כבד הן תופעות לוואי שקשורות בטיפול נגד HIV מסוג HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy). אם הנך מטופל ב- HAART, הוספת **קופגוס** לפגאניטרפרון אלפא-2a או לאינטרפרון אלפא-2a עלולה להגביר את הסיכון שלך לחמצת לקטית או אי-ספיקת כבד. הרופא המטפל יבצע מעקב אחר סימנים סימפטומים למצבים אלה.

אם הנך נוטל זידובודין (zidovudine) או סטאוודין (stavudine), משום שאתה חיוב לגניף ה- HIV או משום שאתה סובל מאיידס: ייתכן ש**קופגוס** תפחית את השפעת התרופות הללו. לכן, יש לערוך בדיקות דם באופן סדיר, כך לוודא שילתי החמרה בזיהום ה- HIV. במקרה של החמרה, ייתכן שהרופא המטפל ישלח להפסיק את הטיפול ב**קופגוס**. כמו כן, מטופלים שנוטלים זידובודין (zidovudine) בשילוב עם **קופגוס** ואינטרפרונים מסוג אלפא או בסיכון מוגבר להתפתחות אנמיה.

אם נמומלץ לשלב **קופגוס** עם דידאנוזין (didanosine) (שממשש לטיפול HIV). תופעות לוואי מסוימות של דידאנוזין (כגון: בעיות בכבד, עקצוץ וכאבי ברונות) או/ו בכפופת הרגליים, דלקת בלבלב) עלולות להתרחש בתדירות גבוהה יותר.

מטופלים אשר מכילים אצאתיופריין (azathioprine) בשילוב עם **קופגוס** ופגאניטרפרון ממצבים אבדון גבוה לפתח הפרעות חמורות במספרת הדם.

קרא בעיון את העלון לצרכן של פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a כדי לוודא שהנך יודע איזו תרופות אתה יכול לטול במהלך הטיפול בכל אחת מתרופות אלה.

התרופה **קופגוס** עלולה להישאר בגופך למשך חודשיים. לכן עליך להתייעץ עם הרופא המטפל שלך או עם הרוקח לפני תחילת טיפול בכל אחת מן התרופות המוזכרות בעלון זה.

שימוש בתרופה בעלון זה

טבליות **קופגוס** בדרך כלל נלקחות פעמיים ביום (בוקר וערב) יחד עם האוכל ויש לבלוע אותן בשלמותן.

היריון והנקה

אם הנך בהיריון או מניקה, חושבת כי הנך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, עלייך להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופת.

אם הנך בהיריון או מניקה, חושבת כי הנך בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, עלייך להיוועץ בשורת ארץ ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

התרופה **קופגוס** עלולה לגרום נזק רק לעובר; היא עלולה לגרום למומים מולדים. לכן, חשוב מאוד שנשים מניקות ב**קופגוס** ימנעו מכניסה להיריון במהלך הטיפול ובמהלך 4 חודשים לאחר הטיפול.

התרופה הפעיל עלולה לגרום נזק לזרע ועל-ידי כך פלגוע בעובר. לכן חשוב מאוד שבנות זוג של גברים המטופלים ב**קופגוס** ימנעו מכניסה להיריון במהלך הטיפול ובמהלך 4 חודשים לאחר הטיפול של הגבר.

אם הנך **אישה** בגיל הפוריות המטופלת ב**קופגוס**, עליך לשלול קיום היריון לפני תחילת הטיפול (בדיקת היריון שלילית), חוסש לחודש במהלך הטיפול ובמהלך 4 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל כנגד היריון במשך כל התקופה שבה את נוטלת **קופגוס** ובמשך 4 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. ניתן לדון על הנושא עם הרופא המטפל. אם בן-זוגך מטופל ב**קופגוס**, קראי את הפסקה הבאה "אם הנך גבר".

אם הנך **גבר** המטופל ב**קופגוס**, אל תקיים יחסי מיין עם אישה בהיריון ללא שימוש בקונדום. זהו יפחית את הסיכון שיהיו ייבא שגוף האישה. אם בת-זוגך אינה בהריון כרגע אך נמצאת בגיל הפוריות, עליה לעשות בדיקת היריון אחת לחודש במשך כל התקופה שבה אתה נוטל **קופגוס** ובמהלך 4 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. אתה או בת-זוגך חייבים להשתמש באמצעי מניעה יעיל נגד היריון במשך כל התקופה שבה אתה נוטל **קופגוס** ובמשך 4 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. ניתן לדון על הנושא עם הרופא המטפל. אם בת-זוגך מטופלת ב**קופגוס**, קרא את הפסקה "אם הנך אישה".

אל ידוע אם התרופה **קופגוס** מופרשת בחלב אם. אין להניק במהלך הטיפול ב**קופגוס** משום שהתקה עלולה לגרום נזק לתינוק. אם הטיפול ב**קופגוס** הכרחי, יש להפסיק את ההנקה.

ניהוג ושימוש במכונת

לטיפול ב**קופגוס** יש השפעה מעטה מאוד על יכולת הנהיגה והפעלת מכונות.

פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a עלולים לגרום לשינויות, עייפות או בלבול, במידה ואתה מפתח סימפטומים אלה, אל תנהג ברכב ואל תשתמש בכלים או במכונות.

3) כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש בתרופה זו בדרך לפי הוראות המפרט. עליך לבידוק אם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. הרופא שלך וחילטי לגבי המינון המתאים עבורך כתלות במשקלך. בסוג הוורוס ממנו אתה סובל ובתרופה שאתה לוקח בשילוב עם **קופגוס**.

מינון מקובל

המינון הטיפו לטיפול יקבע על-ידי הרופא בלבד. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

המינון המומלץ של **קופגוס** נג בין 800 ל-1,200 מ"ג ליום.

משך הטיפול משתנה כתלות בסוג הוורוס שגרם לזיהום, בתגובה לטיפול, אם כבר קיבלת בעבר טיפול למחלתך ואם קיים זיהום משולב בנגיף ה- HIV.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

בדרך כלל מקובל לטול **קופגוס** טבליות פעמיים ביום (בוקר וערב).

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם האוכל.

אין ללעוס!

אין לכתוש או לחצות את הטבליות!

מאחר שריבווירין הוא חומר טרטוגני (עלול לגרום למומים מולדים), יש לטפל בטבליות בשיטות **ואינ לחצות או לכתוש אותן**. אם נגעת בטעות בטבליות שניזוקו, שטוף ביסודיות במים וסבון ואל את חלקי הגוף שבאו במגע עם תכולת הטבליות. אם חלק כלשהו מן האבקה של הטבליות חדר לתוך העיניים, שטוף את העיניים ברכ ביסודיות במים סטריליים, ואם אין ברשותך מים סטריליים - במי ברך.

אם יש לך את הרושם שההשפעה של **קופגוס** חזקה מדי או חלשה מדי, פנה לרופא המטפל או לרוקח.

אם ישנן תופעות לוואי במהלך הטיפול, ייתכן שהרופא המטפל ישנה את המינון או יפסיק את הטיפול.

קופגוס ניתנת בשילוב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a. עיין גם בעלון לצרכן של פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a עבור המינון של תרופות אלה.

בדיקות מעקב

לפני תחילת הטיפול בתרופה **קופגוס** יש לבצע בדיקת תפקודי כליות בכל המטופלים וכן לערוך בדיקות דם. יש לחזור על בדיקות דם לאחר 2 -1 שבועות מתחילת הטיפול ולאחר מכן בתדירות שנקבעה על-ידי הרופא המטפל.

במהלך הטיפול ה**קופגוס** הרופא המטפל יערוך לך בדיקות דם באופן סדיר, כדי לעקוב אחר שכמו בספירת תאי הדם הלבנים (תאים שנלחמים בזיהומים), תאי הדם האדומים (תאים שנושאים חמצן), טסיות הדם (תאים שאחראים לקרישת דם), בתפקודי כבד או בשינויים בערכי מעבדה אחרים.

אם נטלת טבעות מניון גבוה יותר, עליך ליצור קשר עם הרופא או הרוקח בהקדם האפשרי.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחזור מינון של תרופה והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שאתר לטול תרופה זו בזמן הירוש יש לטול אותה מדי כשמצרכת ולקחת את המנה הבאה בזמן הרגיל שנקבע לה. אין לטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה ששכחתי.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

הפסקת טיפול: גם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

רק הרופא המטפל יכול להחליט אם להפסיק את הטיפול שלך. אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם רופא, משום שהמחלה, עברה אתה מטופל, עלולה לחזור או להחמיר.

יצעד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

אין לטול תרופות בחושך! בדיק את התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכיב מספקיים אם הנך זקוק להם.

אם יש שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4) תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש ב**קופגוס** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

דווח לרופא שלך באופן מיידי אם אתה מבחין בתופעות הלוואי הבאות: כאבים חמורים במוח והחזה; שיעול עיקש; דופק לא סדיר; קשיי נשימה; לבלול; דיכאון; כאבים גמורים בבטן; דם בצואה (או צואה שחורה); דימום חמור מן האוזן; חום גבוה או צמרמורת; בעיות בראייה.

תופעות הלוואי הללו כולן עלולות להתרחש כאשר נוטלים **קופגוס** בשילוב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a. תופעות הלוואי הללו עלולות להיות חמורות וייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שיכוחת מאוד בשילוב של **קופגוס** עם פגאניטרפרון אלפא (עשויות להשפיע על יותר מ- 1:10 מטופלים):

אנמיה (ספירה נמוכה של תאי הדם האדומים), ניטרופניה (ספירה נמוכה של תאי הדם הלבנים); אובדן תיאבון; תחושת דיכאון (הרגשת נחיתות, או שינויים במצב הרוח, חרדה, תוקפנות, עצבנות, ירידה בחשק המיני; קשיי ריכונ וסחרחורת); שיעול, קוצר נשימה; לבלול, כאבי בטן; שיגרת שיער, תגוברות עוריות (כגון: גרד, דלקת בעור, יובש בעור); כאבי מפרקים ושרירים; חום גבוה, חולשה, עייפות, רעד, צמרמורות, כאב ורגזנות (נטייה להתרגז בקלות).

תופעות לוואי שיכוחת בשילוב של **קופגוס** עם פגאניטרפרון אלפא (עשויות להשפיע על עד 1:10 מטופלים):

זיהום דרכי נשימה עליונות, דלקת סימפונות (ברונכיטיס), זיהום פטרייתי (פה), הרפס (זיהום ויראלי שכוח חוזר המשפיע על השפתיים והפה); בלוטות דיכאון; כאבים גמורים בבטן; דם בצואה (או צואה שחורה); דימום חמור מן האוזן; חום גבוה או צמרמורת; בעיות בראייה. תופעות הלוואי הללו כולן עלולות להתרחש כאשר נוטלים **קופגוס** בשילוב עם פגאניטרפרון אלפא-2a או אינטרפרון אלפא-2a. תופעות הלוואי הללו עלולות להיות חמורות וייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף.

תופעות לוואי שיכוחת מאוד בשילוב של **קופגוס** עם פגאניטרפרון אלפא (עשויות להשפיע על עד 1:10 מטופלים):

זיהום דרכי נשימה עליונות, זיהום דרכי השתן, זיהום פטרייתי (פה), הרפס (זיהום ויראלי שכוח חוזר המשפיע על השפתיים והפה); ספירת טסיות נמוכה (פוגע בקרישת הדם), בלוטות למפה מוגדלות; פעילות-יתר ותת-פעילות של בלוטות התריס (התירואיד); שינויים רגשיים או שינויים במצב הרוח, חרדה, תוקפנות, עצבנות, ירידה בחשק המיני; ירידה ביחרכו, עלפון, ירידה בכוח השרירים, מיגרנות, חוסר תחושה, עקצוץ, תחושת בעירה, רעד, שינויים בחוש הטעם, סיטום, ישנוניות; טקטשו בראייה, כאב בעיניים, דלקת בעיניים, יובש בעיניים; תחושת סחרור, כאב באוזניים, אצלוליים באוזניים; קצב לב מהיר, דפיקות לב חזקות, נפיחות בכפות הידיים והרגליים; הסמקה, לחץ דם נמוך; קוצר נשימה במאמץ, דימומים המואצים, דלקת באף וברגון, זיהומים של האף והסינוסים (מרוחני האוזר והמצואץ), בצמנות הפנים והראש), מולת, כאב גרון; הקאות. קשיי עיכול, קשיי בליעה, כיובים בפה, דימום מהחניכיים, דלקת של הלשון והפה, כמות מוגברת של אוויר או גזים בבטן, עצירות, יובש בפה; פריחה, הזעה מוגברת, פסוריאזיס (ספחת), סרפדת, אקזמה, רגישות לאור שמש, הזעות לילה; כאבי גב, דלקות מפרקים, חולשת שרירים, כאבי עצמות, כאבי צוואר, כאבי שרירים, התכווצויות שרירים; אין-אונות (חוסר יכולת לשמור על יזפה); כאבים בחזה, מחלה דמוית שפעת, תחושה לא טובה, תשישות, גלי חום, יצמאון וירידה במשקל.

תופעות לוואי לא שיכוחת בשילוב של **קופגוס** עם פגאניטרפרון אלפא (עשויות להשפיע על עד 1:100 מטופלים):

זיהומים דרכי נשימה תחתונות, זיהומים דרכי השתן, זיהומים בעור; Sarcoidosis (אזורים של רחמיים דלקתיים פסיכוסית בנגוף), דלקת של בלוטות התריס (התירואיד); סוכרת (רמה גבוהה של סוכר בדם); התייבשות; מחשבות אובדניות, הזיות, כעס; אובדן שמיעה; מחלת עצבים פריפרית (הפרעה בעצבים המשיפיעים על הגפיים); דימום ברשתית העין (החלק האחורי של העין); לחץ דם גבוה; צפצופים בנשימה; דימום במערכת העיכול, דלקת באזור השפתיים; דלקת חניכיים; ירידה בתפקודי כבד.

תופעות לוואי נדירות בשילוב של **קופגוס** עם פגאניטרפרון אלפא (עשויות להשפיע על עד 1:10,000 מטופלים):

אנמיה אפלטטית (כישולן של מח העצב ליציר תאי דם אדומים, דימום לבני וטסיות); ITP או תTP (מחלה שמתבטאת בפגיעה מוגברת, תאיים שונים ירידה בכמות הטסיות, מחלה וחולשה קיצונית); אובדן ראייה; כאב גב; שוים של פרוחות בדרגות חמורה שונות, שעלולות להיות מלות בשלפוחית בפה, באף, בעיניים ובקרומים ריניים אחרים (Stevens Johnson syndrome/Erythema multiforme), אנגיואדמה (מחלה שמתבטאת בנפיחות בעור ובריריות).

תופעות לוואי בתדירות לאי זיהוע:

Pure Red Cell Aplasia (צורה קשה של אנמיה בה יש ירידה או הפסקה של ייצור תאי דם אדומים), תופעה זו עלולה להוביל לתסמינים כגון תחושה של עייפות רבה וחוסר אנרגיה; חדיית שתל כבד או כליה; Pure Red Cell Aplasia (מחלה נדירה המתבטאת באובדן ראייה, אובדן שמיעה והופעת פיגמנטציה בעור); מאניה (אירועים של עלייה קיצונית במצב הרוח) והפרעות דיו קונטינות (אירועים של עלייה קיצונית במצב הרוח המתחלפות לסיטוינן בעצבות וחוסר תקווה); צורה נדירה של היפרדות התרשים עט גנוזלים ברשתית; קולטיסי אצוסמית (אספקת דם אל מספקת למעי), קולטיסי כביית (דלקת של המעי הגס הגומרת להופעת כיובים, אשר גומרת לשלשולים); שינויים בצבע הלשון; פגיעה חמורה וכאבים בשרירים; תפקוד בלתי מספק של הכליות, עדות כלשהי לבעיה אחרת בכליות.