

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها
مُحسّن ورُخص في أيلول ٢٠١٤
نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) ١٩٨٦
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

لاريام ٢٥٠ أقراص



التركيب:

يحتوي كل قرص على:

٢٧٤,٠٠٩ mg مفلوكوين هيدروكلوريد (= ٢٥٠ mg مفلوكوين أساسي)

Mefloquine Hydrochloride 274.09 mg (= Mefloquine base 250 mg)

* معلومات عن المواد غير الفعالة انظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

إقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
إحفظ النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

معلومات هامة اقرأها بتعمق

- المقدار الدوائي للدواء يتغير حسب هدف العلاج: لعلاج الملاريا أو لمنعها.
- الدواء يحوي ككتوز.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

تأثيرات الدواء الطبية:

لمعالجة وللمنع داء الملاريا المقاوم للمستحضرات الأخرى المضادة للملاريا.
لاريام يعمل عن طريق إعادة الطفيليات التي قد تسبب الملاريا أو سببت الملاريا.
الفصيلة العلاجية: من المستحضرات المضادة للملاريا من فصيلة الكينولونات (quinolones).

أين وكيف تتلقى العدوى بالملاريا؟

الملاريا هو مرض تلوثي شائع في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية من إفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا وفي دول تطل على شواطئ المحيط الهادي، للملاريا عدة أنواع مختلفة، كل نوع يسبب طفيلي معين وينتقل لبني البشر عن طريق وخزة بعوضة الأنوفيليس (Anopheles).

وسائل الحذر من الملاريا

- إن تجنب وخز البعوض هي الطريقة الأفضل للوقاية من الملاريا. إن البعوضة التي تسبب الملاريا تقوم بالوخز خاصة بين ساعات المغرب حتى الفجر. لذلك، يوصى باتخاذ وسائل الحذر التالية:
- خلال هذه الساعات، يجب ارتداء الملابس فاتحة اللون التي تغطي جلدك ما أمكن.
- استعمل مستحضر طارد للبعوض على الجلد المكشوف والألبسة الخاصة بك.
- عند النوم في غرف ليست محمية من البعوض، يجب استعمال شبكة بعوض ناعمة والتي يجب طيها جيدا من تحت الفراش.
- دخان لولبي، بخاخات الحشرات والمصايغ توفر حماية إضافية.

أعراض الملاريا

يمكن لأعراض الملاريا أن تكون خفيفة في أغلب الأحيان. مع ذلك، يجب الشك بالملاريا إذا كنت تعاني بعد أسبوع من موكوك في منطقة مصابة بالملاريا من سخونة مجهولة السبب مع أو بدون أعراض أخرى مثل صداع، إلام في أعضاء الجسم، ضعف، رجفة، قشعريرة وأحيانا إسهال، تقوُّات وسعال، يمكن بسهولة البلبلة بين هذه الأعراض مع أعراض الإنفلونزا.

إذا كانت تلك الأعراض هي نتيجة النوع الأخطر من الملاريا الذي يسببه طفيلي فالسيپاروم (falciparum)، ولم يتم معالجتها في الوقت، فقد يحدث خلال فترة قصيرة ضرر خطير للأعضاء، فقدان الوعي والوفاة. إن الأنواع الأقل خطورة من الملاريا، التي لا تشكل خطرا على الحياة، يمكن أن تتفشى بعد أشهر أو حتى سنوات من إنتهاء الموكوك في منطقة مصابة بالملاريا.

تشخيص ومعالجة الملاريا

إن التشخيص المبكر هو أمر حاسم في نجاح العلاج. يجب على الشخص الذي يظن بأن لديه ملاريا أن يتوجه لتلقي علاجاً طبياً دون تأجيل وأن يطلب فحص عيّنته الدموية مجهرياً لتحديد طفيليات الملاريا.

بإمكان غالبية السائحون أو المسافرين عادة الوصول لتلقي علاجاً طبياً، لكن، في حال عدم توفر علاجاً طبياً، فبالإمكان التصرف حسب التعليمات العلاجية في ساعات الطوارئ (stand-by treatment) التي تظهر في الفقرة ٣ من هذه النشرة.

يجب استشارة الطبيب بالنسبة لتزودك بـ "علاج في ساعات الطوارئ" (stand-by treatment) أثناء سفرك. بعد تناول علاجاً في ساعات الطوارئ (stand-by treatment) فلا تزال هناك ضرورة بالتوجه لتلقي استشارة طبية.

هناك أدوية كثيرة ومتنوعة لمعالجة وللمنع الملاريا. من الجائز أن يصف لك الطبيب لاريام لهدف مغاير. راجع الطبيب إذا توفرت لديك أسئلة لماذا تلتقيت وصفة ل لاريام.
دواء لاريام لا يسبب الإدمان.

٢) قبل استعمال الدواء

❗ لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة (mefloquine) أو لمركبات مشابهة (مثل: كينين وكينيدين) أو لأحد مركبات الدواء
- كعلاج وقائي إذا وجدت لديك سابقة لتشنجات/إختلاجات (نوبات سريعة)
- كعلاج وقائي إذا كنت تعاني من إكتئاب أو إذا وجدت لديك سابقة لمرض نفسي خطير
- يمكن لأشخاص معينين يتناولون لاريام أن يقاسوا بشكل مفاجئ من مشاكل نفسية خطيرة. يمكن لأعراض المشاكل النفسية الخطيرة أن تشمل:
 - قلق شديد
 - هذيان
 - إكتئاب
 - الشعور بإنزعاج
 - سلوك غير عادي
 - الشعور بارتباك
- إذا حدث لك رد فعل تحسسي لإحدى المواد غير الفعالة المذكورة في الفقرة ٦. بعض الأعراض حدوث رد فعل تحسسي يمكن أن تشمل:
 - ضيق تنفسي
 - صغبر أو صعوبات في التنفس
 - إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم
 - طفح، حكة أو شرى على سطح الجلد
- إذا كانت علية الدواء مُمزقة أو عليها علامات عطب
- إذا إنتقض تاريخ الصلاحية المطبوع على ظهر العبوة. في حال تناوك للدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية، فهو قد لا يعمل كما ينبغي

⚠ تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

عليك إبلاغ الطبيب:

- إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل. إذا دعت الحاجة لتناول لاريام خلال الحمل، بالأخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، يناقش الطبيب حول اللطامة أو الفائدة من تناول لاريام.
- إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخططين للرضاع. الدواء لاريام ينتقل إلى حليب الأم، وذلك يناقش الطبيب حول الخطورة والفائدة من تناول لاريام إذا كنت مرضعة.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل صحية بالأخص من المشاكل التالية: صرع أو إختلاجات، مرض كبد، ملاريا.

- إذا كنت تعاني من مشاكل في العينين. بلغ عن حالات مثل إصابة عصب الرؤية (optic neuropathy) واضطرابات في الشبكة أثناء العلاج ب لاريام. في حالات معينة الشفاء من الحاد يكون بطيئاً جداً لكن هناك أيضاً تقارير بحوادث إختلاطات دائمة.
- إذا تلتقيت لاحقاً في الآونة الأخيرة.
- إذا كنت حساساً لأدوية أخرى، لأي طعام، لإصغية الطعام أو للمواد الحافظة.
- في حال عدم تليفك للطبيب حول ما ذكر آنفاً، فيجب فعل ذلك قبل البدء بتناول لاريام.

لاريام والأدوية الأخرى

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً:
هالوفانترين (halofantrine)، دواء يستعمل لعلاج الملاريا. لا يجوز استعمال هذا الدواء أثناء العلاج ب لاريام أو خلال فترة ١٥ أسبوعاً بعد تناول الجرعة الأخيرة من لاريام
كيوتوكونازول (ketoconazole)، دواء مضاد للفطريات
كينين (quinine)، دواء يستعمل لعلاج الملاريا أو للتقلصات
كينيدين (quinidine)، دواء يستعمل لعلاج مشاكل القلب
لا يجوز استعمال الأدوية التي ذكرت سابقاً مع لاريام أو بعد العلاج ب لاريام. من شأن ذلك أن يسبب مشاكل خطيرة في القلب.

أدوية أخرى التي يمكنها أن تؤثر على عمل لاريام:

- كلوروكوين (chloroquine)، دواء يستعمل لعلاج أو لمنع الملاريا
 - ريفامپيسين (rifampicin)، دواء يستعمل لعلاج التلوثات
 - أدوية لعلاج نوبات الصرع، مثل: حمض فالپروئيك (valproic acid)، كارامازيبين (carbamazepine)، فينوباربیتال (phenobarbital) وفينيتوين (phenytoin)
 - أدوية معينة تستعمل لعلاج أو لمنع نظم القلب غير المنتظم
 - أدوية مستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثل فصيلة الأدوية المسماة حاجبات بيتا)
 - أدوية معينة تستعمل لعلاج الإكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى
 - أدوية معينة مضادة للهيستامين
 - أدوية مستعملة لتخفيض السكر في الدم (لعلاج السكري)
 - أدوية مستعملة لمنع الخثرات الدموية
 - التلقيح بلقاح "حي". يجب إتمام التلقيح بلقاح "حي" ثلاثة أيام على الأقل قبل تلقي الجرعة الأولى من لاريام. يجب استشارة الطبيب إذا لم تكن وإتقاً بالنسبة لقائمة الأدوية هذه، "حي".
 - من شأن الأدوية التي ذكرت سابقاً أن تتأثر من لاريام، أو من شأنها أن تؤثر على عمل لاريام. من الجائز أن تحتاج لتناول كميات مختلفة من أدويةك، أو من الجائز أن تحتاج لتناول أدوية أخرى. يجب استشارة الطبيب. توجد للطبيب والصيدلي معلومات إضافية حول الأدوية التي يجب الحذر منها أو التي يجب تجنبها خلال العلاج ب لاريام.
 - يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن وإتقاً بالنسبة لقائمة الأدوية هذه.
- #### الأطفال
- إن التجربة في استعمال لاريام لدى الرضع دون عمر ٣ أشهر أو الذين يزيدون أقل من ٥ كغ هي محدودة. في هذه الحالات يجب استشارة الطبيب بالنسبة لاستعمال لاريام.
- #### الحمل والتاريخ المرضي
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تظنين بأنك يمكن أن تكوني حامل أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.
يجب على النساء في سن الخصوبة استعمال وسائل مناسبة لمنع الحمل خلال كامل فترة العلاج وثلاثة أشهر إضافية على الأقل بعد تناول الجرعة الأخيرة.
- #### السياحة، استعمال المكائنت وشرب الكحول
- إن استعمال هذا الدواء قد يضعف من البقطة، وأن يسبب دوار وفقدان التوازن لذلك يلزم الحذر عند سياقة المركبات، تشغيل المكائنت وبيات نشاط آخر قد يشكل خطر في هذه الحالات. إن شرب الكحول في فترة العلاج بالدواء قد يزيد من تلك التأثيرات.
تلك التأثيرات قد تستمر عدة أسابيع بعد التوقف عن استعمال الدواء.

معلومات هامة عن بعض مكونات الدواء
يحتوي المستحضر على الكورتوز وقد يسبب رد فعل تحسسي لدى الأشخاص الحساسين للكورتوز.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.
عليك الإستيحاء من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واقفاً.

المقدار الدوائي الاعتيادي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها. يقول لك الطبيب كم من أقراص لاريايم يجب عليك تناولها ومتى تتناولها.

المقدار الدوائي الاعتيادي لمنع الملاريا:

الجرعة الاعتيادية للأشخاص الذين يزيدون عن ٥ كغ وما فوق هو قرص واحد من لاريايم مرة في الأسبوع.

من شأن الأشخاص الذين يزيدون أقل من ٥ كغ أن يحتاجوا لتخفيض الجرعة الأسبوعية. يقول لك الطبيب ماهي الجرعة المناسبة لك.

يجب تناول القرص الأول أسبوع قبل الدخول لمنطقة الملاريا. يجب مواصلة تناول قرص واحد في كل أسبوع بنفس اليوم خلال موكثك في منطقة الملاريا، وفي كل أسبوع لمدة ٤ أسابيع بعد مغادرة منطقة الملاريا.

إذا لم يكن باستطاعتك تناول لاريايم أسبوع قبل دخولك لمنطقة الملاريا، يعطيك الطبيب تعليمات مغايرة للمقدار الدوائي.

المقدار الدوائي الاعتيادي لعلاج الملاريا (بما في ذلك علاج في ساعات الطوارئ stand-by treatment):

الجرعة الاعتيادية للأشخاص الذين يزيدون عن ٤٥-٦٠ كغ هو خمسة أقراص من لاريايم. في البداية يجب تناول ثلاثة أقراص وبعد ٦-٨ ساعات من ذلك يتم تناول القرصين الباقيين.

الجرعة الاعتيادية للأشخاص الذين يزيدون أكثر من ٦٠ كغ هو ستة أقراص من لاريايم. في البداية يجب تناول ثلاثة أقراص، وبعد ٦-٨ ساعات من ذلك يتم تناول قرصين إضافيين، ويتم تناول القرص المتبقي بعد ٦-٨ ساعات من ذلك.

من شأن الأشخاص الذين يزيدون أقل من ٥ كغ أن يحتاجوا لتخفيض الجرعة. يقول لك الطبيب ماهي الجرعة المناسبة لك.

إذا مكثت في الماضي في منطقة ملاريا، فمن الجائز أن تحتاج لجرعة أخفض من لاريايم، راجع الطبيب للإستشارة.

إذا تقيأت خلال أقل من ٣٠ دقيقة من تناول جرعة من لاريايم، عليك معاودة هذه الجرعة.

إذا تقيأت بعد ٣٠-٦٠ دقيقة من تناول جرعة، يجب تناول نصف جرعة إضافية. مثلاً، إذا تناولت ٣ أقراص وتقيأت، فعليك تناول ١,٥ قرصاً إضافياً.

المقدار الدوائي للأطفال:

حسب تعليمات الطبيب. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

إرشادات استعمال الدواء

يجب بلع القرص بأكمله مع كأس واحد من الماء على الأقل. للدواء طعم مر ولاذع قليلاً. يفضل تناول الدواء بعد وجبة طعام.

للأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في بلع الأقراص بشكلها الكامل، بالإمكان سحق أو تعليق الأقراص بكمية قليلة من الماء، الجليب أو مشروب آخر.

لمنع الملاريا، عليك تناول الدواء مرة في الأسبوع، دائماً بنفس اليوم من الأسبوع بعد وجبة طعام.

فترة العلاج

يجب الإستمرار بتناول لاريايم إلى أن يوصيك الطبيب بالتوقف.

فترة العلاج تتعلق فيما إذا كان استعمال لاريايم هو للعلاج أو لمنع الملاريا.

إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر عليك الإتصال بالطبيب فوراً! من الجائز أن تحدث لديك أعراض جانبية أكثر وأن تحتاج لعلاج طبي طارئ.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو للمستشفى وأحضر معه علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الجرعة الثانية أو الثالثة من الدواء خلال العلاج بالملاريا، فعليك تناول الجرعة حال تذكرك والإتصال بالطبيب.

إذا لم تكن واقفاً مما يتوجب عليك فعله، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لمنع الملاريا، عليك تناول الدواء مرة في الأسبوع، دائماً بنفس اليوم من الأسبوع. إذا نسيت تناول الجرعة، فعليك تناول الجرعة حال تذكرك ومواصلة تناول الجرعة مرة في الأسبوع.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

يجب إبلاغ الأطباء، أطباء الأسنان والصيداليتين الذين يعالجونك بأنك تتناول لاريايم. إذا لم تكن تتناول الدواء حسب ما وصف لك لأي سبب كان، فيجب إبلاغ الطبيب. ولا، من شأن الطبيب أن يعتقد بأن الدواء غير نافع ويقوم بتغيير العلاج دون حاجة لذلك.

تساعتك أنت تتناول لاريايم لعلاج الملاريا، عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تشعر بأن الأقراص لا تكفي في علاج حالتك. إذا كنت تتناول لاريايم لعلاج الملاريا، عليك الحضور في الموعد الذي حدده لك الطبيب وذلك لكي يكون بإمكانك متابعة حالتك.

لا يجوز تناول لاريايم لعلاج شكوى أخرى إلا إذا أوصاك الطبيب بذلك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لاريايم قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندersh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

من الجائز أن تحتاج علاج طبي في حال معاناتك من قسم من الأعراض الجانبية.

عندما يتم استعمال لاريايم لعلاج الملاريا، فمن شأن الأعراض الجانبية أن تحدث في أوقات أقرب مما هو عليه في الإستعمال لمنع الملاريا.

إذا كنت تتناول لاريايم لعلاج الملاريا، فمن الجائز أن لا تستطيع التفريق بين أعراض الملاريا والأعراض الجانبية لـ لاريايم.

يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن أو لفرقة الطوارئ إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

- احلام شاذة أو غريبة، التي يمكن أن تستمر بعد التوقف عن تناول لاريايم.
- تغيرات في المزاج مثل: اضطراب ثنائي القطب، إكتئاب (يمكن أن يستمر أشهر ويمكن أكثر)، قلة الهوء، إرتباك، تأرجح الأحاسيس، عدوانية، الشعور بقلق أو عصبية، أفكار غير منطقية (أوهام)، اضطراب ضياء الشخصية (depersonalization disorder)، هذيان، أفكار إنتحارية أو نوبات من القلق، التي يمكن أن تحدث أيضاً بعد التوقف عن تناول لاريايم.

- تشنجات، تقلصات
- نظم قلب غير عادي أو سريع، ألم في الصدر
- دوام
- إرهاق، احمرار الوجه والعنق
- فقدان الوعي
- مشاكل في العينين مثل تشوش الرؤية أو ألم في العين
- اضطرابات في السمع
- رجفان
- سخونة، تعرق، قشعريرة
- آلام عضلية، تقلصات عضلية أو ضعف
- آلام في المفاصل
- صعوبات في التنفس، ضيق تنفس، ضغط في الصدر، سعال أو صغير

- الشعور بالتمتن في أصابع اليدين والرجلين
- طفح شديد، حويصلات أو نزف من الشفتين، من العينين، من الفم، من الأنف أو من الأعضاء التناسلية
- إرهاق مفاجئ، دوام أو ضيق تنفس مفاجئ
- اصفرار الجلد أو العينين
- الأعراض الجانبية هذه هي شديدة. ومن الجائز أن تحتاج لعلاج طبي. أعراض جانبية شديدة هي نادرة.

أعراض جانبية إضافية

يجب إبلاغ الطبيب في حال ملاحظتك للأعراض الجانبية التالية وكنت قلقاً منها:

- غثاين (الشعور بوكة) أو تقيؤ
- إسهال، ألم في البطن
- دوام، ترنح (فيرتيغو)، فقدان التوازن، من شأنها أن تستمر خلال أشهر وحتى أكثر بعد التوقف عن تناول لاريايم
- صداع
- حكة
- أرق (عدم القدرة على النوم)
- تقرحات في الفم
- تراكم سوائل (وذمة)
- تساقط الشعر

الأعراض الجانبية هذه هي الأكثر شيوعاً. وهي عادةً خفيفة وتقل وتيرتها بالإستعمال المطول بالدواء. إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة واللويحات. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين ما فوق ٣٠ درجة مئوية. يجب حفظ الدواء في العبوة الأصلية (الدواء حساس للرطوبة).

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Poloxamer 3800, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, maize starch, croscopolone, ammonium calcium alginate, talc and magnesium stearate.

يحتوي كل قرص من لاريايم على حوالي ٥١ ملغ لكورتوز مونوهيدرات.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

أقراص لاريايم هي على شكل إسطوانة لونها أبيض. على جانب واحد من الأقراص مطبوع مسدس والآر. سي. RO. C. HE.

يوجد على الأقراص خط للسطح يمكن من شرطها لانصاف أو أربع بسهولة.

لاريايم مسوق ضمن عبوة تحوي ٨ أقراص.

صاحب الإمتياز وعنوانه: روش فارماسيتيكا (إسرائيل) م.ض.،

ص.ب. /٦٢٩١، هود-شارون ٧٩-٥٢٤

اسم المنتج وعنوانه: هوفمان - لا روش م.ض.، بازل، سويسرا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ: أيلول ٢٠١٤ رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٠-٢٥٣٢٧-٨٤-٤٥

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

