

نشرة للمستهلك حسب أنظمة الصيادلة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

رينولاست، بخاخ للأذن

المادة الفعالة:

Azelastine Hydrochloride 0.1% w/v
كبسه بخاخ واحدة (١٤ مل) تحتوي على ١٤٪ ملء من المادة الفعالة Azelastine Hydrochloride

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك استفسار إضافي، توجه للطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من الجمل لا يتطابق بالآخرين. قد يسبب لهم الضرر حتى لو بدا لك أن وضعهم الطبي مشابه.

الدواء مخصص لعلاج البالغين والأطفال فوق جيل ٦ سنوات.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

رينولاست مخصص لعلاج التهاب الأذن الأرجي المومسي أو المستثير طول السنة، لدى البالغين والأطفال فوق جيل ٦ سنوات.

الفيضان العاجية:

مضاد للهيستامين من الجيل الثاني، قوي، انتقائي. الدواء يعمل عن طريق منع تأثير الهيستامين المفرز في الجسم كجزء من رد فعل التحسسي.

رينولاست مخصص لعلاج حساسيات التي تظهر بفصول معينة من السنة. على سبيل المثال حساسية للغير المسماة حمى الكل. كذلك رينولاست مخصص لعلاج حساسيات التي تظهر كل سنة. على سبيل المثال حساسية لعنف الغبار المنزلي أو حساسية لفراء القطط أو الكلاب.

غالباً تسبب لك الحساسية بسylan الأنف، عطاس، حكة أو انسداد الأنف. رينولاست يستطيل التخفيف من هذه الأعراض.

٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال المستحضر إذا: معرفة حساسية المادة الفعالة Azelastine Hydrochloride أو لأي واحد من المركبات الإضافية

إذا كنت تتناولين أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك دواعي بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، آخر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. حتى الآن لم يتم التبليغ عن تفاعلات مع أدوية أخرى.

الأطفال

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والرضع تحت جيل ٦ سنوات.

الحمل والإرضا

إذا كنت حامل، تحاولين الحمل أو مرضة، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الاستعمال.

٣. كيف تستخدم الدواء؟

يجب الاستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك التتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متاكدة.

سيقوم الطبيب بملائمة الجرعة من الجمل. الجرعة ستظهر على اللصقة الدوائية المتلعنة على العبوة من قبل الصيدلي.

الجرعة الدوائية المتلعنة عادة هي: بخة واحدة في كل منظر، مرتين في اليوم (في الصباح وفي المساء).

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية استخدام رينولاست بخاخ


١. أولاً يجب تخطيط الأنف.

٢. يجب إزاله الغطاء الواقي (رسم ١).

٣. قبل الاستعمال الأول يجب الضغط عدة مرات على المضخة حتى الحصول على رعشة ملحوظة (رسم ٢).

٤. قم بالضغط مرة واحدة في كل منظر والرأس منتصب. لا يجوز إمامنة الرأس للوراء (رسم ٣).

٥. أسمح المضخة وادع الغطاء الواقي.



إذا أفرطت بتناول الجرعة عن طريق الخطأ، من غير المتوقع أي أعراض، توجه للطبيب إذا كنت قلق.

إذا ابتلعت من الدواء عن طريق الخطأ، أو إذا ابتلعت طفل من الدواء، توجه على الفور للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا دخل رينولاست عن طريق الخطأ للعينين، اغسلهما بالكثير من الماء، من الممكن أن تشعر بالوخز في العينين بعض الوقت.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناول الجرعة عند تذكرك وبعد ذلك، تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا تتناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن تلك التي تم نسيانها.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة الوافية في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا كانت لديك أستهلاك إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.