

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משווקת ללא מרשם רופא

רווהכול כמוסות

חומרים פעילים:

L-מנטול 32 מ"ג, מנטון 6 מ"ג, פינן בטא 3.4 מ"ג, פינן אלפא 13.6 מ"ג, בורנאול 5 מ"ג, קמפן 5 מ"ג, סינאול 2 מ"ג.
L-Menthol 32 mg, Menthone 6 mg, Pinene beta 3.4 mg, Pinene alfa 13.6 mg, Borneol 5 mg, Camphene 5 mg, Cineole 2 mg.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך לפנות לרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

למה מיועדת התרופה?

רווהכול משמשת כתוסף לטיפול באבני מרה ומחלות כבד.
רווהכול פועלת להמסת, פירוק וסילוק אבני מרה על ידי הגברת ההפרשה של מיצי המרה. כמו כן, **רווהכול** מעכבת יצירת גורמים התורמים להיווצרות משקעים ויצירה של אבנים. **רווהכול** מרפה את צינוריות המרה ובכך היא מפחיתה את הכאב ומסייעת בסילוק האבנים.

לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

הינך רגיש (אלרגי) לאחד מהחומרים הפעילים L-Menthol, Menthone, Pinene alfa, Pinene beta, Borneol, Camphene, Cineole או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה 'מידע נוסף')

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול ברווהכול, ספר לרופא אם:

- הינך נוטל תרופות לדילול הדם או תרופות שעוברות פירוק בכבד

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לדילול הדם (נוגדי קרישה כגון ווראפרין)
- תרופות אשר עוברות פירוק בכבד

שימוש בתרופה ומזון

יש לקחת **רווהכול** לפני הארוחה.
מומלץ להקפיד על תזונה דלת כולסטרול.

הריון והנקה

אין מידע על שימוש ב**רווהכול** במהלך ההיריון אצל בני אדם ואין הוכחה להשפעות טרטוגניות בבעלי חיים. חלק מן המרכיבים עלולים לעבור דרך השליה לעובר ולכן יש להשתמש במהלך ההיריון רק לאחר התייעצות עם הרופא והערכתו כי השימוש ב**רווהכול** במהלך ההיריון חיוני. אין הינך בהיריון או מניקה יש להימנע משימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונית

לא ידועה השפעה של **רווהכול** על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

רווהכול מכילה רכיבים אשר עלולים לגרום לתגובה אלרגית: Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate. לחלק מהמרכיבים תיתכן אף תגובה אלרגית מאוחרת.

כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- **במבוגרים:** 1-2 כמוסות 3 פעמים ביום, לפני הארוחה.
 - **בילדים בגילאי 6-14:** כמוסה אחת פעמיים ביום, לפני הארוחה.
- אין לעבור על המנה המומלצת.**
יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לגבי משך השימוש בתרופה.
יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה, אין לנגוס או ללעוס את הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. יש ליטול אותה מיד כשנזכרת ולהמשיך על פי המינון המומלץ. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או רוקח.

תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**רווהכול** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

במקרים נדירים קיימות תופעות של גיהוקים וטעם מנטה בפה לאחר ארוחות. ניתן להפחית את התופעות הללו על ידי נטילת התרופה על קיבה ריקה כ- 30 דקות לפני הארוחה.

מספר קטן של חולים דיווח על הופעת כאבים וכיבים בפה, תופעה זו הפיכה ונעלמה במהרה לאחר הפסקת הטיפול בתרופה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא. **דיווח על תופעות לוואי:**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.

מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Virgin Olive Oil, Capsule Shell: Gelatin, Glycerol 85%, Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Sodium Copper Chlorophyllin (E141).

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

רווהכול מסופקת בקופסא ובתוכה בליסטרים המכילים כמוסות עגולות ירוקות, העשויות מג'לטין רך העמיד לפירוק בקיבה. הכמוסות מכילות בתוכן תמיסה בצבע צהוב-ירקרק בעלת ניחוח ארומטי חזק.

כל קופסא מכילה 20, 50 או 100 כמוסות.

יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

- בעל הרישום וכתובתו: מגאפארם בע"מ, ת.ד. 519 הוד השרון 4510501.

- שם היצרן וכתובתו: רווה פארמאצוטיקלס בע"מ, ניוטאון, באנטרי, מחוז קורק, אירלנד.

- עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ביולי 2016.

- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 107-68-20688.

- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.