

حمض الفولي 5 ملغ أقراص

حمض الفولي 10 ملغ أقراص

التركيب:

كل قرص يحوي:

Folic Acid 5 mg

كل قرص يحوي:

Folic Acid 10 mg

المواد غير الفعالة: انظر فقرة 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك أسئلة أخرى، توجه الى الطبيب أو الصيدلي. يجب عليك تناول الدواء بالشكل الصحيح.

1. لماذا هذا الدواء؟

لمعالجة فقر الدم الميغالوبلاستي . ضخم الخلايا (فقر الدم يصاحبه كريات حمراء ضخمة) والنتائج عن نقص في الحمض الفولي.

المجموعة العلاجية: حمض الفولي ومشتقاته.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يُمنع استعمال الدواء اذا كنت:

• لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لحمض الفوليك أو لأحد مركبات الدواء (انظر فقرة 6).

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً؛ إذا كنت تعاني أو اذا عانيت في الماضي من أنواع أخرى من فقر الدم مثل فقر الدم الخبيث أو فقر الدم من نوع ميغالوبلاستيك الناتج عن نقص فيتامين بي 12.

• اذا كنت تعاني من مرض السرطان.

• اذا كنت تعاني من مرض ايدسون ونسبة فيتامين B12 منخفضة.

لا تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

هذه العيارات من الجرعة الدوائية غير ملائمة للتناول اليومي في سن الخصوبة، إلا بتوصيات من الطبيب.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

يجب ابلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

إذا كنت تتعاطى دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بـدواء آخر بما في ذلك أدوية بنون وصفة طبية ومضافات الغذاء، فيجب إعلام الطبيب أو الصيدلي. يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تتناول:

إذا كنت تتناول دواءً آخر، أو اذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر فيجب عليك إعلام الطبيب وذلك لتفادي الإضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. خاصة، الأدوية التي تنتمي الى المجموعات التالية:

• ادوية مضادة للصرع (فينيتوين، فينوباربيتال، بريميديون، فالبروات الصوديوم، كاربامازيبين) - يجب فحص نسبتها في الدم، وإذا لزم الأمر يجب تعديل الجرعة.

• فلورويوراسيل (علاج السرطان)

• بعض المضادات الحيوية (ميثوبريم وسلفوناميدات).

• مستحضرات للتخفيف على الجهاز الهضمي (الطين الصالح للأكل ومضادات الحموضة التي تحتوي على الألمنيوم أو المغنيسيوم).

• المستحضرات المحتوية على الزنك (مثل الفيتامينات أو المكملات الغذائية)

• الميثوتريكسات [العلاج السرطان أو التهاب المفاصل الروماتويدي (RA)].

• تريامتيرين (مدر للبول).

• الليثيوم (لعلاج مشاكل الصحة العقلية).

• سولفاسالازين [لعلاج مرض التهاب الأمعاء أو التهاب المفاصل الروماتيزمي (RA)]

• الكوليستيرامين (دواء لتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم).

• الأسبرين (لعلاج الألم ورقيقه في الدم)

• الكحول

• عند الحاجة إلى تنفس خليط غاز وهواء للتنويم قبل عملية جراحية أو آلام.

لا استخدام هذا الدواء والغذاء: يُمنع المضغ؛ يجب تناول الدواء قبل الطعام مع قليل من الماء.

لا استعمال الدواء والكحول: يُمنع تناول الخمر أو المشروبات الروحية في فترة العلاج بهذا الدواء.

لا الحمل والرضاعة: يُمنع الاستعمال بدون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو مرضعة أو إذا كنت تخططين للحمل أو للرضاعة قريباً. يمكن استعمال الدواء في فترة الحمل.

لا السواقة واستعمال الماكينات: لا يؤثر الدواء على القدرة على السواقة أو استعمال الماكينات.

لا معلومات مهمة على بعض مركبات الدواء: يحوي المستحضر لاكتوز وقد يضر الاناس ذوي الحساسية للاكتوز. يُمنع الاستعمال اذا كانت لديك حساسية للسكر.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال وفقاً لتعليمات الطبيب. اذا لم تكن متأكدًا، فيجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

الجرعة الموصى بها عادة هي قرص واحد في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فلا يوجد مكان للقلق، يجب تناوله فور تذكرك ولكن يُمنع تناول جرعتين معاً في أي حال من الاحوال.

ليس للمضغ؛ يجب ابتلاع الدواء مع قليل من الماء.

يمكن قسم أو طحن القرص عند الحاجة.

يجب الانتظار ساعتين على الأقل بين تناول اقراص حمض الفولي وتناول مستحضرات للتخفيف في الجهاز الهضمي التي تحوي المنيوم أو مغنيزيوم.

يُمنع تناول الدواء مع المشروبات الروحية.

يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع اي نظارات اذا كنت بحاجة اليها.

يجب الاستمرار بالعلاج كما حددها الطبيب المعالج.

إذا تناولت جرعة زائدة أو اذا بلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب أو للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. أعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام هذا الدواء قد يؤدي لأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي عرض منها.

أعراض جانبية تظهر في حالات نادرة:

• فرط الحساسية وحساسية / احمرار الجلد، طفح جلدي، تورم في الوجه، الشفتان، اللسان أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع، صدمة (عرق بارد، نبض ضعيف، جفاف الفم، اتساع حدقة العين).

• طفح جلدي مع تهيج.

• مشاكل المعدة والأمعاء: فقدان الشهية، غثيان، الاحساس بانتفاخ، غازات.

في كل حال تشعر بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو اذا طرا أي تغيير على شعورك العام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

5. كيف تحزن الدواء؟

امنع/ي التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/أو الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

• يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

• يجب حفظ الدواء في مكان جاف وبدرجة حرارة تحت 25°C.

6. معلومات أخرى:

بالإضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

المواد الغير فعالة: Microcrystalline Lactose, Corn Starch, Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Colloidal Silicone Dioxide

حمض الفولي 5 ملغ يحوي: 53 ملغ لاكتوز.

حمض الفولي 10 ملغ يحوي: 73.8 ملغ لاكتوز.

كيف يبينو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

اقراص صفراء مع كتابة R على جهة واحدة.

الاقراص مغلفة على طبق في عب من:

30 قرص، 100 قرص و-250 قرص.

صاحب الامتياز والمنتج:

ريكس للصناعة الدوائية م.ض. شارع

هُاميلأخا 30 حولون، إسرائيل.

فُحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة

وزارة الصحة في تاريخ 2014/5.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية

في وزارة الصحة:

حمض الفولي 5 ملغ: 21928 00 128 85

حمض الفولي 10 ملغ: 21946 00 128 86

من أجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكور. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنتسين.