

חומצה פולית חומצה פולית

10 מ"ג
טבליות

5 מ"ג
טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה: חומצה פולית 5 מ"ג

כל טבליה מכילה: חומצה פולית 10 מ"ג

Folic acid 10 mg

Folic acid 5 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך לבלוע את התרופה בצורה נכונה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול באנמיות מגאלובלסטיות כתוצאה מחוסר של חומצה פולית

קבוצה תרופתית: חומצה פולית ונגזרותיה

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה זו אם:

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לחומצה פולית או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף 6)

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

- אם הינך סובל או סבלת בעבר מאנמיות מסוגים אחרים כמו אנמיה ממארת או אנמיה מגאלובלסטית הנגרמת ע"י חוסר בויטמין ב¹².
- אם הינך סובל מסרטן.
- אם הינך סובל מחלת אדיסון ורמת ויטמין ב¹² נמוכה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

מינונים אלו אינם מתאימים לנטילה יומית בגיל הפוריות, אלא בהמלצת רופא.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אם אתה נטול, לא תטל לאחורנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

אם הינך נטל תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי התרופות הבאות:

- תרופות נגד עוויות (פניטואין, פנוברביטאל, פרימידון, סודיום ואלפרואט, קרבמפולין) - יש צורך לבדוק רמתן בדם ובמידת הצורך לשנות מינון
- פולואורוציל (לטיפול בסרטן)
- אנטיביוטיקות מסוג מסויים (טרמטופרים וסולפונמידים)
- תכשירים להקלה על מערכת העיכול (חומר אכיל וסותרוי חומצה המכילים אלומיניום או מגנזיום)
- תכשירים המכילים אבץ (כגון ויטמינים או תוספי תזונה) מטטרקסט [לטיפול בסרטן או דלקת מפרקים שגרנית (ראומטואידיטי)]
- טריאמטרן (תרופה משתנה)
- ליתיום (לטיפול בבעיות במצב הרוח)
- סולפסלזין [לטיפול במחלות מעי דלקתיות או דלקת מפרקים שגרנית (ראומטואידיטי)]
- כולסטרמיין (תרופה להורדה של רמות כולסטרול בדם)
- אספירין (לטיפול בכאבים או לדלל את הדם)
- אלכוהול
- כאשר צריך לנשום תערובת גז ואוויר כדי להירדם לפני ניתוח או להקלת כאבים

שימוש בתרופה ומזון:

אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

הריון והנקה:

לפני התחלת השימוש בתרופה זו, עליך לדווח לרופא באם הינך בהריון או מניקה או מתכננת להרות או להניק בקרוב. אפשר להשתמש בתרופה בהריון.

נהיגה ושימוש במכוונות:

התרופה אינה מפריעה לנהיגה או לשימוש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: התכשיר מכיל לקטוז ועלול להזיק לאנשים הרגישים ללקטוז. אין להשתמש אם הינך רגיש לסוכר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. אם אתה לא בטוח איך להשתמש בתרופה, יש להיוועץ ברופא או רוקח.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

המינון המקובל בדרך כלל הוא טבליה אחת ביום. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, אין מקום לדאגה, יש ליטול מנה מיד כשזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים.

ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה.

יש לחכות פרק זמן של שתיים לפחות בין נטילת טבליות חומצה פולית לנטילת סותרוי חומצה המכילים אלומיניום או מגנזיום.

אין ליטול את התרופה עם משקאות חריפים.

אין ליטול תרופות בחושן! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא ארזות התרופה איתך.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בחומצה פולית עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי מופיעות לעיתים נדירות:

- רגישות יתר ואלרגיה: גירוי / האדמת העור, פריחה, נפיחות של הפנים, השפתיים, לשון או גרון, קושי בנשימה או זליעה, הלם (זעה קרה, דופק חלש, יובש בפה, אישונים מורחבים)
- פריחה בעור עם גירויים.
- בעיות בקיבה ובמעיים: חוסר תיאבון, בחילה, תחושת נפיחות, גזים.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.
- יש לאחסן במקום יבש ובטמפרטורה מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

חומרים בלתי פעילים: Corn Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Colloidal Silicone Dioxide

חומצה פולית 5 מ"ג מכילה: 53 מ"ג לקטוז

חומצה פולית 10 מ"ג מכילה: 73.8 מ"ג לקטוז

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות צהובות עם כיתוב R בצד אחת.

הטבליות ארזות באריזת מגשית בקופסאות של:

30 טבליות, 100 טבליות ו-250 טבליות.

בעל הרישום והיצרן:

רקח תעשיית תרופות בע"מ,

רח' המלאכה 30, חולון, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות במאי 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

חומצה פולית 5 מ"ג: 128 85 21928 00

חומצה פולית 10 מ"ג: 128 86 21946 00

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.