

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصادالة (مستحضرات) 1981
أقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
صودقت هذه النشرة وفحص محتواها من قبل وزارة الصحة في 2010/12.

هيمو فتائل

التركيب:
كل فتيلة خوي:

Bismuth Subgallate	180 mg
Benzocaine	15 mg
Zinc Oxide	120 mg

المواد الغير فعالة:

Olive oil, Witepsol w 35 (hard fat), Propyl paraben, Castor oil, Soyabean oil, B.H.T, Sodium methylparaben, Purified water.

الاستطباب : للتخفيف من البواسير .

متى لايجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

تحذيرات: لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب اذا كنت حاملاً أو مرضعة. يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام أو عقاقير خاصة المحدرات الموضعية قبل استعمالك للدواء.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترة 3 أيام قبل إجراء فحص نشاط الهانكرياس.

التفاعلات بين الأدوية : اذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر . فيجب اعلام الطبيب المعالج . وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير .

الأعراض الجانبية :

إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء . فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية. ان استعمال فتائل هيمو قد يسبب تغيراً في لون البراز واعراض كهذه لا تدعو إلى القلق.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة . أو اذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء . عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً .

المقادير الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

يستعمل الدواء صباحاً ومساءً وبعد كل تبرز.

لا تتجاوز/ين المقادير الموصى بها . هذا الدواء غير مخصص للأطفال .

انتبه/ي: هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.
ارشادات الاستعمال :

قشر/ي الفتيلة من غلافها. هذا وبالإمكان ترطيب الفتيلة بعد نزع غلاف الالومنيوم بالقليل من الماء لتسهيل ادخالها في الشرج. استلق/ي على جانبك وادخل/ي التحميلة عميقاً في الشرج بمساعدة اصبعك . اغسل/ي يديك جيداً . ملاحظة: اذا كانت الفتيلة رخوة أكثر من اللازم . فيالامكان تبريدها في البراد خلال 30 دقيقة او تبريدها بوضعها تحت تيار من الماء البارد قبل نزع غلافها.

اذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال عدة أيام او اذا تفاقم الوضع عليك مراجعة الطبيب .

كيف تستطيع/ين ان تساهم/ي في نجاح العلاج ؟

من الوسائل المساعدة والموصى بها بالمقابل مع استعمال هذا الدواء: ان يكون الهضم منتظماً . تجنب الامساك و/ أو بذل الجهد عند التغوط وعدم حمل الحاجيات الثقيلة.

جنب/ي التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/ أو الرضع . وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم. اذا أفرطت في تناول المقادير الدوائية او اذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء . عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء . لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا تتناول/ي الدواء في الظلام: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء .

ضع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك .

التخزين: في مكان بارد دون 25°C درجة مئوية .

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط . حتى ولو ظلت في عبوتها الاصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الحزن . الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة . في حالة الشك ! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء . لا يجوز خزن ادوية مختلفة في نفس العبوة .

رقم سجل الدواء: 28112193200

المنتج : ريكب للصناعة الدوائية ش.م.م. شارع هاميلاخا 30 حولون