

המו פיתולת

הרכב:

כל פיתילה מכילה:

Bismuth Subgallate	180 mg
Benzocaine	15 mg
Zinc Oxide	120 mg

חומרים בלתי פעילים:

Olive oil, Witepsol w 35 (hard fat), Propyl paraben, Castor oil, Soybean oil, B.H.T, Sodium methylparaben, Purified water.

התוויות:

התרופה מיועדת להקלה בטחורים.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא או אם הינך בהריון או מניקה. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד למלחם מקומי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה. אין להשתמש בתרופה זו 3 ימים לפני בדיקת פעילות הבלב.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גרמת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי: הטיפול ב"המו" פתילות עלול לגרום לשינוי בצבע הצואה. בשינויים אלה אין מקום לדאגה. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

להשתמש בוקר וערב, ואחרי כל יציאה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים.

שים לב: לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

הסר/י העטיפה מן הפתילה, ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה. שכב/י על צידך והחדר/י הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. רחץ/י היטב את ידיך.

הערה: אם הפתילה רכה מידי, ניתן לצננה במקרר במשך כ- 30 דקות או לצננה תחת זרם מים קרים לפני הסרת העטיפה.

אם חל שיפור במצבך תוך מספר ימים, או אם המצב החמיר, עליך לפנות לרופא.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול ?

אמצעים מומלצים במקביל לטיפול עם התכשיר:

עיכול סדיר; מניעת עצירות ו/או התאמצות ביציאות; אין להרים חפצים כבדים.

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי-כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריות התרופה אתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא **אין ליטול תרופות בחושך!** בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.

הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: שמור במקום יבש בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 028662193200

יצרן: הקח תעשייה פרמצבטיית בע"מ, רח' המלאכה 30 חולון, ישראל.