

# يودو-قيت مرهم

التركيبية: المادة الفعالة وتركيزها:

POVIDONE IODINE 10%

موازي له: 1% من اليود (IODINE) المتاح.

لقائمة المواد غير الفعالة في الدواء، انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل البدء باستخدام الدواء. تشمل نشرة المستهلك هذه معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء مخصص للبالغين، الأطفال والمراهقين. عليك استخدامه بصورة صحيحة. استشر بالصيدلي إذا كنت بحاجة للمزيد من المعلومات. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض، أو إذا لم يطرأ تحسن خلال 7 أيام.

## 1. لم أعد هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصص لتطهير وتعقيم الجروح، الخدوش، الحروق السطحية وتلوثات الجلد.

المجموعة الطبية: المطهرات (المعقات).

## 2. قبل استخدام الدواء

لا يمنع استخدام الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية لليود
- إذا كانت لديك حساسية للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء.

لا تحذير خاص في ما يتعلق باستخدام الدواء:

يمنع استخدام الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام الدواء إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في السابق من اضطراب في أداء الغدة الدرقية.
- كان الحديث عن جرح عميق أو حرق جلد.
- كانت الإصابة ناتجة عن لدغة (أو عضة) حيوان.
- كانت لديك حساسية لنوع معين من الطعام أو لنوع معين من الدواء. إذا كنت تتناول، أو تتناول مؤخرًا، أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيب والمكملات الغذائية، الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي بالأمور.

تحذيرات:

- ممنوع استخدام هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترات متواصلة لأكثر من أسبوع واحد دون استشارة الطبيب.
- إذا لم يتسبج الجرح للعلاج، أو إذا تفاقمت حالته، يجب استشارة الطبيب.

## 3. كيف تستخدم الدواء؟

إذا لم تكن متأكدًا عليك فحص ذلك مع الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة المتعارف عليها في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

قم بتنظيف المنطقة المصابة.

إدهن على الجرح أو على المنطقة المراد علاجها 2-4 مرات في اليوم.

بالإمكان أيضا وضع المرهم على قطعة شاش طبية (قماش) وتغطيتها بضمادة.

يجب الامتناع عن الدهن على مساحة واسعة من الجلد المصاب.

ممنوع تجاوز الجرعة الموصى بها.

بالإمكان تنظيف البقع على الجسم أو على الأقمشة القطنية بواسطة غسلها بالماء، انتبه!

ممنوع البلع! هذا الدواء مخصص للاستخدام الخارجي فقط.

إذا قمت ببلعه عن طريق الخطأ، أو قام طفل ببلع الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في الظلام! افحص اللصقة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، قم بوضع النظارات إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة أخرى بخصوص استخدامك للدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء آخر، قد يؤدي استخدام يودو-قيت مرهم، بالإضافة للتأثير المرغوب به، إلى حدوث أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تقزع عند قراءة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها على الإطلاق.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا:

- إذا حصل طفح جلدي، التهاب وأو تهيج موضعي، فيجب التوقف عن استخدام الدواء والتوجه إلى الطبيب.

- في أي حالة تشعر بها بوجود أعراض جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام، عليك استشارة الطبيب فوراً.

## 5. كيفية تخزين الدواء

تجنب التسشم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع وبذلك تجنب التسشم.

ممنوع التسبب بالتقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

احفظه في مكان مظلم، وفي درجة حرارة أقل من 25°C

● يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. date) المسجل على العبوة. . يتطرق تاريخ انتهاء الصلاحية اليوم الأخير من نفس الشهر.

● حتى بموجب شروط التعبئة والحفظ الموصى بها، يتم الاحتفاظ بالأدوية لفترات محددة فقط، في أي حالة من حالات الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.

● احفظه في عبوة الأصلية. ممنوع خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

● يمكن استخدامه حتى 6 أشهر من فتح القنبنة لأول مرة لكن ليس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المسجل على العبوة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء على المواد غير الفعالة التالية:

Polyethylene Glycol, Propylene Glycol, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة: مرهم باللون.

صاحب التسجيل والمنتج: فينابيد للصناعات الدوائية م.ض.

ص.ب. 114 بنيناميا 3055002. إسرائيل

تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في شهر: تشرين الثاني 2014.

رقم تسجيل الدواء: 1165128118

كشفت هذا النشرة بصيغة المذكورة من باب الراحة ولتسهيل القراءة، ولكن الدواء مخصص للجنيين على حد سواء.