

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

OXYGAL VETERINARY

אבקה להמסה במי שתייה

POWDER FOR SOLUTION IN DRINKING WATER

אוקסיגל וטרינרי

הרכב: Oxytetracycline HCl 50%

חומרים לא פעילים: Citric Acid

התוויות: לטיפול במחלות הנגרמות ע"י מיקרואורגניזמים הרגישים לאוקסיטרציקלין בתרנגולות פיטום, תרנגולי הודו וקרפיונים.

מינון: תרנגולי הודו ותרנגולות פיטום: 0.5 – 1.0 גר' לליטר מי שתייה למשך 5-7 ימים או לפי הוראות רופא וטרינר. יש להמיס את האבקה בכמות קטנה של מי שתייה ורק לאחר מכן להוסיף מים עד לכמות הסופית. קרפיונים: 75 מ"ג/ק"ג משקל גוף ליום למשך 10 ימים רצופים. הוראות שימוש בקרפיונים: מיועד כתוסף רפואי למזון קרפיונים, לפי תחשיב של צריכת המזון היומית השווה ל- 1% משקל גוף.

שיעור צריכת המזון ב % ממשקל הגוף	תוספת אוקסיגל ל 5 ק"ג תערובת	תוספת אוקסיגל ל 25 ק"ג תערובת	תוספת אוקסיגל לתונה תערובת
1	37.5 גר'	187.5 גר'	7.5 ק"ג

זמן המתנה:

תרנגולות פטם: יש להפסיק את הטיפול 3 ימים לפני השחיטה. תרנגולי הודו: יש להפסיק את הטיפול 5 ימים לפני השחיטה. קרפיונים: יש להפסיק את הטיפול 400 ימי מעלה (או 15 יום ב 23°C) לפני השיווק.

אזהרה:

אין להשתמש אם ידועה רגישות לחומר. אין להשתמש בו זמנית עם פניצילינים.

אחסון:

בטמפרטורת החדר מתחת ל 25°C. הרחק מהישג ידם של ילדים.

Storage: In room temperature below 25°C. Keep away from children.

יצרן ובעל הרישום:

ביוואק בע"מ, ת.ד. 300 אור עקיבא 30600.

שיווק והפצה: ביוואק בע"מ.

מס' רישום: 080-93-92200-00

אריזה: 250 גר', 1 ק"ג, 5 ק"ג

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור " דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי " שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי. או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe ctMedic@moh.gov.il>

לשימוש וטרינרי בלבד

חייב מרשם רופא