

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

## **موقيكس محلول**

التركيز: يحتوي كل ملليلتر من المحلول (20 قطرة) على:

Bromhexine HCl 2mg

لقائمة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر فقرة 6 - «معلومات اضافية». اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحوي النشرة معلومات موجزة عن الدواء، اذا كانت لديك استفسارات، فتوجه الى الطبيب او الى الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فقد تضرهم حتى لو ظننت انه وضعكم الطبي متشاربه.

لا يُوصى بهذا الدواء للرضع دون سنتين من العمر بدون موافقة الطبيب.

### 1. لماذا هذا الدواء؟

يقلل من لزوجة المخاط والبلغم. والمقصود من هذا الدواء للتخفيف من إفراز المخاط أثناء السعال في الحالات التي تراكم فيها المخاط في الجهاز التنفسي. يمكن استعمال الدواء عن طريق الاستنشاق ايضاً. المجموعة العلاجية: مخفضات لزوجة المخاط والبلغم.

### 2. قبل استعمال الدواء:

#### إذا يُمنع استعمال الدواء اذا:

إذا كانت لديك حساسية لاحد مركبات الدواء.

#### إذا قبل العلاج بالمستحضر اخبر الطبيب اذا:

• كنت حاملاً او مريضة.

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز الهضمي (مثل القرحة)، أو مشاكل في الكبد أو الكلى.

• إذا كانت لديك حساسية لنوع من الطعام أو الدواء، فيجب عليك إبلاغ الطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء.

#### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال المستحضر:

• لا تستخدم هذا الدواء بشكل متكرر أو لفترات طويلة دون استشارة الطبيب.

• يحوي هذا الدواء ميثيل بارابين وبروبيل بارابين (مواد حافظة)، والتي قد تسبب حساسية

إذا كنت تتناول، او تتناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومضافات الغذاء، اخبر بذلك الطبيب او الصيدلي. خاصة:

مضادات حيوية مثل:

• الأمبيسيلين

• أموكسيسيلين

• الاريثروميسين

• أكسي تراسكلين

#### الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملاً او مريضة فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

#### الاستعمال مع الولاد:

لا يُوصى بهذا الدواء للرضع دون سنتين من العمر بدون موافقة الطبيب.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك استشارة الطبيب او الصيدلي اذا لم تكن متأكداً.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

#### الجرعة استنشاقاً:

- البالغون: 4 ملليلتر، مرتين في اليوم.

- الالولاد فوق 12 سنة: 2 ملليلتر مرتين في اليوم.

- الالولاد من جيل 6 الى 12 سنة: ملليلتر واحد، مرتين في اليوم.

- الالولاد من جيل ستين الى 6 سنوات: 13 قطرة، مرتين في اليوم.

#### الجرعة شرباً:

- البالغون والالولاد فوق جيل 12 سنة: 4 ملليلتر، 3 مرات في اليوم.

- اولاد من جيل 6 سنوات الى 12 سنة: 2 ملليلتر 3 مرات في اليوم.

- اولاد من جيل ستان الى 6 سنوات: 20 قطرة 3 مرات في اليوم.

يجب تناول الدواء مع او بعد وجبة الطعام.

#### طريقة الاستعمال:

الجرعة شرباً: يجب ابتلاع الدواء مع كمية وافرة من الماء.

الجرعة استنشاقاً: يستعمل الدواء بواسطة جهاز استنشاق عادي.

يجب الحرص على قياس الجرعة بواسطة كأس القياس الخاصة او بقطارة القنبينة.

يُمنع تجلوز الجرعة الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسن على الحالة خلال 7 أيام، عليك مراجعة الطبيب.

اذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة او اذا ابتلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب او للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

اذا نسيت تناول هذا الدواء:

اذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيمنع تناول جرعة مزدوجة. تناول الجرعة المقلبة في الوقت العادي واستشر الطبيب.

كيف بإمكانك المساعدة في نجاح العلاج؟

يمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع اي نظارات اذا كنت بحاجة اليها.

#### 4. اعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام هذا المستحضر قد يؤدي لاعراض جانبية لدى بعد المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الاعراض الجانبية. قد لا تعاني من اي عرض منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً اذا:

- تطور حساسية بما في ذلك طفح جلدي، طفح جلدي يؤدي لحكمة، تشنج قصبي، حساسية مرافقة بتورم الوجه، الفم، الشفتين، اللسان و /أو الحلق، التي قد تؤدي لصعوبة في التنفس أو البلع (وذمة وعائية)، anaphylaxis (حساسية مفرطة).

- تظهر جروح جديدة في الجلد أو الغشاء المخاطي، أو ظهور تقشير الجلد، وظهور بثور حادة مع نزيف من الشفاه، العينين، الفم، الأنف أو الأعضاء التناسلية.

اعراض جانبية اخرى

اعراض جانبية نادرة (يؤثر على أقل 1 في 100 مريض)

- الغثيان

- القيء

- عدم الراحة في المعدة والأمعاء

- الإسهال

اعراض جانبية نادرة (يؤثر على أقل من 1 في 1000 مريض)

- الحساسية

- طفح الجلد

- فرط الحساسية

اعراض جانبية تحدث لدى عدد غير معروف من المرضى

- عسر الهضم

- الصداع

- الدوخة

- تشنج شعبي

- الساندة الحساسية

- زيادة في إنزيمات الكبد (البحوث)

- التعرق

- ضيق الصدر

اذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، او اذا كنت تعاني من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

#### 5. كيف تخزن الدواء؟

امن/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/او الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

يمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

يجب حفظ الدواء في مكان جاف ومظلم، تحت درجة حرارة 25°C.

يمكن استعمال الدواء حتى 4 اشهر بعد فتح العبوة للمرة الاولى، بشرط ان لا يزيد عن تاريخ انقضاء الصلاحية.

#### 6. معلومات اخرى:

بالاضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

Methyl paraben, Propyl paraben, Purified water.

كيف يبقو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

محلول نقى عديم اللون أو على اصفارار في زجاجة بنية اللون مع قطاره.

اسم المنتج وعنوانه:

فيتاميد لصناعة الادوية مض. ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.

فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2014/11/2014.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 630827462

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من

ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.