

בּוֹקֶט תמייסה

הרכב: כל 1 מ"ל (20 טיפות) מכיל:

Bromhexine HCl 2mg

רשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 - "מידע נוספים". קרא בעיון את העلون עד סוףו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מומלצת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים ללא המלצה רופא.

1. למה מיועדת התרופה?

mphithia צמיגות הליכה והכית. התרופה מיועדת להקלת על הוצאה הכיח בזמן שימוש במצבים בהם ישנה הצטברות ליכה בדרכי הנשימה. ניתן להשתמש בתרופה גם באינהלויה. קבוצה רפואיית: mphithia צמיגות הליכה והכית.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה

לפני הטיפול בתכשיר ספר לרופא אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת העיכול (כגון אולקוז) או מביעות בכבד או בכליה.
- אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עיר להודיע לרופא המתפלל לפני נטילת התרופה.
- אם הינך סובל משיעול עקשני או כרוני כדוגמת השיעול המתלווה לעישון, אסתמה, דלקת כרונית של הסימפונות, נפחת (emphysema) או שיעול המלאוה בעודף ליכה, עיר להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתכשיר:

- אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או לתקופה ממושכתibli להיוועץ ברופא.
- תרופה זו מכילה מתיל פארבן ופרופיל פארבן (חומרם משמרם) העולמים לגורם לטופעות לוואי אלרגיות.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד: אנטיביוטיקה כגון:

- אמפציילין.
- אמוקסיצילין.
- אריטרומיצין.
- אוקסיטטרהציקلين.

הריון והנקה:

עליך להיוועץ ברופא טרם נטילת התרופה אם הינך בהריון או מניקה.

שימוש בילדים:

תרופה זו אינה מומלצת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים ללא המלצה רופא.

3. כיצד תשמש בתרופה?

עיר לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח.

המינון המקבול בהעדר הוראה אחרת מרופא:

באינהלויה

מבוגרים: 4 מ"ל, פעמיים ביום

ילדים מעל גיל 12 שנים: 2 מ"ל, פעמיים ביום

ילדים בגיל 6-12 שנים: 1 מ"ל, פעמיים ביום

ילדים בגיל 2-6 שנים: 13 טיפות, פעמיים ביום

בשתייה

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 4 מ"ל, שלוש פעמיים ביום

ילדים בגיל 6-12 שנים: 2 מ"ל, שלוש פעמיים ביום

ילדים בגיל 2-6 שנים: 20 טיפות, שלוש פעמיים ביום

יש ליטול התרופה עם או אחריו ארואה.

אופן השימוש:

בשתייה: יש לבולע את התרופה עם הרבה מים.

באינהלויה: לשימוש במכשיר איינהלויה רגיל.

יש להקפיד על מדידת המנה בכוסית מדידה מיוחדת או בטפטפת של הבקבוק. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

אם נטلت בטעות מנת יתר מן התרופה, או בטעות הילד בעל מין התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים ולהביא

את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את

המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יכיזכ תוכל לשיע להצלחת הטיפול?

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל

תרופה. הרכב משקפיים אם הימן זזוק להם.

4. תופעות לוואי:

כמו לכל תרופה, השימוש בתכשיר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא

תסבול מכך אחד מהם.

הפסק השימוש בתרופה ופנה לרופא באופן מיידי אם:

• מתפתחות תגובות אלרגיות כולל פריחה, פריחה מוגדרת בעור, עווית הסימפונות, תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות הפנים, הפה, השפטים, הלשון /או הגרון, העוללה לגרום לקשיי נשימה או בליעה (אנגיאידרמיה), אנטיפילקיס (תגובה אלרגית חריפה).

• מופיעים פצעים חדשים בעור או ברירית, או הופעת קילוף בעור, שלפוחיות קשות עם דימום בשפטים, בעיניים, בפה, אף או באיברי המין.

תופעות לוואי נוספת נספנות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (משמעות על פחות מ 1 מתוך 100 מטופלים)

- בחילה

- הקאה

- אי נוחות בקיבה ובמעי

- שלשול

תופעות לוואי נדירות (משמעות על פחות מ 1 מתוך 1000 מטופלים)

- תגובות אלרגיות

- פריחה בעור

- רגשות-יתר

תופעות לוואי המתרכשות במספר לא ידוע של מטופלים

- הפרעות עיכול

- כאב ראש

- סחרחות

- עווית הסימפונות

- שוק אנטיפילקטיקי

- עליה באנדמי הכבד (במחקרים)

- חזעה

- לחץ בבבית החזה

אם אתה מטופלת לוואי מחייבת, או כאשר אתה סובל מטופעת

לוואי שלא הוזכרה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. אין לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן במקום יבש וחושך, מתחת ל- 25°C .

ניתן להשתמש בתרופה עד 4 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, אך לא יותר מהתאריך התפוגה

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Methyl paraben, Propyl paraben, Purified water.

יכיזכ נראית התרופה ומה תוכן האזינה:

תמיישה צוללה ללא צבע או בגוון צהבהב בתוך בקבוק זכוכית חום עם

טפטפת.

שם הייצור וכותבות:

ויטאמוד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,

ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב-11/2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 630827462

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת,

התרופה מיועדת לבני שני המינים.

