

موكوليس محلول

التركيب: يحتوي كل ملتر من المحلول (20 قطرة) على:

Bromhexine HCl 2mg

لقائمة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر فقرة 6 - «معلومات اضافية».
اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحوي النشرة معلومات موجزة عن الدواء، اذا كانت لديك استفسارات، فتوجه الى الطبيب او الى الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. فقد تضرهم حتى لو ظننت ان وضعك الطبي متشابه.
لا يُوصى بهذا الدواء للرضع دون سنتين من العمر بدون موافقة الطبيب.

1. لماذا هذا الدواء؟

يقلل من لزوجة المخاط والبلغم. والمقصود من هذا الدواء للتخفيف من إفراز المخاط أثناء السعال في الحالات التي تراكم فيها المخاط في الجهاز التنفسي. يُمكن استعمال الدواء عن طريق الاستنشاق ايضاً. المجموعة العلاجية: مخفضات لزوجة المخاط والبلغم.

2. قبل استعمال الدواء:

❗ يُمنع استعمال الدواء اذا:

❗ إذا كانت لديك حساسية لاحد مركبات الدواء.

❗ قبل العلاج بالمستحضر اخبر الطبيب اذا:

- كنت حاملاً او مرضعة.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز الهضمي (مثل القرحة)، أو مشاكل في الكبد أو الكلى.
- إذا كانت لديك حساسية لنوع من الطعام أو الدواء، فيجب عليك إبلاغ الطبيب المعالج قبل تناول هذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من سعال صعب أو مزمن مثل السعال الذي يلزم التدخين، الربو، التهاب الشعب الهوائية المزمن، انتفاخ الرئة (emphysema)، أو سعال الذي يحتوي على مخاط فائض، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

❗ تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال المستحضر:

- لا تستخدم هذا الدواء بشكل متكرر أو لفترات طويلة دون استشارة الطبيب.
- يحوي هذا الدواء ميثيل بارابين وبروبيل بارابين (مواد حافظة)، والتي قد تسبب حساسية.

❗ اذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، اى اوية اخرى بما في ذلك اىوية بدون وصفة طبيب ومضافات الغذاء، اخبر بذلك الطبيب أو الصيدلي. خاصة: مضادات حيوية مثل:

• الأمبيسلين

• أموكسيسيلين

• الاريثروميسين

• أكسي تتراسكلين

❗ الحمل والرضاعة:

اذا كنت حاملاً أو مرضعة فيجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

❗ الاستعمال مع الاولاد:

لا يُوصى بهذا الدواء للرضع دون سنتين من العمر بدون موافقة الطبيب.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي اذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات اخرى من الطبيب:

الجرعة استنشاقاً:

- البالغون: 4 ملتر ، مرتين في اليوم.
- الاولاد فوق 12 سنة: 2 ملتر ، مرتين في اليوم.
- الاولاد من جيل 6 الى 12 سنة: ملتر واحد، مرتين في اليوم.
- الاولاد من جيل سنتين الى 6 سنوات: 13 قطرة، مرتين في اليوم.

الجرعة شرباً:

- البالغون والاولاد فوق جيل 12 سنة: 4 ملتر ، 3 مرات في اليوم.
 - اولاد من جيل 6 سنوات الى 12 سنة: 2 ملتر ، 3 مرات في اليوم.
 - اولاد من جيل سنتان الى 6 سنوات: 20 قطرة، 3 مرات في اليوم.
- يجب تناول الدواء مع او بعد وجبة الطعام.

طريقة الاستعمال:

الجرعة شرباً: يجب ابتلاع الدواء مع كمية وافرة من الماء.

الجرعة استنشاقاً: يستعمل الدواء بواسطة جهاز استنشاق عادي.

يجب الحرص على قياس الجرعة بواسطة كأس القياس الخاصة او بقطارة القنينة.

يُمنع تجلوز الجرعة الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسن على الحالة خلال 7 أيام، عليك مراجعة الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة أو إذا ابتلع ولد بالخطأ من الدواء، توجه فوراً للطبيب أو للطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.
إذا نسيت تناول هذا الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيُمنع تناول جرعة مزدوجة. تناول الجرعة المقبلة في الوقت العادي واستشر الطبيب.

كيف بإمكانك المساعدة في نجاح العلاج؟
يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع/ي نظارات إذا كنت بحاجة اليها.

4. أعراض جانبية:

كما الحال في كل دواء، استخدام هذا المستحضر قد يؤدي لأعراض جانبية لدى بعد المستخدمين. لا داعي للذعر من قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي عرض منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً اذا:

- تطورت حساسية بما في ذلك طفح جلدي، طفح جلدي يؤدي لحكة، تشنج قصبي، حساسية مرافقه بتورم الوجه، الفم، الشفتين، اللسان و / أو الحلق، التي قد تؤدي لصعوبة في التنفس أو البلع (وذمة وعائية)، anaphylaxis (حساسية مفرطة).
- تظهر جروح جديدة في الجلد أو الغشاء المخاطي، أو ظهور تقشير الجلد، وظهور بثور حادة مع نزيف من الشفاه، العينين، الفم، الأنف أو الأعضاء التناسلية.

أعراض جانبية أخرى

اعراض جانبية نادرة (يؤثر على أقل من 1 في 100 مريض)

- الغثيان

- القيء

- عدم الراحة في المعدة والأمعاء

- الإسهال

اعراض جانبية نادرة (يؤثر على أقل من 1 في 1000 مريض)

- الحساسية

- طفح الجلد

- فرط الحساسية

اعراض جانبية تحدث لدى عدد غير معروف من المرضى

- عسر الهضم

- الصداع

- الدوخة

- تشنج شعبي

- الساندة الحساسية

- زيادة في إنزيمات الكبد (البحوث)

- التعرق

- ضيق الصدر

إذا تفاقم احد الاعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة فيجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

5. كيف تخزن الدواء؟

امنع/اي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الاطفال و/أو الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة/ تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر.

يجب حفظ الدواء في مكان جاف ومظلم، تحت درجة حرارة 25°C. يمكن استعمال الدواء حتى 4 اشهر بعد فتح العبوة للمرة الاولى، بشرط ان لا يزيد عن تاريخ انقضاء الصلاحية.

6. معلومات أخرى:

بالإضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

Methyl paraben, Propyl paraben, Purified water.

كيف يببو الدواء وماذا يوجد بداخل العبوة:

محلول نقي عديم اللون أو على اصفرار في زجاجة بنية اللون مع قطارة.

اسم المنتج وعنوانه:

فيتاميد لصناعة الادوية م.ض.ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.

فُحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2014/08.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 135 11 31423

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.