

מוקולס תמיסה

הרכב: כל 1 מ"ל (20 טיפות) מכיל:

Bromhexine HCl 2mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מומלצת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים ללא המלצת רופא.

1. למה מיועדת התרופה?

מפחיתה צמיגות הליחה והכיח. התרופה מיועדת להקלה על הוצאת הכיח בזמן שיעול במצבים בהם ישנה הצטברות ליחה בדרכי הנשימה. ניתן להשתמש בתרופה גם באינהלציה.

קבוצה תרפויטית: מפחיתי צמיגות הליחה והכיח.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה

לפני הטיפול בתכשיר ספר לרופא אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת העיכול (כגון אולקוס) או מבעיות בכבד או בכליה.
- אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע לרופא המטפל לפני נטילת התרופה.
- אם הינך סובל משיעול עקשני או כרוני כדוגמת השיעול המתלווה לעישון, אסתמה, דלקת כרונית של הסימפונות, נפחת (emphysema) או שיעול המלווה בעודף ליחה, עליך להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתכשיר:

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- תרופה זו מכילה מתיל פארבן ופרופיל פארבן (חומרים משמרים) העלולים לגרום לתופעות לוואי אלרגיות.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד: אנטיביוטיקה כגון:

- אמפיצילין.
- אמוקסיצילין.
- אריתרומיצין.
- אוקסיטטרהציקלין.

הריון והנקה:

עליך להיוועץ ברופא טרם נטילת התרופה אם הינך בהריון או מניקה.

שימוש בילדים:

תרופה זו אינה מומלצת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים ללא המלצת רופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

באינהלציה

- מבוגרים: 4 מ"ל, פעמיים ביום
ילדים מעל גיל 12 שנים: 2 מ"ל, פעמיים ביום
ילדים בגיל 6-12 שנים: 1 מ"ל, פעמיים ביום
ילדים בגיל 2-6 שנים: 13 טיפות, פעמיים ביום

בשתיה

- מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 4 מ"ל, שלוש פעמים ביום
ילדים בגיל 6-12 שנים: 2 מ"ל, שלוש פעמים ביום
ילדים בגיל 2-6 שנים: 20 טיפות, שלוש פעמים ביום
יש ליטול התרופה עם או אחרי ארוחה.

אופן השימוש:

בשתיה: יש לבלוע את התרופה עם הרבה מים.
באינהלציה: לשימוש במכשיר אינהלציה רגיל.

יש להקפיד על מדידת המנה בכוסית מדידה מיוחדת או בטפטפת של הבקבוק. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מנת יתר מן התרופה, או בטעות הילד בלע מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא

את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לוואי:

כמו לכל תרופה, השימוש בתכשיר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק השימוש בתרופה ופנה לרופא באופן מיידי אם:

- מתפתחות תגובות אלרגיות כולל פריחה, פריחה מגרדת בעור, עווית הסימפונות, תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות הפנים, הפה, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, העלולה לגרום לקשיי נשימה או בליעה (אנגיואדמה), אנפילקסיס (תגובה אלרגית חריפה).
- מופיעים פצעים חדשים בעור או ברירית, או הופעת קילוף בעור, שלפוחיות קשות עם דימום בשפתיים, בעיניים, בפה, באף או באיברי המין.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (משפיעות על פחות מ 1 מתוך 100 מטופלים)

- בחילה
- הקאה
- אי נוחות בקיבה ובמע
- שלשול

תופעות לוואי נדירות (משפיעות על פחות מ 1 מתוך 1000 מטופלים)

- תגובות אלרגיות
- פריחה בעור
- רגישות-יתר

תופעות לוואי המתרחשות במספר לא ידוע של מטופלים

- הפרעות עיכול
- כאב ראש
- סחרחורת
- עווית הסימפונות
- שוק אנפילקטי
- עליה באנזימי הכבד (במחקרים)
- הזעה
- לחץ בבית החזה

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.


יש לאחסן במקום יבש וחשוך, מתחת ל-25°C. ניתן להשתמש בתרופה עד 4 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Methyl paraben, Propyl paraben, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
תמיסה צלולה ללא צבע או בגוון צהבהב בתוך בקבוק זכוכית חום עם טפטפת.



שם היצרן וכתובתו:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב: 08/2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 135 11 31423

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



ויטאמד