

پارامول کات اقراص للمضخ

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - ١٩٦٣

سوق الدواء بدون وصفة طبية

كل قرص للبالغ يحتوي على:

باراسيتامول ٥٠٠ ملجم Paracetamol 250 mg

فائق الماء غير القاتلة في المستحضر - أقراص بند ٦.

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء، تحذر هذه التسرا

على المعلومات المخصصة عن الدواء، إذا كانت لديك استالة ضافية، تووجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

هذه الدواء مخصوص عادة للأطفال فوق جيل ٣ سنوات. تتح هذا الجيل

يجب التوجيه إلى الطبيب، عليك استعماله بشكلي الصحيح، استشر الصيدلي.

إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية، اقرأ النشرة.

اعراض المرض لا تختفي بعد أيام بالرغم من استعمال الدواء أو في كل وضع، ظهر به اعراض جديدة.

١. لاي غرض مخصوص الدواء؟

لتسكن الالم وتخفيف السخونة،

الفصيلة العلاجية:

مسكن الالم وخافض الحرارة.

٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

أنت طفل حساس لل المادة الفعالة (باراسيتامول) أو لأحد مركبات النواء الأخرى.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

• قبل العلاج ببارامول كل اخرين الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عينت في الماضي من إدمان على الكحول أو برقان

أو من خلل في وظيفة الكبد (ما في ذلك مرض كبد حاد)، الكلية

/ جهاز البرو.

- كنت أو طفل حساس لأى غذاء أو دواء.

- أنت أو طفل تعاني من التهاب مفاصل وتصطفر تناول مسكنات الم

بالغين الأطفال فوق جيل ٤-٦ سنة، فإذا كان كل ٤-٦ ساعات، حتى

مرات في اليوم.

- إذا لم يكن لديك بخصوص المسبب لمرض الطفل أو أن المرض

شديد، يجب تناول علاج معروفة، أسماء أو تعب مطرد أو نوم.

• لا يجوز استعمال هذا الدواء بفترات متقاربة أو لفترة متواصلة دون

استشارة الطبيب.

• ابتعد عن تناول مرمرة عالية (حتى إذا ضمن المد الموصى به) من هذا

الدواء وقت المرض.

• يحتوي المستحضر على باراسيتامول الذي قد يسبب ضرر للكبد في الحالات التالية، أطعى طرحة عاليه على من الموصى بها أو لفترة متواصلة

شرب متكررات حكمية خلال فترة العلاج أو عند تناول أدوية أخرى

التي تؤثر على عمل الكبد.

• لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الالم، أو أدوية

اللرخش بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي - لمنع جرعة مفرطة / شدمة

من باراسيتامول.

• لا يجوز تناول أدوية اضافية عن عائلة "بارامول" / أو مستحضرات

إضافية التي تتوارد على باراسيتامول.

• أنت أو الطفل طرطم في الماضي اعراض جانبية حديثة نتيجة تناول

مستحضرات التي تحتوي على باراسيتامول فلا يجوز تناول

اعراض جانبية التي تحتوي على باراسيتامول، لكن لا تسبب مجدداً

٥. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم، يجب حفظ هذا الدواء وكل مواد اخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول الاطفال / او الرضيع وبدانك تمنع التسمم. لا تسبب التسمم دون تعلمات صريحة من الطبيب! لا يستعمل الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (date) (exp) (الذي يظهر على العبوات). تاريخنتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الاخير من نفس الشهر. شروط التخزين: حرارة من ٢٠ درجة مئوية. خزن بالعلبة الأصلية.

٦. معلومات اضافية

اضافة إلى المواد المقاتلة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, Strawberry flavour. Sodium starch glycolate, Saccharin sodium, Maize starch, Fumaric acid, Ethylcellulose, Magnesium stearate, Polyethylene C-10, Silica colloidal anhydrous, Sodium laurylsulfate, Silicon dioxide, Red lake E127.

كل قرص يحتوي على: ما يقارب ١٣ ملغم سكريون وما يقارب ٢٠ ملغم صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

قرص ودي مرقط مع حفظ شفاف، قرص يعود لوحات (بسترن).

قد لا تكون جميع احجام العبوات متساوية.

سوق حصري من قبل: سوبر فارم (برلين) مض، ص ب ٢٧١، هرتسليا ٤٢٧٥١٦

الم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه يكتب على عبوة الدواء في سجل الأدوية:

الحكومة في وزارة الصحة: ١٢٧٩٥٢٠٧٥٠٠

تحقق هذه الشروط وتمت المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في: ٢٠١٤/٤/٢٠١٤.

التنبيه وتبسيل القراءة، تمت صياغة هذه

النتر بصيغة المذكر، بالرغم من ذلك، الدواء والمعلومات في النشرة مخصوصين لكلا الجنسين.

الطبيب حتى اذا كان شعورك جيد، علاج فوري هو ضروري، بسب الاختصار لنطوي قد تظهر اعراض جانبية مثل: اسهال شهية متبنية، غثيان او نقيوات، زيادة التعرق، تشنجات او الام طبع، انتفاخ الم او حساسية في أعلى البطن، ومن الممكن لها لا تتمكن الصدر الكبد.

لا يجوز تناول لوبيا في الطعام لتحققها كاربامازين (المستعملة مثلاً في الصداع الشديدين، اشكال فصي، ريفاپينيس (اصدار بروبيسيد (العمر الفقير)، ايزوكاربامازين (اصدار اكتاف)، مضادات القباب لا يتبرأون بطيئاً، سيرفين او ساليسيلات اخرى، ادوية اضافية لسكن الالم او تخفيف السخونة، بيتاكارباميد وموبيديون (علاج الشفاف، التقويات ومشاكل معدة اخرى)، كاربامازين (اخفيض فرقاً دونه المد).

لا يجوز تناول الدواء جيداً على جيد مع مستحضرات اخرى تحتوي على ادوية اضافية، على ادوية التي قد تناولت جيداً، على ادوية التي يحتوي على باراسيتامول، يسترش الطبيب او الصيدلي.

استعمال بارامول كات واستهلاك الكحول: لا يجوز شرب مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بالدواء بسبب زيادة الارصاد، تضرر الكبد.

الحمل والرضاع: إذا كنت حامل او مرضعة استشيري الطبيب قبل بدء الاستعمال.

يجي ايقاف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب لاردوه لظهور اعراض جانبية مثل: مفعف، حكة في الجلد، الحساسية، احباباً بالفتح الوجه، التشقق، اللسان الحلق التي قد تؤدي إلى صعوبات في اعطاء ادوية اخرى، انتفاخ الاطراف.

باراسيتامول قادر على التسبب في حالات نارقة، يظهر اعراض جذل شديدة التي تؤدي الى الامثلية قد تكون احمرار، طفح، يبور، تقرحات في الفم، تفتر الشجل، اصابة جلدية واسعة.

اعراض جانبية شديدة قد تظهر ايضاً إذا تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال باراسيتامول بدون مسكنة.

علامات لتغير في جهاز الممثل: ميل لأنفحة، كدمات غير مبررة، نطور النهاب، سبوحة اكبر.

غثيان، انتفاخ مفاجئ بالوزن، شهية متبنية واصفار الجلد والعين، اصابة في الكبد او في الكلى (استعمال متوازن).

اعراض جانبية تراجعت عن مفعف، اقراص بند.

اذا افقرت بالخطأ في تناول الجرعة او اذا لم تطل من الدواء عن طريق الخطأ توجه فوراً إلى الطبيب او الى عرقفة الطوارئ في المستشفى، وأخذ حبة عيرة الدواء معاً لا تسبب التقويات دون تعلمات صريحة من اعانتي انت او طفلك من اعراض جانبية لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.