

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (כתשירים) התשמ"ו - 1986.

התרופה משוקקת ללא מרשם רופא

כל טבילה אחת מכילה:

פראצטמול 250 מ"ג  
Paracetamol 250 mg  
רשימת המרכיבים הבלתי פעילים בתמיש - ראה טופף 6.

**הקצה בעיון את העלון על סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מילן מעד תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה לרופא או לרוקח.

התרופה זו מיועדת בדרך כלל לילדים מעל גיל 3 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הירק אצל זקוק למידע נוסף. יש לפנות לרופא אם הרום נמשך יותר מ-3 ימים או אם סימני המחלה מתחמרים או לא משתפרים במשך 4 ימים. למרות השימוש בתרופה זו בכל מצב, שבו מופיעים תסמינים חדשים.

**1. למה מועדת התרופה?**

לשימוש כאבים והורדת חום.

**קצוה תרופוטי:**

משך כאבים ומוריד חום.

**2. לפי שימוש בתרופה:**

את/ה הילד גריש לחומר הפעיל (פראצטמול) לא לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.

**אזהרות מיוחדות המנועות לשימוש בתרופה:**  
לפני הטילול פראצטמול קט ספר לרופא אם:

- יריר או סבל סובל כל עבר בבחילה הקבולה
- אצבה או מיליוני בתפרוד; הכבד (כולל מחלת כבד אלכוהולית), הכלייה המכרבת השחן.
- יריר או הילד גריש למוון כלשהו או לתרופה לשינה.
- אצבה או הילד סובל מלקחת פרקים ונאלץ לטול משככי כאב ככל ש.
- יריר בטוח לגבי הגורם להמלת הילד או שהמחלה מלווה בפריחה, קשיי נשימה, שלשול או עייפות קיצונית או רדמת.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה משמכת מכל הלווע קרופא.
- הימנו מלקחת מין גבוה (אף אם בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן א.
- הנכשיר מיל פראצטמול הימנו לגרום לזקב כבד במקרה הלה; ניתן הימנו גבוה פראצטמול.
- לתקופה ממושכת, שתיית משקאות אלכוהוליים בתקופה הטיפול, או שנטוללים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.
- אין לטול תרופות נוספות ולהמלת חום ושיכר כאבים, או תרופות המטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למעט מין יתר/הרעה של פראצטמול.
- אין לטול תרופות נוספות משמשת "פראמול" ו/או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- אם אתה או הילד פיתחת בעבר תופעות לואי עוריות כתוצאה משימלת תכשירים המכילים פראצטמול אין לטול תרופות תכשירים המכילים פראצטמול, כדל שלא יגרמו שוב תופעות עוריות חמורות.
- אם אתה או הילד לקחתי, או אם לקחתם לאחרונה, תרופות אחרות כול תרופות ללא מרשם וטופסי תרופות, ספר על לרופא או לרוקח. בחרוש יש ליידי את הרופא או הרוקח אם אתה או הילד לקחתי:
- תרופות המשפיעות על העיכרר העצבי המרכזית (כגון: תרופות הרעה, לשינה ולאפילפסיה).
- תרופות נגד קריש דם (כגון וורופין).
- תרופות המורדות פעילות אנזימי הכבד כגון:

ברבוטורטיס, פניטואין או קרבמזין (המשמטות בעיקר לאפילפסיה, לעושות, לבעות ספייאטיות) ריפמפיין (אנטיביוטיקה); רפובניז (טיפול בשרדון); תרופות נגד דיכאון כגון משמטות הטריליקלים (Tricyclic antidepressants). נגדי דלקות שאינם סטרואידים, אספירין או סיליילטים אחרים. תרופות נוספות המשמכות נאמכו או מורדות חום.

מולקופראמול או דומפרדון (טיפול בבחילה, הקאות ובעות קיבה אחרות); כולסטיראמי (להפתחת יתר שומי הדם).

אין לקחת תרופה זו יחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול (אם איך בטוח שהתרופה שרירי נטול מכליל פראצטמול, היוועץ ברופא או ברוקח).

**שימוש בפראמול קט וצרכית אלכוהול:**

אין לשתות משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול בתרופה בגלל הגדלת הסיכון לזקב לכבד.

**הריון והנקה:**

אם הירך בהריון או מנקה היוועץ ברופא לפני תחילת השימוש.

**שימוש בילדים:**

יש להוועץ ברופא בעת השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים.  
על ההורים לנסות לרופא המטפל על כל תופעות לואי וכל תופעה נוספת הימנת לילד.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

על לבלוק עם הרופא או הרוקח אם יריר בטוח.

**הבער דורח אחרת המרופא המיוון המקובל הוא:**  
**מבוגרים וילדים מעל גיל 16 שנים:** 2-4 טבילות (ללא תוספת) 4-6 שעות, עד 4 פעמים ביומה.

**ילדים 12-16 שנים:** 2-3 טבילות, עד 4 פעמים ביומה.

**10-12 שנים:** 2 טבילות, עד 4 פעמים ביומה.

**8-10 שנים:** 1½ טבילות, עד 4 פעמים ביומה.

**4-6 שנים:** 1 טבילה, עד 4 פעמים ביומה.

**3 שנים:** ½ טבילה, עד 4 פעמים ביומה.

אין להשתמש בתרופה יותר מ-3 ימים ללא הוראת רופא.

**אין לעבור על המנה המומלצת על ידי הרופא או הרוקח או על מספר המנות ביומה. יש לטול בתורוחם על לא פחות מ-4 שעות.**

יש ללועט את התרופה לפני בליעתה. מיתן לחמת או לכתש. אם נטלת בטעות מין גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מין התרופה, פנה מדי לרופא או לחדר מין של בית חולים. ורובא ארית התרופה איתך! אין לגרום להקאה ללא הוראת מפורשת מרופא! גם אם הגרשךרן טובה, טיפל מידי אחי חיוב, בגלל סכון להתפתחות זקב חמור לכבד. עלולות להופיע תופעות לואי כגון: שלשול, תאבון ירוד, בחילות או הקאות, הרעה מוגברת, עויות או כאבי סובל נגיחיים, כאב או גרישות בבטן עליונה, ויזמון וזקב לא משקופת את התרופה לכבד.

אין לטול תרופות נוספות בחושן! בדוק החויות והמנה בכל פעם שרירך נטול תרופה. הרכב שקשימים אם הירך זקוק להם.

**4. תופעות לואי:**

כמו כל תרופה, השימוש בפראמול קט עלול לגרום לתופעות לואי כגון סחרחורת, גלייחם בחלק מהתופעות. יש לזהר ולתבאר למקרא רשימת תופעות הלואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

**תופעות לואי חמורות:**

**יש להכשיר את השימוש בתרופה ולפנות מדי לרופא:**

- סומכס של אלרגיה כגון: פריחה, רדוד בעור או החלת המחול לעיתים בהתפתחות של הפנים השפתיים.
- חולשה הרון איש עלולים לגרום לביעה או צנפונים לא מועדים נשימה/ קוצר נשימה, או צנפונים לא מועדים, הנחנות הפנים.
- פראצטמול קט עלול לגרום בשרדון בדרים להופעת מחלות עור חריפות שהסימנים שלהם כוללים להיות אודם, פריחה, שפוחות, כיבס בפה, קילוף העור, מדיע עורית נרובת.
- תופעות לואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול לא בעיה.
- סומכס של שישים מבערת דם כגון: נטייה לזימומים, טפסידים בלתי מוסברים, התפתחות דלקות בתי קלות.
- בחילה, ירידה פתאומית במשקל, תאבון ירוד והצבה של העור והעיניים, פגיעה בכבד או בכליות (בשימוש ממושך).
- תופעות לואי הנבעות ממינון יתר (ראה טופף "אם נטלת בטעות מין גבוה יותר").

אם אחת מתופעות הלואי מתחמרה או כאשר אתה או הילד סובלים מתופעת לואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

**5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הערעלה בתרופה זו וכי תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור וחסך רהיש ידום של ילדים (או התנקות בעל יד) כן תמנע הרעה. אל תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!  
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך ההתנהג (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התנהג מתייחס לתאריך האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה המנוכה מ- 25°C.

**6. מידע נוסף**

**נוסף על התומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**  
Microcrystalline cellulose, Strawberry flavour, Sodium starch glycolate, Saccharin sodium, Maize starch, Fumaric acid, Ethylcellulose, Magnesium stearate, Polyethylene C-10, Silica colloidal anhydrous, Sodium laurilsulfate, Silicon dioxide, Red lake E127.

כל טבילה מכילה: מ"ג סוכין וכו' 2.5 מ"ג נתרן.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

טבילה ורדוה מוקדות בעלות קו חצייה.  
ל אריזה מכלול 10, 20, 50 או 1000 טבילות באריות משמית. מלל את האריות עשויות להיות משוקקות.

**משקול בלעדית ע"י:** סופר פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרעילה 4672516

**איך נבעל הרישום ונתובתו:** דקסל בע"מ, רח דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל

**מספר רישום התרופה בבנקס התרופות המלכתיים במשרד הריאות:** 127953076500

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ב-04/2014.

עלון זה הפוסטול והקולקת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר על אף זאת, התרופה והמידע בעלון מועדים לבי שני המינים.