

پارامول، حبسولات

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء بدون وصفة طبية، التركيب: يحتوي كل حبسولة على:

پاراسيتامول ٥٠٠ ملغ
Paracetamol 500 mg

قائمة المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يعطى هذا الدواء من دون حاجة لوصفة طبية ولمخصص للبالغين والأطفال فوق عمر ٦ سنوات فقط، دون هذا العمر يجب استعمال أشكال إعطاء المخصصة للأطفال. عليك استعماله بالشكل الصحيح، استشر الصيدلي أو الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من ٢ أيام أو إذا تفاقمت علامات المرض أو لم تتحسن بعد ٢ أيام على الرغم من استعمال الدواء أو في كل حالة تظهر فيها أعراض جديدة.

١) لأي عرض مخصص الدواء؟

پارامول مخصص لتسكين الآلام وتخفيف السخونة الناجمة عن أسباب مختلفة مثل صداع، آلام الأسنان، زكام، إنفلونزا، آلام روماتزمية (rheumatic) وآلام الدورة الشهرية (الطمث).

الوصيلة العلاجية:

مسكن للآلام وخافض للسخونة.

٢) قبل استعمال الدواء

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً للباراسيتامول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

❗ تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• قبل العلاج د پارامول، احك للطبيب إذا: كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الإدمان على الكحول، بقران، خلل في وظيفة الكبد أو في وظيفة الكلية /جهاز البول.

• كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

• كنت تعاني من التهاب المفاصل ومضطرت لتناول مسكنات ألم بكل يوم.

• لا يجوز استعمال الدواء في أوقات مقاربة بدون استشارة الطبيب.

• يجب تناول جرعة عالية (حتى لو كانت في الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

• يحتوي المستحضر على پاراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً للكبد في هذه الحالات: عندما يعطى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة، شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج،

في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب، الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي:

البالغون والأطفال من عمر ١٢ سنة وما فوق: ٢-٤ حبسولات كل ٤-٦ ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها ٨ حبسولات في ٢٤ ساعة.

الأطفال بعمر ٦-٩ سنوات: ١/٢ حبسولة كل ٤-٦ ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها ٤ حبسولات في ٢٤ ساعة (١،٥ غرام). الأطفال بعمر ٢-٥ سنة: ١-١/٢ حبسولة كل ٤-٦ ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها ٤ حبسولات في ٢٤ ساعة (١ غرام).

لا يجوز إعطاء هذه الحبسولة للأطفال دون عمر ٦ سنوات. لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها من قبل الطبيب أو الصيدلي. يجب بلع الدواء مع الماء، بسماع بشرط أو سحق القرص.

❗ إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر أو إذا بلغ طفلاً ببالغاً من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى المستشفى، وأحضر معك علبة الدواء! لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب، حتى ولو كان شعورك جيداً، فإن العلاج القوي ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر شديد للكبد.

قد تظهر أعراض جانبية مثل: إسهال، تعرق زائد، قلة الشهية للطعام، غثيان أو تقيؤات، وشحنتات أو آلام في البطن، إنتفاخ، ألم أو حساسية في أعلى البطن من الجائر أنها لا تعكس الضرر الحاصل للكبد.

لا تتناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال پارامول قد يسبب أعراضاً جانبية مثل دوار عند بعض المستعملين. لا تنتهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائر ألا تعاني أبان منها. قد تكون الأعراض الجانبية أكثر شدة لدى المسنين.

أعراض جانبية شديدة:

يجب التوقف عن الإستهلاك ومراجعة الطبيب حالاً عند ظهور:

• علامات لليرجيز مثل: طفح، حكة في الجلد تتفاوت أحياناً بانتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة التي قد تسبب صعوبات في التنفس/ ضيق تنفس، إنتفاخ الأطراف.

• يمكن أن يسبب پاراسيتامول في حالات نادرة، ظهور أمراض جلدية شديدة والتي يمكن أن تكون خطيرة أحياناً، احمراراً، طفح، حوصلات، قروحات في الفم، تقشر الجلد، إصابة جلدية واسعة. قد تظهر أعراض جانبية جلدية شديدة حتى ولو تناولت في الماضي مستحضرات تنحوي المركب الفعالة پاراسيتامول بدون مشكئة.

• علامات لتغيرات في جهاز مثل: الميل لحدوث أنزفة، أنزفة مجهولة السبب، تطور التهابات بسهولة أكبر.

• غثيان، إنتفاخ مفاجئ في الوزن، إنخفاض الشهية والطعام وإصفراد الجلد والغزبن.

• أعراض جانبية ناتجة عن فرط الجرعة (انظر الفقرة «إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر»).

إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

في قلب القفاني، يمكن استعمال الدواء بعد فتح القفينة عند تاريخ إنتهاء الصلاحية المذكور على ظهر العبوة.

شروط التخزين:

يجب التخزين دون درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية.

يخزن في العبوة الأصلية.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Povidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Coating: Hypromellose, Macrogol, Titanium dioxide, Carnauba wax, Pigments: E-104, E-110

تحتوي كل حبسولة على حوالي ٠,٢ ملغ صوديوم، كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: حبسولة مطاولة بلون أصفر مع خط للشرط من كلا الطرفين.

أحجام العبوات المصادق عليها:

٨، ١٠، ١٦، ٢٠، ٥٠، ١٠٠، ١٠٠٠ حبسولة بالنسبة للدواء المعبأ ضمن لوحات.

بالنسبة لعلبة القفينة: ٥٠ حبسولة.

من الجائر ألا تكون كافة أحجام العلب مسوقة.

يسوق حصرياً من قبل: سوبر فارم (اسرائيل) م.ص.ص.ب. ٢١٧١، هرتسليا ٤٦٧٢٥

المنتج وصاحب الامتياز: دكسل م.ص. شارع دكسل ١، أور عقيفا ٢٠٠٠٠٠٠، إسرائيل.

هذه النشرة فُحصت ورُخصت من قبل وزارة الصحة في ٢٠١٣/١١

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٠٠٠٠٠٠٠٦٤ ٩٦ ١٢٧

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصفة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء والمعلومات في النشرة مخصصان لكلا الجنسين.