



התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

הרכב: כל קפילה מכילה:
פראצטמול 500 מ"ג
Paracetamol 500 mg

רשימת המרכיבים הבלתי פעילים בתכשיר - ראה טופק 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך השתמש בה בצורה לרופא או לרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא אורך במרשם רופא ומיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 בלבד. מתחת לגיל זה יש להשתמש בצורות מתן המיועדות לילדים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברופא או ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

יש להימנע לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם סימני המחלה מתמרימים או יש משתפרים לאחר 5 ימים: ימים למרות שימוש בתרופה או בכל מצב שבו מופיעים תסמינים חדשים.

1. למה מיועדת התרופה?

פראמול מיועד לשיכוך כאבים והורדת חום הנגרמים מסיבות שונות כגון כאבי ראש, כאבי שיניים, הצטננות, שפעת, שינוניים, שינוניים (ראומטיים) וכאבי מחזור.

קבוצה תרופתית: (ראומטיים) וכאבי מחזור. משך כאבים ומוריד חום.

2. לפני השימוש בתרופה

⚠️ אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש לפראצטמול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שמכילה התרופה.

⚠️ אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בפראמול, ספר לרופא אם:
- הנך סובל או סבלת בעבר מאלכוהוליזם, צהבת, ליקוי בתפקוד הכבד או בתפקוד הכליה/מערכת השתן.
- הנך רגיש למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי.
- אתה סובל מדלקת פרקים ונאלץ לטול משככי כאב בכל יום.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי היועץ ברופא.
הימנע מלקיחת מינון גבוה (אף אם בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.
התחשף מכל פראצטמול העלול לגרום לנזק כבד במקרים אלה: ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לקיפתה ממושכת, שתיית משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, או כשנטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.

אין לטול תרופות נוספות והורדת חום שיוכן כאבים, או תרופות הצטננות ללא ההתייעצות עם רופא או רוקח - למעט מינון יתר/הרעה של פראצטמול.

אין לטול תרופות נוספות ממשפחת "פראמול" ו/או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.

אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין לטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגורמו שוב לתופעות עוריות חמורות.

⚠️ אם אתה לוחץ, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוחץ:

- תרופות נגד קרישת דם (כגון וורפרין).
- תרופות המרזות פעילות אנזימי הכבד כגון ריבוטוריס, פניטואין או קרבמפין (משמשת בעיקר לאפילפסיה, לעוויות ולבעיות סכיזיאטריות), ריפמפיצין (אנטיביוטיקה), פרובנציד (לטיפול בשדון).
- אספירין או סליצילטים אחרים. תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאב או מורידת חום ונוגדי דלקות שאינם סטרואידים.

- מטורולפראמיד או דזמפרידון (לטיפול בחבלה, הקאות ובעיות קיבה אחרות) וכולסטרמיאין (להפחתת יתר שומני הדם).

- אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול (אם אינך בטוח שהתרופה שהנך נוטל מכילה פראצטמול, היועץ ברופא או ברוקח).

- שימוש בפראמול בצריכת אלכוהול**
אין לשתות משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול בתרופה בגלל הגדלת הסיכון לנזק לכבד.

- הריון והנקה**
אם הנך בהריון או מניקה היועץ ברופא לפני תחילת השימוש.

- שימוש בילדים**
תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 6 שנים, ראה טופק 6.
על הורים לזווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי לכל תרופה נוספת הניתנת לילד.

- 3. כיצד תשתמש בתרופה?**
עליך לבודק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
בהיגדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה: 1-2 קפילות כל 4-6 שעות לפי הצורך.
- אין לעבור על מינון של 8 קפילות יומית.

ילדים בגיל 6-9 שנים: ½ קפילה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 3 קפילות ליומית (1.5 גרם).

ילדים בגיל 12-9 שנים: ½-1 קפילה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 4 קפילות ליומית (2 גרם).

אין לתת קפילה זו לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

אין לעבור על המנה המומלצת על ידי הרופא או הרוקח.
יש לבלוע את התרופה עם מים. מותר לחצות או לכתוש.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והבא ארזית התרופה איתך! אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא וגם אם הרגשתי טובה, טיפל מיידי הוא חיוני, בגלל סיכון להתפתחות נזק חמור לכבד.

עלולות הופיע תופעות לוואי כגון: שלשול, הזעה מוגברת, תאבון ירוד, חבלה או ארזית עוויות או כאבי בטן, נפיחות, כאב או רגישות בבטן עליונה וייתכן והן לא משקפות את הנזק לכבד.

אין לטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפראמול עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת/בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מנף את מהן. תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

תופעות לוואי חמורות:

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת:

- סימנים של אלרגיה כגון: פריחה, גרוד בעור המלווה לעיתים בהתנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה/קוצר נשימה, התנפחות הפנים.

- פראצטמול יכול לגרום במקרים נדירים, להופעת מחלות עור חריפות שהסימנים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות, כיבים בפה, קילוף העור, גמיעה עורית נרחבת. תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.

- סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: נטייה לדימומים, שטפי דם בלתי מוסברים, התפתחות דלקות ביתר קלות.

- חבלה, ירידה פתאומית במשקל, תאבון ירוד והצבה של העור והעיניים.
- תופעות לוואי הנובעות ממינון יתר (ראה טופק 6) "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר".

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארזית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

ברזית בקבוק, ניתן להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה עד לתאריך התפוגה המופיע על גבי הארזית.

תנאי אחסון:
יש לאחסן מתחת ל-25°C.
אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Povidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate.

Coating: Hypromellose, Macrogol, Titanium dioxide, Carnauba wax.
Pigments: E-104, E-110

כל קפילה מכילה כ-0.3 מ"ג גרדן.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארזית:
קפילה מוארכת בצבע צהוב עם קו חציה בגוש הצדדים.

גדלי אריזה מאושרים:
10, 16, 20, 25, 30, 50, 100 קפילות עבור התרופה הארוזה במגשות.

עבור ארזית הבקבוק: 50 קפילות. ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

משך בלעדית ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, 2171, הרצליה 46725.

יצרן ובעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות כ"ב 11/2013.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
127 96 30764 00

למשפחות ולקהל הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת בעלון מיועדים לבני שני המינים.