פרולול® טבליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986.

תרופה זו חייבת במרשם רופא.
קרא/י בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה.

הרכב: כל טבליה מכילה:
פרולול® 10:
Propranolol Hydrochloride 10mg
פרולול® 40:
Propranolol Hydrochloride 40mg

מרכיבים בלתי פעילים:
Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, sodium starch glycolate, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous.

פרולול® 10 מכיל בנוסף: orange lake E-110
פרולול® 40 מכיל בנוסף: red lake E -127, blue lake E-132

קבוצה תרפויטית: חסם לא סלקטיבי של רצפטור בטא.

פעילות רפואית: פרולול® משתייך לקבוצת תרופות הנקראות חסמי רצפטורים בטא-אדרנרגיים. לתרופה זו ישנן השפעות על הלב ומחזור הדם וגם על חלקי גוף אחרים. לכן משתמשים בפרולול® במצבים רבים, כגון: טיפול ביתר לחץ דם, תעוקת הלב, הסדרת קצב פעימות הלב, רעד ומניעת התקפי מיגרנה.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לפרופרנולול או לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש אם היינך או מישהו/י במשפחתך סובל/ת או סבל/ה בעבר מאסטמה ו/או מצפצופים.
אין להשתמש בתרופה זו אם סבלת בעבר מאחת מהבעיות הבאות: אי ספיקת לב לא מבוקרת, דופק לב מאוד איטי או לא סדיר, לחץ דם נמוך מאוד, הפרעות קשות בזרימת הדם, חסימה לבבית מדרגה שניה או שלישית, תעוקת חזה מסוג פרינזמטל (כאב בחזה בזמן מנוחה).
אין להשתמש במקרים של: פאוכרומוציטומה שאינה מטופלת (גידול בדרך כלל ליד הכליות שעלול לגרום ללחץ דם גבוה), חמצת מטבולית (רמה גבוהה של חומצה בדם), משטר של דיאטה חריפה או לאחר צום.
אין להשתמש בחולים הנוטים לפתח היפוגליקמיה (תת-סוכר בדם).

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהריון, עשויה להיות בהריון, או אם הינך מניקה; אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון קוצר נשימה, אסטמה), הלב (למשל: אי ספיקת לב מטופלת, חסימה לבבית מדרגה ראשונה) ו/או כלי דם, הפרעות בזרימת הדם, הכבד (כגון שחמת), הכליה/מערכת השתן, מיתר פעילות של בלוטת התריס (תיראויד), מסוכרת, מדיכאון, אם יש לך תגובות אלרגיות (למשל: לעקיצות חרקים), אם הינך צורך/ת אלכוהול בתדירות גבוהה ובכמות רבה.
התכשיר מכיל לקטוז, לכן, אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה זו אינו גורם בדרך כלל לסחרחורת או פוגם בעירנות. עם זאת, אם הינך חש/ה בחלושה או בסחרחורת, יש להימנע מנהיגה ברכב, הפעלת מכונות מסוכנות ומכל פעילות המחייבת עירנות.
באשר לילדים - יש להזהיר מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אזהרות: בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות: בדיקות דם, לחץ דם, תפקודי כבד, כליה ולב.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
התרופה משמשת למניעת התקפי מיגרנה, לכן אין להשתמש בה לאחר שההתקף החל.
שים/י לב: תרופה זו עשויה להפחית או למנוע כאבי חזה בעת מאמץ גופני, לכן עליך להיוועץ עם הרופא בנוגע לרמת הפעילות הגופנית המותרת לך.
תרופה זו עלולה לגרום לרגישות למזג אויר קר. יש לדאוג ללבוש חם ולהימנע מחשיפה ממושכת לקור.
אם הינך נוטל/ת קלונידין (להורדת לחץ הדם או למיגרנה) ופרולול® ביחד, אין להפסיק את הטיפול בקלונידין אלא בהוראת הרופא. הפסקת הטיפול בקלונידין תלווה בהנחיות מדויקות מהרופא.
אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח מכל סוג שהוא (כולל ניתוח שיניים) או הרדמה כלשהי, עליך ליידע את הרופא המרדים או את הצוות הרפואי על נטילת פרולול®.
אם הינך זקוק/ה לטיפול בתגובה אלרגית, יש ליידע את הרופא על נטילת פרולול®.
אין להפסיק את הטיפול בפרולול® ללא התייעצות עם הרופא; הפסקת הטיפול תיעשה בפיקוח רפואי ובמקרים מסוימים תיעשה בהדרגה.
אם הינך צורך/ת אלכוהול בתדירות גבוהה ובכמות רבה, עליך להיוועץ עם הרופא לפני נטילת התרופה, מאחר ואלכוהול עלול להשפיע על פעולת התרופה.

תגובות בין-תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, כולל תרופות ללא מרשם או צמחי מרפא, אז אם סיימת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי התרופות מהקבוצות הבאות: דיגוקסין (לבעיות בלב), קלונידין (להורדת לחץ הדם או למיגרנה, ראה/י סעיף אזהרות), תרופות להורדת לחץ דם (כגון הידרלזין), משתנים, תרופות לכאבים בחזה (אנגינה); תרופות להסדרת קצב הלב (דיזופירמיד, לידוקאין, פרופפנון, קווינידין, אמיודרון), תרופות למחלות לב (כגון: וורפמיל, דילטיאזם, ניפדיפין), תרופות מריצות ללב (כגון אדרנלין), וארפארין (לדילול הדם), תרופות להצטננות וגודש באף, סימפתיין (לבעיות בקיבה), תרופות לטיפול במיגרנה (ארגוטמין, דיהידרוארגוטמין, ריזטריפטן), משככי כאב ומגדי דלקת (כגון: איבופרופן ואינדומתאצין), כלורפרומזין או תיוריזין (להפרעות פסיכיאטריות), ריפמפיצין (לשחפת), אינסולין או תרופות לטיפול בסוכרת הניתנות דרך הפה, תרופות להרדמה, תאופילין או אמינופילין (לאסטמה) או אם הינך זקוק/ה לטיפול נגד תגובה אלרגית.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון:
תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 10 אנשים): דופק איטי או לא סדיר, יידיים ורגליים קרות, חוסר תחושה ועוויתות באצבעות ובעקבותם חום וכאב (מחלת Raynaud), הפרעות שינה, סיוטי לילה, עייפות.
תופעות לוואי לא שכיחות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 100 אנשים): שלשול, בחילה, הקאה.
תופעות לוואי נדירות (מופיעות בפחות מ-1 מתוך 1,000 אנשים): חסימה בלב (מתבטאת בדופק לא סדיר, סחרחורת, עייפות ועילפון), סחרחורת (במיוחד כשנעמדים), דיזלול שיער, שינויים במצב הרוח, בלבול, אובדן זיכרון, פסיכוזות ו/או הזיות, דקרור בידיים, הפרעות ראייה, יובש בעיניים, פריחה בעור, סימני חבלה המופיעים בקלות (לאחר יריידה בטסיות הדם) או הופעת סימנים בצבע סגול על העור. במקרים של החמרה בחולים עם אי-ספיקת לב (המתבטאת בקוצר נשימה ו/או בנפיחות בקרסוליים), בחולים הסובלים מאסטמה או מבעיות נשימה אחרות, בחולים הסובלים מבעיות בזרימת הדם והחמרה בתסמינים אצל אנשים הסובלים מפסוריאזיס (ספחת), יש לפנות לרופא מיד!
תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות בפחות מ- 1 מתוך 10,000 אנשים): חולשת שרירים חמורה (Myasthenia gravis), שינויים בתאי הדם אי במרכיבים אחרים בדם (הרופא עשוי לבקש דגימות דם לבדוק את השפעת התרופה על הדם).
תופעות לוואי ששכיחותן לא ידועה: רמות נמוכות של סוכר בדם, התופעה תתכן באנשים עם/ללא סוכרת וכוללת: יילודים, תינוקות, ילדים, קשישים, חולי המודאיליזה, חולים שנטלו מינון יתר של פרולול® ואנשים שנטלתם תרופות לסוכרת. התופעה עלולה לקרות גם בצום או באנשים עם מחלת כבד ממושכת; פרכוסים הנובעים מרמות נמוכות של סוכר בדם.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: דופק לב איטי (במיוחד פחות מ-50 פעימות לדקה), דיכאון, קשיי נשימה (נדיר), יש לפנות לרופא.
במקרים של גרד בעור, התנפחות הקרסוליים והרגליים, הזיות, יידיים ורגליים קרות (נדיר), יש לפנות לרופא מיד!
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות: על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות שפורטו.

המינון: המינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך דלג/י על המנה אם נותרו פחות מ-4 שעות למנה הבאה.
בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
יש להקפיד על תזונה דלת נתרן (מלח) בתקופת הטיפול ביתר לחץ דם.
מינון לילדים: הרופא יתאים את המינון לפי גילו או משקלו של הילד.

אופן השימוש: ניתן לכתוש וניתן לחצות. לבלוע את התרופה עם מעט מים, עם האוכל.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא. בכל מקרה הפחתת המינון תעשה בהדרגה.

מנע/י הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אין לתת תרופה זו לקרוביך, שכניך, או מכרך.
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: יש לאחסן מתחת ל-25°C. מומלץ לשמור את הטבליות בתוך אריזת הקרטון המקורית.
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: פרולול® 10: 049802364500
פרולול® 40: 048372364600

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בפברואר 2014.

דקסל® בע"מ
רח' דקסל 1, אור-עקיבא 3060000, ישראל