

پريزولين أقراص

التركيب: كل قرص يحتوي: بريميدون 250 ملغ Primidone 250 mg

المواد الغير فعالة: انظر البند 6 - معلومات أخرى.

اقرأ النشرة حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء: هذه النشرة تحتوي على معلومات مختصرة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة أخرى، فعليك التوجه الى الطبيب او الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك. لا تعطه للآخرين. قد يكون مضر لهم حتى لو كنت تعتقد انه مرضهم شبيه لمرضك.

1. لاي غرض مخصص الدواء؟

مضاد للتشنج.

المجموعة العلاجية: مضاد للتشنجات.

2. قبل استعمال الدواء:

يُمنع استعمال الدواء اذا: لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته او لدواء من فصيلة الباربيتورات مثل بانوبريبتال. لا تستعمل هذا الدواء اذا كنت مريضاً بالبورفيريا او اذا كانت لديك سابقة لهذا المرض او اذا عانى احد ابناء عائلتك من هذا المرض.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

- لا تستعملي هذا الدواء اذا كنت حاملاً، تخططين لحمل أو مرضعة (انظري بند حمل ورضاعة).
- اذا كنت تعاني او اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي، الكبد، الكلى/المسالك البولية.

• اذا كنت تعاني او اذا عانيت في الماضي من الاكتئاب، اضطرابات المزاج، تصرفات او افكار انتحارية.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء: ان الاستعمال المتواصل لهذا الدواء قد يسبب الإدمان!

يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء.

يتناقض هذا الدواء مع نشاط اقراص منع الحمل لذا يجب ابلاغ الطبيب المعالج. المرضى المسنون هم اكثر حساسية لتأثيرات هذا الدواء. يجب ابلاغ الطبيب عن تناولك لهذا الدواء قبل اجراء اي عمل طبي او قبل اجراء اي عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الاسنان) او معالجة مستعجلة. لوحظ لدى عدد قليل من المرضى الذين يستخدمون مضادات الصرع مثل البريميدون، وجود افكار ايذاء النفس او الانتحار. من المفضل ان يقوم المرضى المعالجين وابناء اسرهم بمراقبة التغيرات السلوكية. في حالة ظهور هذه التغيرات يجب التوجه فوراً للطبيب. من المهم التواجد بمراجعة طبية مستمرة في فترة العلاج بهذا الدواء، خاصة المرضى ذوي ماضي محاولات انتحار او اكتئاب او اضطرابات نفسية.

اذا كنت تتعاطي، او تعاطيت مؤخراً، دواء آخر بما في ذلك ادوية بدون وصفة طبيب او مضافات الغذاء، ابلاغ الطبيب او الصيدلي بذلك. خاصة عليك ابلاغ الطبيب او الصيدلي اذا كنت تتعاطي دواء:

• ادوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل الادوية المهدئة، المنومة، باركينسون، الصرع، ادوية مضادة للهستامين).

• ادوية اخرى مضادة للصرع مثل: بانيتوئين، بالمابمات، صوديوم ثالبورات، كربمازفين، اوتوسوكساميد، اوكسكربزين، تياجابين، توفيرامات، زونيساميد.

• ادوية مضادة للاكتئاب (ادوية مضادة للاكتئاب من مجموعة التتراسكليينات، لاموتريجين، ميانسيرين).

• ادوية من مجموعة البريبتيوراتينات (مثل الادوية المنومة).

• ادوية مضادة لضغط الدم العالي او للقلب (مثل: مثبطات بيتا، ديجوكسين، لوسارتان، كينيدين، نيموديفين).

• ادوية للربو (استمنا) (تيتوفيلين، مونتاالوكاست).

• ادوية تحوي هرمونات (مثل: حبوب لمنع الحمل).

• ميثادون (لعلاج الادمان على الهيروين ولتهذئة الام الحادة).

• مضادات حيوية (مثل: كلورمفينيكول، ميترونيدزول، دوكسيسكلين).

• أدوية مضادة للفيروسات (مثل نالفيوثير).

• السيكلوسبورين (مخصص لمنع رفض الزرع وغيرها من الأمراض في جهاز المناعة).

• أدوية لعلاج السرطان (سيكلوفوسفاميد، اوتوفوسيد).

• جارنيسترون - دواء لعلاج الغثيان والقيء.

• مواد التخدير لعملية جراحية (مثل روكورونيوم. فاكورونيوم).

• الادوية التي تحتوي على المورفين، أو غيرها من عائلة الاوفيتاتيات المخدرات.

• مضادات التخثر (مثل فارفارين).

• الادوية التي تحتوي على المنشطات.

• ادوية من نبتة الهيباريكوم (نبتة سانت جون لعلاج الاكتئاب).

قد يزيد پريزولين من التأثير السام على الكبد من جرعة زائدة من الباراتسيتامول.

الحمل والرضاعة:

يُمنع تناول هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء في العلاج إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

الحمل: إن استخدام هذا الدواء قد يسيء الى التطور الطبيعي للجنين. يجب عليك إخبار الطبيب إذا كنت حاملاً، أو اذا كنت تخططين للحمل، لأن هذا الدواء قد يضر بالجنين. قد يُقلل استخدام هذا الدواء أثناء الحمل من كمية حمض الفوليك في الدم لدى المريضة. وبالإضافة إلى ذلك، كذلك قد يبطو الطفل أعراض الفطام نتيجة لاستخدام هذا الدواء أثناء الفترة الاخيرة من الحمل. كذلك في بعض الاحيان حدثت مشاكل في تخثر الدم لدى الاطفال الذين ولدوا لنساء كن تناولن أدوية مضادة للمخدرات.

الرضاعة: إذا كنت مرضعة واستخدمت هذا الدواء قد يسبب لنعاس وخمول الطفل.

القيادة واستخدام الآليات: استخدام هذا الدواء يضعف اليقظة، وبالتالي ينبغي توخي الحذر عند قيادة السيارة وتشغيل الآلات الخطرة وغيرها من الأنشطة التي تتطلب اليقظة. يجب تحذير الأطفال من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

يُمنع قيادة المركبات أو تشغيل ماكينات في فترة استعمال هذا الدواء حتى تتأكد مدى تأثير هذا الدواء عليك. لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء فترة تناول هذا الدواء .

3. كيف تستعمل الدواء:

يستعمل الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. لا تتجاوز الجرعة الموصى بها. يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج. يجب الاستمرار بالعلاج كما أوصى الطبيب المعالج.

يُمنع التوقف عن تناول هذا المستحضر، حتى إذا شعرت بتحسن، بدون تعليمات من الطبيب.

قد يؤدي هذا الدواء الى الادمان، لذا قد تظهر اعراض الفطام اذا تم التوقف فجأة عن تناول الدواء. يجب التوقف عن استعمال هذا الدواء بشكل تدريجي حسب تعليمات الطبيب.

ليس للمضغ! يجب بلع هذا الدواء مع الماء. يُمنع تناول الدواء مع مشروبات روحية. يُفضل تناول هذا الدواء مع الطعام أو الحليب. يمكن قسم / سحق القرص.

إذا حدث ونسيت تناول الجرعة – تناول الجرعة فور تذكرك! ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال. تناول الجرعة التالية في الوقت العادي واستشر الطبيب.

إذا تناولت جرعة زائدة بالخطأ – أو إذا تناول طفل من الدواء بالخطأ، توجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك.

اعراض ممكنة تدل على تناول جرعة زائدة: قمع الجهاز العصبي المركزي بما في ذلك عدم السيطرة على العضلات، فقدان الوعي، الاكتئاب في الجهاز التنفسي والكوما (غيبوبة).

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول استخدام هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الاعراض الجانبية: كما في كل دواء آخر، استعمال پريزولين قد يؤدي الى بعض الاعراض الجانبية لدى بعض المستخدمين. لا تخف من قراءة قائمة الاعراض الجانبية فقد لا تعاني من أي منها.

الاعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

أوقف العلاج وتوجه الى الطبيب فوراً:

في حالة الحساسية الشديدة: طفح جلدي مع احمرار وتهيج، الام، قرح، ظهور بثور تؤدي الى تقشير الطبقة الخارجية للجلد أو تطوي الشفاه، نجوف الفم، الانف أو الاذنين، الشرى، صعوبات في التنفس، ازدياد في التعرق، احمرار الخدود، تورم خاصة في الوجه والحلق، الالغماء، اوقف العلاج واستدع مساعدة طبية فوراً!

في بداية العلاج قد تظهر الاعراض الجانبية مثل **النعاس** ونقص الطاقة.

تخفني هذه الاعراض عادة بعد فترة قصيرة من التعود على المستحضر.

اعراض جانبية منتشرة (التي تؤثر على أقل من 1 لكل 10 شخص):

دوخان، اضطرابات في الرؤية، حركات متشنج، عيون متقلبة، اضطرابات في السير والحركة.

اعراض جانبية غير منتشرة (التي تؤثر على أقل من 1 لكل 100 شخص):

الم رأس (صداع)، غثيان، تقيؤ، طفح جلدي.

يجب التوجه للطبيب فوراً في الحالات التالية:

أعراض جانبية تظهر في فترات متباعدة (التي تؤثر على أقل من 1 لكل 1000 شخص):

• تغييرات في المزاج أو السلوك.

• آلم في المفاصل أو العظم.

• ارتفاع مستوى الإنزيمات في الكبد.

• تطور مرض يسمى " انكماش على اسم دوبويتران " (انقباض اصبع واحدة أو أكثر في اليد دون التمكن من اعادتها لوضعها الطبيعي).

• **الذئبة الحمامية** (مرض المناعة الذاتية التي تسبب التهاب في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الجلد والمفاصل والرتتين والكلى والقلب، والكبد). واعراضها عموماً: التعب، الحمى، آلم وتورم في المفاصل، طفح على شكل فراشة على الوجه الذي ينتشر على جسر الأنف، وعبر الخدين وغيرها.

• **شدوذ في خلايا الدم:** توجه للطبيب إذا لاحظت شحوب الجلد، نزيف غير طبيعي، ميل الى الحاق الضرر، حمى أو آلم في الحلق.

في اي حال تؤدي احد الاعراض الجانبية الى تفاقم او اذا شعرت باعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة او اذا حدث تغير في شعورك العام فيجب عليك مراجعة الطبيب فوراً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:

على الوالدين ابلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل وعن أي دواء آخر يتناوله. راجع الفقرات المتعلقة بالاعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

5. كيف تخزن الدواء؟ امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الأطفال و/أو الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب بالتقيؤ بدون تعليمات واضحة من الطبيب. يُمنع تناول ادوية في الظلام! افحص العبوة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء.

ضع نظارات اذا كنت بحاجة إليها.

يُمنع استعمال الدواء بعد انقضاء الصلاحية (exp. date: الظاهر على ظهر العبوة) تاريخ انقضاء الصلاحية يُظهر اليوم الاخير لنفس الشهر).

يجب حفظ الدواء في مكان جاف تحت درجة حرارة 25°C.

6. معلومات أخرى: بالإضافة الى المادة الفعالة يحتوي هذا الدواء كذلك على:

C.M.C. Calcium, Starch, Gelatine, PVP K-30, Magnesium Stearate, Stearic Acid.
صاحب امتياز المنتج: ريكح للصناعة الدوائية ش.م.م. شارع هاميلان ٣٠ حولون

فحصت هذه النشرة وصودقت بواسطة وزارة الصحة في تاريخ 2012/4.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 024-79-21145-00

من أجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك فان هذا الدواء مخصص للجنسين على حد سواء.