

פריזולין טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה: Primidone 250 mg / פרימידון 250 מ"ג
חומרים בלתי פעילים: ארסן טיפה 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה: עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נחשבת בעוברי, אך לעברית אחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה? גד עויתות.

קבוצה תרופתית: נוגד פרכוסים.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתכשיר אם: אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופה מקבוצת הברביטוראטים כמו פנברביטל. אין להשתמש בתרופה זו אם קימת מחלת פורפיריה או אם הופיעה בעבר או אם אמר מבדי המשפחה סובל ממחלה זו.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הינך בהריון, מתכננת להרות, או מניקה (ראה סעיף הרייון והנקה).
אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה, הכבד, הכליה/ מערכת השתן,
אם אתה/ סובלת/ או סבלת בעבר מדיאנוס, הפרעות במצב הרוח, התנהגות או מחשבות אובדניות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

שימוש ממושך עלול לגרום לתלות. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
התרופה נוגדת פעילות של גולגולת לנביעת הריון. לפיכך, יש לדעת את הרופא המטפל חותים קשישים הם יתור רגישים בדרך כלל להשפעות של התרופה. יש להודיע לרופא על נטילת תרופה זו לפני ביצוע בדיקות רפואיות או לפני ביצוע כל ניתוח (כולל ניתוח שיניים) או טיפול דחוף.

במספר קטן של מטופלים בתרופות אנטי אפילפטיות כגון פרימידון, נצפו מחשבות של פגיעה עצמית או התאבדות. מומלץ כי הטיפול ינוהל יבני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים התנהגותיים. במידה והיו חלוצי שינויים כאלה יש לפנות מיד לרופא.
חשוב מאוד להיות במעקב רפואי בעת הטיפול בתרופה, בייחוד מטופלים עם עבר של ניסיונות אובדניים או עבר של דיאנוס, או הפרעות במצב הרוח.

אם אתה נוסט, או אם נטלת את התרופה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במויחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (נגון תרופות הרגעה, לשינה, פרקניסון, אפילפטיות, תרופות אנטיהיסטימיניות).
תרופות אחרות נגד אפילפטיות כגון: פניטואין, פלבטמין, סודיום ולפראט, קרבמאזפין, אתאסוקסאמיד, אוקסקארבין, אטיפריאמין, טופיראמין, זוניסאמיד.
תרופות נגד דיאנוס (תרופות נגד דיאנוס טריציקליים, למוטרגין, מיאנסרין).
תרופות מקבוצת הברביטוראטים (כגון כדורים לשינה).
תרופות נגד יתר לחץ דם או ללב (כגון חוסמי בטא, דיגוקסין, לוסרטן, קינדין, ימודיפין).
תרופות נגד אסתמה (תאופילין, אסמולין).
תרופות המפילות הורמונים (נגון: גלולות לנביעת הריון).
תרופות (כטיפולי) המומכרות להוראה ולשיכון כאבים קשים).
אנטיביוטיקה (נגון: לזרופמיקול, מטרנידזול, דוקסיסיקלין).
תרופות אנטי ויראליות (כמו לזפנטור).
ציקלופסורן (מיועדת לנביעת הדנית שתל ולמחלות אחרות של המערכת החיסונית).
תרופות לטיפול בסרטן (ציקלופוספמיד, אסופוסיד).
גריסטרון- תרופה נגד בחילות והקאות.
חומרי הרדמה לניתוחים (נגון קורניום, קורניום).
תרופות המפילות מורפין, או תרופות אחרות ממשפחת האופיאטים.
תרופות נגד קרישה (כמו וורפין).
תרופות המפילות סטרואידים.
תרופה מצמח ההיפריקום (St. John's Wort) לטיפול בדיאנוס.

התרופה פריזולין עלולה להגביר את האפקט הטוקסי על הכבד של מינון יתר של פראזנמול.
הריון והנקה:
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה.
הריון: שימוש בתכשיר זה עלול לפגוע בהתפתחות תקינה של העובר. יש לדווח לרופא המטפל אם הינך בהריון או אם את מתכננת להרות מכיוון שתכשיר זה עלול להזיק לעובר. שימוש בתכשיר זה במהלך ההריון עלול להקטין את כמות ההמוגה הפוליט בדם של המטופלת. בנוסף הרופא עלול לפתח תסמונת גליתוס עקב השימוש בתכשיר זה במהלך השלבים האחרונים של ההריון. לעיתים התפתחו בעיות בקרישת הדם של תינוקות שנולדו לנשים שנטלו תרופות נוגדות פרנסים.
הנקה: שימוש בתכשיר זה אם הינך מניקה עלול לגרום לנמנם ושינויים של התינוק.

ההיגה ושימוש במכונות: השימוש בתרופה זו עלול לפגוע בערנות ועל כן מחייב זהירות בהיגה בכרכ, בהפעלת מכונות מסוננות ובכל פעילות המייחבת ערנות. באשר

לילדים יש להזהרם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה. אין לנהוג או להשתמש במכונית בזמן השימוש בתרופה עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך. אין לשלוח ילדות או ששקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

3. כיצד להשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. אין לעבור על המנה המומלצת.
יש להשתמש בתרופה זו ברמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.
יש להתמיד בטיפול לפי שומלך על ידי הרופא.
אין להפסיק לטול את התכשיר, אפילו אם אתה/ מרגישה טוב, בלי הוראת רופא. התכשיר זה עלול לגרום לתלות ולכן עלולה להתפתח תסמונת גמילה אם מפסיקה את הטיפול פתאומית. יש להפסיק את הטיפול בתכשיר בהדרגתיות כפי ששילץ לך הרופא.

אין ללעוס/ לבלוע עלולות להיות עם מינם.
אין לטול את התרופה עם משקאות חריפים.
רצוי לקחת את התרופה עם מזון או חלב.

ניתן לקחת את הטבליות.

אם שכחת לטול את התרופה - יש לטול מנה מיד שכנרכת אך בשום אופן אין לטול שתי מנות יחד. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל היוועץ ברופא.
אם נטלת בטעות מנת יתר או אם נטעות בלע על מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים, והבא אריזת התרופה יחד.
סימנים אפשריים של מנת יתר: דימוי של מערכת העצבים המרכזית הכולל חוסר שליטה בשרירים, אבדן הכרה, דיכוי נשימתי וקומה (תרדמת).
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפריזולין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

הפסק הטיפול ופנה לרופא באופן מיידי:
במקרה של תגובה אלרגית חריפה: פריחה בעור עם אדמומיות גירויים, כאבים, כיבים, שלפוחיות המפלטות או הרובד החיצוני של העור או מערבות את השפתיים, חלל הפה הנחריים או האוזניים, סרפדות, קשיים בנשימה, הזעה מוגברת, סומק, התנפחות בעיקר של הפנינים והגרונן, עילפון, הפסק הטיפול והזקק עזרה רפואית מיד!
בחתיחת הטיפול עלולות להופיע תופעות לוואי כגון נמנמם וחוסר אנרגיה. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר לקופת התגולות לתכשיר.

תופעות לוואי נפוצות (משיפיעות על פחות מ 1 ל 10 אנשים):

סחרחורת, הפרעת ריוח, תנועת עיניות, נימיים מתגלגלות, בעיות בהליכה ובתנועה.
תופעות לוואי אל נפוצות (משיפיעות על פחות מ 1 ל 100 איש):
כאב ראש, בחילה, הקאה, פריחה.

פנה לרופא באופן מיידי במקרים הבאים:

תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות (משיפיעות על פחות מ 1 ל 1000 איש):
שינוי בהתנהגות במצב רוח.
כאב במפרק או בעצם.
עליה באבני כבד.
התפתחות של מחלה בשם "כוויצה על שם דופיטרין" (כיפוף של אצבע אחת או יותר חזקת היד ללא יכולת לשירה).
צבנת אדמנית (מחלה אוטואימונית הגורמת לדלקת בחלקים שונים של הגוף כולל: העור, מפרקים, לב, בלויות, כבד וריאות). סימנים באופן כללי כוללים בין היתר: עייפות, חום, כאבים ונפוחות בריאות, פריחה בצורת טפחה על הפנים שמסכה את איזור החליים וגשר האף.
אי-תקינות בתאי דם: פנה לרופא אם הבנת בעור חיזור, דימום לא תקין, טייה לחבלות, חום או כאב הגרון.

בכל מקרה שבו, אחת מתופעות הלוואי מחמירה או אם הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או חל שינוי בהרגשתך הכללית עלך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים:

יש להורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילדה/ה. ראה לעיל תופעות לוואי ותרופות מיוחדות שפורטו.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה: תרופה זו לא תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה. אל תגרום להקאה לא הוראה מפורשת מהרופא. אין לטול תרופות בחושיך בודק תוויות והמנה בכל פעם שחינך נוסל תרופה.
הרכב משקפיים אם הינך לוקח להם.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/ תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אאות חודש.
יש לאחסן במקום יבש ומתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
C.M.C. Calcium, Starch, Gelatine, PVP K-30, Magnesium Stearate, Stearic Acid.

בעל הרישום והרוקח: יצרנית תרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בתאריך: 04/2012
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 024-79-21145-00
לשם הפשטות והולקת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים