

سيمفوكال

شراب

التركيب

سيمفوكال

بطعم توت العليق

شراب

يحتوي كل ٥ مل على

Oxolamine Citrate

50 mg

Oxolamine Citrate

50 mg

لائمة المواد غير الفعالة في المستحضر انظر الفقرة ٦
«معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت
لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد
يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

للتحفييف من السعال الجاف.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطة السعال.

٢) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال هذا الدواء:

• إذا وجدت حساسية لأحد مركبات المستحضر

• لدى الرضيع دون عمر السنة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

☒ يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو
عانيت في الماضي من:

• السكري - يحتوي المستحضر على ١,٩٢٥ غرام سوربيتول
في كل ٥ مل. إن الجرعة الدوائية الموصى بها للكبار قد تتجاوز
كمية السوربيتول اليومية المستهلكة المسموح بها لمرضى
السكري (وهي ٢٥ غرام لليوم).
• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة
الكبد.

☒ تحذيرات إضافية

إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب بذلك
قبل تناول الدواء.

☒ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى

بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية، وإضافات غذائية
وقفيتامينات، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب
أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول أدوية مضادة لتخثر الدم.

☒ الحمل والإرضاع

عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت حاملاً، أو مرضعة.

☒ السياقة

لا يؤثر إستعمال هذا الدواء على قدرة السياقة أو تشغيل
ماكنات.

☒ الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الرضيع دون عمر
السنة.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الاعتيادية في حال عدم وجود تعليمات
أخرى من الطبيب

الأطفال ٦-١٢ سنوات: ملزم بوصفة طبيب.

الأطفال ٦-١٢ سنة: ١٠ مل كل ٤ ساعات.

الكبار والأطفال فوق عمر ١٢ سنة: ١٥-٣٠ مل كل ٤ ساعات.

إنظر فترة زمنية قدرها ٤ ساعات قبل تناولك جرعة إضافية.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال ٧ أيام يجب التوجه إلى
الطبيب.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب ما حدد من
قبل الطبيب المعالج.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون إستشارة الطبيب،
حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

كيفية الإستعمال

يجب الحرص على قياس الجرعة بملعقة القياس المرفقة.

القنينة مغلقة بـ «قفل أطفال» (Kid Lock)، صمم هذا الغطاء بغية

منع الأطفال من فتح القنينة. لفتح القنينة إضغط نحو الأسفل ودور

إلى اليسار من خلال الضغط. أنظر الرسم.

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب! حتى ولو كان شعورك جيد، فإن العلاج الفوري ضروري.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة حال تذكرك؛ لكن لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين معاً.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال هذا الدواء قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز ألا تعاني أيها منها.

- خلال إستعماله قد تظهر أعراض جانبية مثل قلة الراحة في المعدة أو حرقان. يمكن الإمتناع عن هذه الإضطرابات من خلال تناول الدواء بعد وجبات الطعام.

- شعور بخدر خفيف في جوف الفم الذي ينقضى خلال وقت قصير.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب حفظ هذا الدواء في مكان مظلم دون ٢٥ درجة مئوية. بالإمكان استعمال الدواء حتى ٦ أشهر بعد فتح القنية للمرة الأولى، على ألا يتتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

سيمفوكال بطعمن العسل - الليمون

شراب

Sorbitol, povidone K-90, propylene glycol, citric acid, sodium cyclamate, saccharin, methylparaben, honey flavour, color E-150 (caramel powder), propylparaben, water.

تحتوي كل ٥ ملل على ١,١٤ ملغ صوديوم و ١,٩٢٥ غرام سوربيتول.

إن الجرعة الدوائية الموصى بها للكبار قد تتجاوز كمية السوربيتول اليومية المستهلكة المسموح بها لمرضى السكري (وهي ٢٥ غرام لليوم).

تحتوي كل ٥ ملل على ١٠ ملغ صوديوم سيكلمات و ٥ ملغ سكارين.

سيمفوكال بطعمن توت العليق

شراب

Sorbitol, propylene glycol, citric acid, raspberry flavour, alcohol, sodium cyclamate, saccharin, methylparaben, edicol supra red 4Rponceau, propylparaben, water.

تحتوي كل ٥ ملل على ١,١٤ ملغ صوديوم و ١,٩٢٥ غرام سوربيتول.

إن الجرعة الدوائية الموصى بها للكبار قد تتجاوز كمية السوربيتول اليومية المستهلكة المسموح بها لمرضى السكري (وهي ٢٥ غرام لليوم).

تحتوي كل ٥ ملل على ١٠ ملغ صوديوم سيكلمات و ٥ ملغ سكارين.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

سيمفوكال شراب بطعمن العسل - الليمون: شراب صافي بلونبني فاتح.

قنية بلاستيكية تحتوي على ١١٥ ملل.

سيمفوكال شراب بطعمن توت العليق: شراب صافي بلون أحمر.

قنية بلاستيكية تحتوي على ١٠٠ ملل.

المنتج وصاحب الإمكياز:

تيقع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض..، ص.ب. ٣١٩٠، بيتح - تكفا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فُحص ورُخص

في تاريخ ٢٠١٤/٣/٢٠

أرقام سجل الأدوية في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيمفوكال شراب بطعمن العسل - الليمون:

٠٢٨-٢٢-٢١٦٢١-٠٠

سيمفوكال شراب بطعمن توت العليق:

٠١١٢-٢٧٦٤-٠٠

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

300081705-03