

■ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على اللكتوز وقد يسبب الحساسية لدى الأشخاص الحساسين للكتوز. يجب إستشارة الطبيب إذا قيل لك في الماضي بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة.

٣) كيفية استعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من كيفية إستعمال الدواء.

الجرعة الدوائية الاعتيادية في حال عدم توفر تعليمات أخرى من الطبيب:

الكبار: قرص واحد كل ٤ ساعات (حسب اللزوم).

الأطفال بأعمار ٦-١٢ سنة: قرص واحد حتى ٣ مرات في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إرشادات الإستعمال

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام. يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

لا يجوز مضغ، سحق أو شطر القرص.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه في الحال إلى الطبيب أو

لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. حتى ولو كنت تشعر بحالة جيدة على الرغم من تناول جرعة مفرطة، فإن العلاج الفوري هو أمر ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر خطير للكبد.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد فيجب تناول جرعة حال تذكرك، لكن لا يجوز بأي من الأحوال تناول جرعتين بنفس الوقت!

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تيفع - كولد قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه في الحال إلى الطبيب إذا:

• كنت تعاني من إسهال، غثيان، ألم في البطن.

• ظهرت أعراض الحساسية: صعوبة في التنفس، صعوبة البلع، إنتفاخ الشفتين، اللسان أو الوجه، حكة وطفح (شرى)، حساسية لضوء الشمس

• پاراسيتامول قد يؤدي في حالات نادرة لظهور أمراض جلدية شديدة، التي علاماتها قد تكون: احمرار، طفح، حويصلات، ضرر جلدي واسع النطاق.

أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر حتى ولو تناولت في الماضي مستحضرات تحوي على المركب الفعال پاراسيتامول ولم تعاني من أعراض جانبية.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري

• كنت تعاني من مشاكل في الكبد (إصفرار الجلد أو العينين)، ميل زائد لحدوث نزف وكدمات، مشاكل في الدم مثل فقر الدم، إرهاق شديد

• كنت تشعر بالعطش أو زيادة الشهية للطعام، دوار، إغماء (ضغط دم منخفض)، ضغط في الصدر، بلغم أكثر لزوجة

• ظهر طفح أو تقشر في الجلد أو تقرحات في الفم

• كنت تعاني من تناقص مفاجئ في الوزن، قلة الشهية للطعام

• كنت تعاني من اضطرابات في الرؤية

• كنت تعاني من تسرع النبض أو الشعور بنبض غير منتظم

• كنت تعاني من مشاكل في التنفس

• كنت تعاني من صعوبة التبول (من المرجح أن تحدث أكثر لدى الرجال الذين يعانون من تضخم في غدة البروستات)

• ظهر ضعف في العضلات، تشنجات، قلة التنسيق

يجب مراجعة الطبيب إذا:

كنت تعاني من إرتفاع في ضغط الدم

أعراض جانبية إضافية:

• نعاس

• جفاف في الفم، العينين والأنف

• طنين في الأذنين

• إكتئاب أو مزاج متدني، كوابيس، إرتباك، زيادة الإنفعال، فرط النشاط (خاصة لدى الأطفال)، قلة الراحة

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين في مكان مظلم بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Lactose monohydrate, povidone, sodium starch glycolate, hypromellose, titanium dioxide, polyethylene glycol, quinoline yellow aluminium lake, iron oxide yellow, indigo carmine aluminium lake [FD&C blue no. 2], colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, hydrogenated vegetable oil, Eudragit E 100.

يحتوي كل قرص على ٢٦,٥ ملغ لكتوز و-٠,٤٧-٠,٧ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

أقراص مستديرة مطلية لونها أصفر مائل للأخضر. تحتوي العلبة على ٢٠ قرصاً.

المنتج، صاحب الإمتياز وعنوانه: تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، /ص.ب. / ٣١٩٠، بيتح - تكفا

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٠٠-٩٣٥٣٤-٦١-١٥٦

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تشرين الأول ٢٠١٣

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

322K500200416