

يسوق هذا الدواء بوصفة طبيب فقط

اقرأ النشرة تبعن حتى نهايتها قبل البدء باستعمال الدواء.

اقت ووزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحظواها حصر ورخص من قبلها في 05/2012

كيندين سولفات 200 ملغم**أقراص**

التركيب: Quinidine sulfate 200 mg:

الماء غير الفعالة:

Starch, Talc, Gelatin, Acacia, Magnesium stearate, Lactose DC.

يحتوي كل قرص على 31 ملغم لاكتون.

الغالية الطيبة: يستخدم الدواء لتنظيم اضطرابات نبض القلب.

الخصائص الملاجحة: مضادات اضطرابات النظم القلبي.

متى لا يجوز لك استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لكتيندين، أو إذا

ما كان لك من الآخرين.

إذا ظهر لك في الماضي - thrombocytopenic purpura - مرض

يظهر بنزيف تحت جلدي الذي يظهر شكل طفح جلدي او كدمات عند

استعمال كيندين أو كيندين.

إذا كنت تعاني من قصور في القلب أو من خلل آخر في وظيفة القلب

(بالإضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب)، وخصوصاً في ظل عدم زرع

جهاز صناعي لتقطيم ضربات القلب.

إذا كنت تعاني من ضغف شديد في العضلات (ميستانتا غرويس).

المرض الذي قد يعانون من الأدوية المضادة لل kokilinen.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مرحلة الطبيب مقدماً:

إذا كنت حاملاً لخطف الجنين أو مرضعة. ينصح الدواء في حليب الأم ولذا

يمنع الرضاعة في فترة إنتظام الجنين بالدواء.

إذا كنت تعاني من آلام في الصدر أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز

التنفس (كاربيون)، القلب مثل: قصور القلب، أسداد القلب (block) تمدد

أو أمراض قلبية أخرى.

البكي، الكثي/جهاز البول، الغدة الدرقية (thyrotoxic)، جهاز الدم (مثل متاخر).

الصفائح - لة المفاصد الدموية (platelet) ضغط دم متاخر، نفخة، نفخ، نفخة،

التهابات حادة، مستويات كالسيوم منخفضة أو مرتفعة، تسمم الديجيتاليس.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية؟

إن استعمال هذا الدواء قد يسبب من يقطنه، تشوش الرؤية والدوخة، إذا

يجب اتخاذ الاحتياطات الأخرى تقطيل البقطة. يجب تجنب الطلاقة من

وحماسة أي اشتراطات أخرى تقطيل البقطة. يجب تجنب الطلاقة من

ركوب الدراجات، العرب بعقرية من حرارة المرور وما شابه.

قد يسبب هذا الدواء حساسية عند التعرض لأشعة الشمس، لذلك يمنع

العرض لأشعة الشمس أو المعالجة في مؤسسات ديانة الجلد وأحرار

على أحد الاختصاصات المناسبة (مالبس طويلة الأكمام، قبة، مرهم، واقي من

الشمس، الخ).

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء تناول هذا الدواء.

تحذيرات:

قد يسبب استعمال هذا الدواء لتشوش الرؤية.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات مقاربة أو لفترة طويلة بدون

استئصال الطبيب.

يجب إلقاء الطبيب عن أي حساسية لديك ل الطعام أو عقاقير قبل استعمال الدواء.

إذا كنت تشعر بعملية حرجية من أي نوع (بما في ذلك جراحة الأستان) أو

علاج مستعجل، فعليك إعلام الطبيب أنك تستعمل الدواء.

يجب اخذ الجيطة عند الانتقال من وضع استلقائه/جلوس إلى وضع الوقوف

عليك استشارة الطبيب إذا زلزلت الجيطة أو فوتت الدواء.

في فترة استعمال الدواء، لأن هذا الخليط قد يؤثر على نسبة الدواء في الدم.

تحذير الأعراض على لاكتون. يمكن استعمال الدواء إذا كان لديك حساسية لاكتون.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تناولت دواء مع كاف ماء، يُمنع الاستقاء خلال 30 دقيقة بعد تناول الدواء.

عليك استشارة الطبيب إذا كنت بحاجة إلى جريب فروت أو عصير جريب

فروت مع الدواء، لأن هذا المزيج قد يؤثر على نسبة الدواء في الدم.

إذا تسببت الأدوية التي تناولت الدواء في الوقت المحدد، وتذكرت خلال ساعتين فيجب

تناول الدواء، أما إذا تذكرت بعد ذلك، فلا تتناول الجرعة التي نسيتها يُمنع

تناول الجرعة الثانية.

هذا الدواء غير مخصص عادة للأولاد والرضع.

طريقة الاستعمال:

ليس للطبيخ: يجب بلع الدواء مع كاف ماء مليء على معدة خاوية ساعة

قبل الأكل أو سائل يعطيه.

لقد افاد اصحاب اضطرابات المعدة، يمكن ان يوصي الطبيب تناول الدواء مع الطعام او حليب

يُمنع مسح ساقه الفرع.

حتى لا تصلح تحسين على صحتك فيمنع التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب.

تجنب الآيس كريم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً

عن متناول أيدي الأطفال والأدوية، وذلك لتجنب اصطيادهم بالتسهيل.

أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو اذا اتي بالطفولة خطأ عن هذا الدواء،

عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحبة جرعة الدواء (ال بالنسبة لجرعة

راشة اندفع الاعراض الجانبية). لا تسبّب اي تقييد بدون تليميات صريحة من

الطبيب، وصفه هذه الدواء مرضه، لدى مرض آخر قد يكون مضر.

لا تتعط الادوية لاقاربها، جراثين وعارف، لا تتناول اي الدواء في العتمة!

يجب شخيص طعام الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية

اذا ازرم الامر ذلك.

التخزين: يجب حفظ الدواء في درجة حرارة تتحت 25°C وجاف.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محددة فقط، حتى ولو ظلت

في علبها الأصلية وتم حفظها بمحجب تليميات الحزن.

الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة

على العبوة، في حالة الشك، اطلب استشارة الصيحي الذي

صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين الأدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: 023-85-20912-00

المنتاج: ريك للصناعات الدوائية م.ض، شارع هميلاخا 30 حلوان