

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא/ בעיון את העלון עד סופו כטרם תשתמשו/ בתרופה
פורטס עלון זה קבע ע"י משרד הבריאות ותוננו נבדק ואושר על ידי - 05/2012

קנידין סולפט 200 מ"ג טבליות

הרכב: Quinidine sulfate 200 mg

חומרים בלתי פעילים:

Starch, Talc, Gelatin, Acacia, Magnesium stearate, Lactose DC.

כל טבליה מכילה 31 מ"ג לקטוז.

פעילות רפואית: תרופה המשמשת להסדרת הפרעות בקצב הלב.

קבוצה תרופתית: אנטי אריתמית.

מתי אין להשתמש בתכשיר:

אין להשתמש אם ידועה רגישות לקנידין, או לאחד מהמרכיבים

האחרים של התרופה.

אם בעבר פיתחת thrombocytopenic purpura מחלה המתבטאת

בדימומים תת עוריים הגורמים למראה המזכיר פריחה או חבורות

שימוש בקנידין או בקניין.

אם הינך סובלת מאי ספיקת לב או מליקוים אחרים בתפקוד

הלב (בנוסף לקצב לב לא סדיר) בייחוד בהעדר השתלת קוצב

לב מלאכותי.

אם הינך סובל מחולשת שרירים חמורה (מיאסטניה גרויס).

בחולים העלולים לסבול מתרופות אנטי כולינג'יות.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת

הטיפול:

אם הינך בהריון, מתכננת הרות, או מיקה. התרופה עוברת בחלב

האם ולפיכך אין להינק במהלך השימוש בתרופה.

אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה

(כגון אסטמה, הלב [כגון: אי ספיקת לב, חסימת לב (heart block),

הארכת QT (QT prolongation)] או עבות לב אחרות, הכבד,

הקליה/מערכת השתן, בלוטת התיירוס (תירואיד), מערכת הדם (כגון

ריקשה, טרומבוציטופניה- בעבר טסיות דם וכו'), לחץ דם נמוך,

ברדיקרדיה, זיהומים חריפים, רמות קלציום נמוכות או גבוהות,

הערלת דיג'יטאליס.

אך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות, לטשטוש ראייה

ולסחרחורת, ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת

מנוע מכונית וכל פעילות המחייבת ערנות.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים

קבוצת הכביש ודומה.

תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש, על

כן המנע/י מחשיפה לשמש או מטיפול במכוני שיוף ודאג להגנה

מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, קרם הגנה וכו').

אין לשלוח יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטשטוש ראייה.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי

להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי,

עליך להודיע על-כך לרופא לפני תחילת התרופה.

אם עליך לעבור ניתוח מכל סוג שהוא (כולל ניתוח שיניים) או טיפול

דחוף, עליך להודיע לרופא שהינך נוטל תרופה זו.

יש להיזהר בזמן מעבר ממצב שכבה/שיבה למצב עמידה מתוך

חשש לסחרחורת.

עליך להיוועץ ברופא באם הינך צורך אשכוליות או מיץ אשכוליות

בו זמנית עם תרופה זו, מאחר ושיילוב זה עלול להשפיע על רמת

התרופה בדם.

ייתכן ותצטרך לעבור בדיקות דם ותפקודי לב במהלך השימוש

בתרופה.

הטבליות מילות לקטוז. אין להשתמש אם קיימת רגישות ללקטוז.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטלת תרופות נוספות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי

זונה, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח

לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות

בין תרופתיות. בייחוד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות

להרגעה, תרופות לאפילפסיה, פימזיד (לפסיכזה), בארביטורטיים

(כגון פנטברביטל), הידנטואין (כגון פניטואין).

תרופות נגד קרישת דם (כגון וורפין).

רפמיפיין ורפמיפן (לשחפת).

דיג'וקסין (תרופות אחרות המשפיעות על הלב.

הפרעות בקצב הלב ויטר לחץ דם).

חוסמי טטא (כגון פרופרנולול).

סימטידין (אלוקוז), סותר חומצות.

אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידיים (כגון אריתרומיצין).

מפלוקין.

מעכב האנזים קרבוניק אנהידראז (אצטאזולאמיד).

קטוקונזול, ורויקאנאזול או טראקאנאזול (נגד פטריות).

סודיום ביקרבונט.

משנתנים מקבוצת התיאזידים (כגון הידרוכלורתיאזיד ליתר לחץ

דם או אי ספיקת לב כרונית).

מעכב כאבים מקבוצת האופיואידים (כגון קודאין).

אנטיביוטיקה מקבוצת הקווינולונים (כגון ציפרופלוקסאצין).

אנטיביוטיקה ממשפחת הטטולידיים (כגון טליתרומיצין).

טרופדין (נגד קדחת השחח).

תרופות ממשפחת מעכבי פוספודיאסטראז 5- כגון סילדנאפיל

(לטיפול באין אונות).

תרופות ממשפחת הפנטואזינים (כגון כלורפראמאזין - אנטי פסיכטי).

פנקוריום.

• סוקציניל כולין (לצורכי הרדמה).

• ניפדיפין (לחלחול לב ויטר לחץ דם).

• אמילוריד (משנתן).

• אסטמיזול (אנטיהיסטימין).

• ציאפריד (לעיכול).

• דופתיליד (ללב).

• דרופרדול, הלופרידול (אנטי פסיכטי).

• מעכבי HIV protease כגון אינדינאביר (לטיפול באיידס).

• קיוניולין (אנטיביוטיקה) סטרפטוגרמין (אנטיביוטיקה כגון

פריסטאמיציין).

• ריאפרידון (אנטי פסיכטי).

• אריפריאזול (אנטי פסיכטי).

• דיג'יטוקסין (ללב).

• מעכבי סיפיה חוזרת של נוראפינרין.

• פרקאניאמיד (ללב).

• פרופאנפן (ללב).

• אנטיכולין אסטראז (כגון פירידיוסטימיין - לטיפול בחולשת שרירים).

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש

בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: טעם מר, אודם עיבור עם

עקצוץ, בחילה או הקאה, שלשול, כאבי בטן, חוסר תאבון, צרבות

רגישות לאור השמש

בכל מקרה שבו תופעת הלוואי מחמירה או ממשיכה- עליך להתייעץ

עם הרופא מיד.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: אם מתפתחת תגובה

אלרגית חריפה, הכוללת: פריחה, גירוד בעור, קושי נשימה,

לחץ בחזה, התנפחות תורפתיים, פנים או הלשון- הפסק הטיפול

ופנה לרופא באופן מיידי.

פנה לרופא באופן מיידי אם מתפתח:

שנתן כהה, סחרחורת או תחושת עיפולן, עיפולן, שינויים בראיה,

שינויים בקצב הלב (האטה, עלייה או קצב לב לא סדיר).

שינויים בשמיעה או איבוד השמיעה, שינויים מנטאליים או במצב

הרוח, צואה "חיוורת", כאב בטן חמור או ממשך.

כאב ראש, זמזום באוזניים, הצרבה של העור או של העיניים, עייפות

או חולשה, חום, תת לחץ דם, דימום (ממאף והתכיכים), כאבים בחזה,

כאבים במפרקים וגם נפיחות, דימום תת עוריים או חבלות יציאות

דופן, טרומבוציט ופניה (מעטס במספר טסיות הדם) רעד.

בכל מקרה שבו תופעת הלוואי מחמירה או אם הינך מרגיש

תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך

הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

סימנים אפשריים של מנת יתר: שלשול, ורטיגו (סחרחורת סיבובית),

טיניטוס, (צלצולים באוזניים), הפרעות בראיה שטטוש בראייה, עיפולן,

עלייה או ירידה בקצב הלב, ירידה בלחץ הדם, קושי בנשימה, קושי

בהליכה, איבוד השמיעה, בעת-אור (פוטופוביה), בלבול, כפל ראייה,

דליריום (טרף), כאבי ראש, פעימה, טיקיטריה חדרית (קצב לב

מהיר שמקורו באחד ממדרי הלב: תופעה הטיפול ופנה לרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים: על הורסים

לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת

הניתנת לילד!

ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון: מינון לפי הוראת הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין להפסיק לטול את התרופה בבת אחת ללא התייעצות עם הרופא.

רצוי לטול את התרופה על קיבה ריקה. שעה לפני האוכל או שעתים

אחרי, אלא אם מתפתחת חוסר נוחות בבטן, ואז ניתן לטול את

התרופה עם האוכל כדי להקטין גירוי הקיבה.

יש לטול עם כוס מים.

אין לשכב במהלך 30 דקות לאחר נטילת התרופה.

עליך להיוועץ ברופא באם הינך צורך אשכוליות או מיץ אשכוליות

בו זמנית עם תרופה זו, מאחר ושיילוב זה עלול להשפיע על רמת

התרופה בדם.

אם שכחת לטול תרופה זו בזמן קצוב וזכרת תוך שעתים יש

ליטול את המנה, אם זכרת מאוחר יותר, דלג על המנה שהפסדת.

אין לטול שתי מנות ביחד!

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

אופן השימוש:

אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם כוס מים מלאה על קיבה ריקה

שעה לפני או שעתים לאחר ארוחה.

למניעת הפרעות קיבה, הרופא יכול להמליץ לקחת עם מזון או

עם חלב.

לא ניתן לחצות/לכתוש את הטבליה.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא

התייעצות עם הרופא.

מנעו/ הערה: לתרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור

מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד

לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך. (עבור סימני

מנת יתר ראה תופעות לוואי).

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר היא עלולה להזיק.

אל תיתן תרופה זו לילדך, סניקר או מכריך.

אין לטול תרופות בחושיך! בדיק התוית והמנה בכל פעם שהינך

נוטלת תרופה. הרכב משפחים אם הינך זקוק להם.

אחסנה: יש לאחסן במקום יבש מתחת ל- 25°C.

גם לפי תנאי האריזה/ האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות

לתקופה מוגבלת בלבד. לא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר!

בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מי רישום התרופה: 023-85-20912-00

יצרן: רקח תעשיית תרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון.

מק"ט: 05/14 5QU11084