

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
נאו-ויין וטרינרי אבקה מסיסה למי שתייה Neo-Vine Veterinary

2. חומר פעיל
נאומיצין סולפט 100% Neomycin sulfate

3. למה מיועדת התרופה התרופה מיועדת לטיפול במחלקות במערכת העיכול הנגרמות על ידי מיקרו-אורגניזמים הרגישים לנאומיצין בתרנגולי הודו. קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת האמינוגליקוזידים

4. התוויות נגד
אין להגיש את התכשיר ללהקות רבייה.
אין להזריק! למתן דרך הפה בלבד.
אין להגיש לבעלי חיים במקרה של רגישות יתר לנאומיצין או לאנטיביוטיקות ממשפחת האמינוגליקוזידים.
אין להגיש לבעלי חיים במידה וקיימת חסימת מעיים.

5. תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה
תרנגולי הודו

7. צורת המתן ומינון
בהתאם להוראות הווטרינר.
למתן במי שתייה.
מגיל יום עד שבוע: 1 גרם ל-15 ליטר מים.
מגיל שבועיים עד 8 שבועות: 1 גרם ל-10 ליטר מים.
מגיל 9 שבועות ומעלה: 1 גרם ל-5.5 ליטר מים.
להגיש במי שתייה במשך 3-6 ימים.

8. אופן השימוש בתכשיר
לשימוש במי שתיה בלבד. יש להמיס את התרופה לפני השימוש.
יש להגיש ללהקה כמקור בלעדי למי שתייה.
יש להכין תמיסה טרייה כל 4 שעות.

9. זמן המתנה
4 ימים לפני השחיטה.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחית המטרה
לבעלי חיים חולים יש תיאבון מופחת ודפוס שתייה שונה, ולכן בעלי חיים חולים מאוד עשויים להזדקק לטיפול פרנטרלי.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
האבקה מיועדת להמסה במים ואין להשתמש בה כפי שהיא. יש להשתמש בתרופה על סמך בדיקת רגישות מיקרוביולוגית של חיידקים שבודדו מהחיה, או על סמך מידע אפידמיולוגי אזורי. שימוש בתכשיר שלא על פי ההנחיות שבעלון יכול לגרום לעליה בהימצאות של חיידקים עמידים לנאומיצין ולהפחית את היעילות הטיפול בתרופות ממשפחת האמינוגליקוזידים עקב הפוטנציאל לעמידות צולבת.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש. על אנשים עם רגישות יתר ידועה לאמינוגליקוזידים להימנע ממגע עם נאו-ויין וטרינרי.
אם מופיעים תסמינים כמו פריחה בעור יש לפנות לרופא. התנפחות בפנים, בשפתיים או בעיניים, או קשיי נשימה הם סימנים חמורים יותר, ויש לפנות לטיפול רפואי דחוף.
- הריון והנקה של בעל החיים המטופל.
אין להגיש ללהקות רביה.
- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות
חומרי הרדמה כללית ותרופות להרפיית שרירים יכולים להגביר את האפקט החוסם הנירולוגי של אמינוגליקוזידים. הדבר יכול לגרום לשיתוק ודום נשימה.
יש לנקוט בזהירות מיוחדת בעת שימוש במקביל עם חומרים משתנים חזקים וחומרים אוטוטוקסיים או נפרוטוקסיים פוטנציאליים.
- מינון יתר
תופעות נפרוטוקסיים ואוטוטוקסיים יכולים להתרחש במקרה של מינון יתר.
- חוסר התאמה (incompatibility)
בהעדר מחקרים על הנושא, אין לערבב תרופה זו עם תרופות וטרינריות אחרות.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון יש לאחסן מתחת ל-25°C
- חיי מדף לאחר פתיחה ראשונית: ניתן להשתמש עד תאריך התפוגה של התכשיר.
- חיי מדף לאחר המסה במים: 4 שעות.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש
כל שארית של תכשיר ווטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביו.ב.

13. מידע נוסף

- התרופה ארוזה במיכל פלסטיק לבן ומכילה אבקה בצבע לבן-לבנבן.
- כל אריזה מכילה 50 או 500 גרם. יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
- בעל הרישום אביק תוצרים וטרינריים בע"מ. ת.ד. 489 בית שמש

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 01/2021

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 079-46-91288