

Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986

Препарат продается без рецепта врача

Отривин Ментол 0,1% Раствор для интраназального введения

Действующее вещество и его концентрация:

Xylometazoline HCl 0.1%

Ксилометазолина гидрохлорид 0.1%

Неактивные ингредиенты и аллергены в препарате - см. пункт 6 и пункт 2 (Важная информация о некоторых ингредиентах препарата).

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата. Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Используйте препарат в соответствии с указаниями в пункте «Дозировка» данной инструкции. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усугубляются или не улучшаются в течение **3 дней**.

1 Для чего предназначен препарат?

Препарат предназначен для быстрого облегчения заложенности носа на срок до 10 часов.

Терапевтическая группа: Отривин Ментол содержит ксилометазолина гидрохлорид, принадлежащий к группе симпатомиметиков. Препарат содержит также ментол и эвкалипт.

2 Перед применением препарата

X Не использовать препарат в следующих случаях:

- при гиперчувствительности (аллергии) к действующему веществу (ксилометазолина гидрохлориду) или к любому другому компоненту, содержащемуся в лекарстве (см. пункт 6).
- при узкоугольной глаукоме (Narrow angle Glaucoma).
- после трансфеноидального (через носовую полость) удаления гипофиза или после операции, в ходе которой обнажалась внешняя оболочка центральной нервной системы.

! Особые предостережения относительно использования препарата:

Перед применением препарата Отривин Ментол сообщите врачу, если:

- вы страдаете от повышенного давления.
- вы страдаете от сердечного заболевания или синдрома удлиненного интервала QT.
- вы страдаете от гиперфункции щитовидной железы.
- вы страдаете от сахарного диабета.

Подобно другим препаратам для облегчения заложенности носа, Отривин Ментол может вызвать нарушения сна, головокружение и дрожь у пациентов с

повышенной чувствительностью. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вас беспокоят данные симптомы.

Не следует часто применять данный препарат, либо применять более 3 дней подряд. В случае если симптомы не проходят, необходимо проконсультироваться с врачом. Длительное или слишком частое применение препарата может привести к рецидиву или усугублению заложенности носа.

- Отривин Ментол не предназначен для впрыскивания в глаза или для глотания.
- Недопустимо превышение рекомендуемой дозы, в особенности для детей и пожилых.

Дети и подростки:

Отривин Ментол не предназначен для детей и подростков младше 12 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Если вы принимаете, либо недавно принимали другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Это в особенности важно, если вы принимаете антидепрессанты из группы ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО) или из группы трициклических/тетрациклических антидепрессантов.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность:

Беременность:

Не использовать препарат при беременности.

Кормление грудью:

Если вы кормите грудью, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем применять Отривин Ментол.

Фертильность:

Нет достаточной информации о влиянии препарата на фертильность. Поскольку препарат усваивается организмом в малых количествах, влияние на фертильность крайне маловероятно.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:

Каждое впрыскивание препарата содержит 0,014 мг бензалкония хлорида, что эквивалентно концентрации 0,1 мг на 1 мл. Бензалкония хлорид может вызвать раздражение или отечность в носу, в особенности при длительном применении препарата.

3 Как использовать препарат?

При возникновении сомнений относительно дозировки и способа применения препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая дозировка, как правило:

Для детей старше 12 лет и для взрослых:

Одно впрыскивание в каждую ноздрю 3 раза в сутки, по мере необходимости. Не превышать дозу в 3 впрыскивания в сутки в каждую ноздрю.

Данное лекарство не предназначено для детей младше 12 лет.

Не глотать. Препарат предназначен исключительно для наружного использования.

Способ применения:

1. Осторожно высморкайтесь.
2. Снимите защитный колпачок.

Не следует обрезать кончик дозирующего устройства (см. рис. 1).
Дозированный спрей готов к использованию



Рис. 1

Перед первым использованием нажмите 4 раза на помповое дозирующее устройство для его активации. После активации помповое дозирующее устройство, как правило, остается заряженным от применения к применению в течение дня. Если спрей не распыляется после нажатия на помповое дозирующее устройство до упора, либо если лекарство не использовалось несколько дней, необходимо заново активировать помповое устройство. Нажмите 4 раза на насос, как было проделано ранее. Следует остерегаться попадания в глаза или в рот.

3. Держите флакон головкой вверх; большой палец должен поддерживать флакон снизу, наконечник должен находиться между двумя пальцами.
4. Слегка наклоните голову вперед и введите наконечник в ноздрю.
5. Нажмите на дозатор дыша обычным образом и осторожно вдохните через нос.
6. Повторите те же действия со второй ноздрей.
7. Сразу после использования очистите и вытрите насухо наконечник, прежде чем возвращать на место защитный колпачок.

Во избежание распространения инфекции недопустимо использование флакона с лекарством более чем одним человеком.

Не превышать рекомендуемую дозу.

Продолжительность лечения

Не следует применять препарат более **3 дней подряд**. В случае если симптомы не проходят, следует проконсультироваться с врачом.

В случае передозировки или случайного приема препарата внутрь ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приёмный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата.

Если вы забыли вовремя принять препарат, не принимайте двойную дозу.

Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приеме препарата проверяйте его этикетку и дозировку. При необходимости надевайте очки.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4 Побочные эффекты

Как и при использовании любого лекарственного препарата, использование Отривин Ментол может привести к возникновению побочных эффектов у некоторых

потребителей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Прекратите прием лекарства и немедленно обратитесь к врачу в случае появления симптомов, могущих свидетельствовать об аллергической реакции:

- затрудненное дыхание или глотание.
- отек лица, губ, языка или горла.
- сильный кожный зуд, сопровождаемый красной сыпью или выпуклыми высыпаниями на коже.

Дополнительные побочные эффекты:

Частые побочные эффекты (эффекты, проявляющиеся у 1-10 пользователей из 100):

Сухость или раздражение слизистой носа, тошнота, головные боли, локальное ощущение изжоги.

Очень редкие побочные эффекты (эффекты, проявляющиеся менее чем у одного пользователя из 10,000):

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), затуманенное зрение, ускоренное сердцебиение или аритмия.

В случае появления или обострения какого-либо из побочных эффектов, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно нажав на ссылку «отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на домашней странице веб-сайта министерства здравоохранения (www.health.gov.il) ведущую к онлайн форме отчета о побочных эффектах ,либо пройти по следующей ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Можно также сообщить в компанию GSK Израиль по электронной почте il.safety@gsk.com

5 Как хранить препарат?

- Предотвратите отравление! Во избежание отравлений данное лекарство, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Условия хранения: Хранить при температуре ниже 25°C.

6 Дополнительная информация

- помимо действующего вещества препарат содержит: Sorbitol, Sodium Chloride, Disodium phosphate dodecahydrate, Castor Oil Polyoxyl hydrogenated (Cremophor RH 40), Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate, Disodium Edetate, Levomenthol (Menthol), Cineol (Eucaliptol), Benzalkonium Chloride, Purified water.

Как выглядит препарат и содержимое упаковки:

Отривин Ментол представляет собой белый раствор с запахом ментола и эвкалипта. Выпускается во флаконах, высвобождающих отмеренную дозу продукта. Флакон содержит 10 мл.

- **Владелец регистрационного удостоверения и его адрес:** Джи Эс Кей Консьюмер Хелскейр Израиль Лтд. П. я. 3256, Петах-Тиква.
- **Производитель и его адрес:** Глаксосмитклайн Консьюмер Хелскейр Швейцария Эй Джи, Риш, Швейцария.

Составлено в октябре 2020 г.

Регистрационный номер лекарства в государственном реестре Министерства здравоохранения: 1088929108

Торговые знаки принадлежат GSK на правах собственника или на основании лицензионного договора. ©2020 GSK или лицензиат.