

04



| | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Description | Olumiant | Size (W) x (H) | 210 x 148 mm |
| Product spec | Tablets | | |
| | | Font (type & min. size / language) | Arial 13 p (Arb) |
| | | | (small remark is 9 p) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Type | IFU | Color | CMYK |
| Date | 09/05/2021 | | |
| Artwork operator | Nurit Assayag | | |
| Job no. | Project # 21000633 | | |
| | | | |

Our Expertise. Your Success.

معلومات للمتعالجين حول أولوميانت® (باريسيتينب)

يحتوي هذا المستند على معلومات مهمة، التي يجب عليك أن تعرفها قبل الاستعمال وخلال استعمال أولوميانت.

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب مفاصل روماتوидي معتدل حتى شديد، الذين لا يجرون العلاج السابق لهم بدواء واحد مضاد الروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARD لم يكن فعالاً بما يكفي أو كان غير متحمل. يمكن استعمال أولوميانت كمستحضر وحيد أو بالدمج مع ميتوترексات (methotrexate).

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي المعتدل حتى الحاد، المعروف أيضاً بالإكزيما التأتبية. يمكن استعمال أولوميانت بالدمج مع أدوية لعلاج الإكزيما التي تدهنها على الجلد أو استعماله كمستحضر وحيد.

للحصول على معلومات كاملة عن الدواء، يجب قراءة نشرة الدواء المرفقة في عبوة المستحضر. كذلك، نشرة الدواء المنشورة على موقع وزارة الصحة:
<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

احتفظ بهذه المعلومات معك ومررها لأفراد آخرين من الطاقم الطبي الذين يشاركون في علاجك.

اسمك:

اسم الطبيب (الذي وصف أولوميانت):

رقم هاتف الطبيب:

تم فحص هذه المعلومات والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في تاريخ: نيسان 2021



عدوى

قد يؤدي أولوميانت إلى تفاقم حالة عدوى موجودة أو أن يزيد خطر أن تتطور لديك عدوى جديدة أو أن يزيد خطر التشغيل الفيروسي. بلغ الطبيب إذا تطورت لديك أعراض عدوى، مثل:

- سخونة، جروح، شعور بالتعب المتزايد مقارنة بالحالة الاعتيادية أو مشاكل أسنان.
- سعال لا يختفي، تعرق ليلاً وانخفاض في الوزن. هذه قد تكون أعراض مرض السل (مرض رئوي معدي).
- طفح جلدي مصحوب بألم وبثور. هذا العارض قد يكون علامة لعدوى الهرپس النطافي.

دهون في الدم

قد يؤدي استعمال أولوميانت إلى ارتفاع مستوى الدهون في الدم. سيفحص الطبيب مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول، خلال علاجك بأولوميانت.

الحمل

- يُمنع تناول أولوميانت إذا كنت حاملاً أو تشکین بأنك قد تكونين حاملاً.
- استعملني وسيلة منع حمل ناجعة خلال العلاج بأولوميانت (ولمدة أسبوع واحد بعد ذلك، إذا توقفت عن العلاج).
- أبلغ الطبيب فوراً إذا حملت (أو إذا كنت ترغبين أن تحملين).