


04



Description	Olumiant	Size	210 x 148 mm
Product spec	Tablets		(W) x (H)
		Font (type & min. size / language)	Myriad pro 9.5 p (Rus) (small remark is 8 p)
		Color	 CMYK
Type	IFU		
Date	10/05/2021		
Artwork operator	Nurit Assayag		
Job no.	Project # 21000633		

Our Expertise. Your Success.

Храните данную информацию при себе и передайте ее другим членам медицинского персонала, участвующим в вашем лечении.

Ваши имя и фамилия:

**Имя и фамилия врача
(выписавшего вам Олюмиант):**

Номер телефона врача:

Данная информация была проверена и утверждена
Министерством здравоохранения в апреле 2021 года

Информация для пациентов об Олюмианте® (Барицитинибе)

Настоящая брошюра содержит важную информацию, которую вы должны знать перед применением Олюмианта и во время его применения.

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения ревматоидного артрита от низкой до серьезной степени активности в тех случаях, когда предшествующее применение одного или более антиревматических препаратов из группы БМАРП (DMARD) не дало желаемого эффекта или плохо переносилось пациентом. Можно использовать Олюмиант в качестве единственного препарата или в сочетании с метотрексатом (methotrexate).

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения atopического дерматита от низкой до серьезной степени активности, который также известен как «атопическая экзема». Можно использовать Олюмиант в сочетании с препаратами для лечения экземы, которые вы наносите на кожу или использовать его в качестве единственного препарата.

Для получения полной информации о препарате следует ознакомиться с **Инструкцией по применению**, приложенной к упаковке препарата. Помимо этого, Инструкция по применению находится на интернет-сайте Министерства здравоохранения:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

Инфекции

Олюмиант способен усугубить существующие инфекции или повысить риск того, что у вас разовьются новые инфекции, или повысить риск репликации вирусов. Следует немедленно сообщить врачу, если у вас возникли симптомы инфекции, например:

- Жар, язвы, повышенная утомляемость по сравнению с обычным состоянием или стоматологические проблемы.
- Кашель, который не проходит, ночное потоотделение и уменьшение веса тела. Эти явления могут быть симптомами туберкулеза (инфекционного заболевания легких).
- Кожная сыпь, сопровождающаяся болями и появлением пузырьков. Эти явления могут быть симптомами опоясывающего лишая (Herpes zoster).

Жиры в крови

Использование Олюмианта может вызывать повышение уровня жиров в крови.

Ваш лечащий врач будет проверять уровень жиров (например, холестерина) у вас в крови во время лечения Олюмиантом.

Венозный тромбоз

До и во время применения Олюмианта вам следует сообщить врачу, если в прошлом у вас были тромбы в венах ног (тромбоз глубоких вен) или в легких (тромбоэмболия легочной артерии).

- Сообщите своему врачу, если у вас отекает и болит нога, имеется покраснение кожи на ноге или ощущение жара в ноге, есть боли в грудной клетке или одышка, так как эти явления могут быть симптомами тромбоза вен.

Беременность

- Не следует принимать Олюмиант, если вы беременны или полагаете, что можете быть беременны.
- Во время лечения Олюмиантом используйте эффективные средства контрацепции (и продолжайте их использование в течение недели после прекращения приема данного препарата).
- Немедленно сообщите врачу, если вы забеременели (или если хотите забеременеть).