

כרטיס מידע
בטיחותי למטופל

אמספאריטיTM

אדאלימומאב
(מעכב $\text{TNF}\alpha$)

מידע עבורך ועבור אנשי הצוות
הרפואי המעורבים בהשגחתך
הרפואית או בטיפול בך.



פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח

טל': 09-9700500 פקס: 09-9700501

לא כל תופעות הלוואי האפשריות רשומות בכרטיס זה. אנא קרא את העלון של אמספאריטי המצורף לאריזה או שוחח עם הרופא שלך, לקבלת מידע נוסף על תופעות הלוואי.

אם יש לך שאלות בנוגע לטיפול שלך, פנה אל הרופא שלך או אל האחות.

כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי נבחר וחשוב שעליך לדעת לפני ובמהלך הטיפול באמספאריטי

- שמור כרטיס זה איתך בכל זמן ולמשך 70 ימים לאחר זריקת האמספאריטי האחרונה שלך
- הצג כרטיס זה בפני כל רופא או איש מקצוע רפואי שאתה רואה
- תעד מידע אודות כל בדיקה או טיפול לשחפת שעברת על גב כרטיס זה.

הקדמה

- אמספאריטי הינה תרופה המיועדת לטיפול במחלות מסוימות המשפיעות על חלק מהמערכת החיסונית. בעוד שאמספאריטי יכולה להיות יעילה בטיפול במחלות אלו, בחלק מהאנשים עלולה להופיע תופעת לוואי אחת או יותר. חשוב שתשוחח עם הרופא שלך על היתרונות האפשריים ועל תופעות הלוואי האפשריות בנטילת אמספאריטי. אלו עשויות להיות שונות מאדם לאדם.
- מטרתו של כרטיס זה היא לספר לך על כמה מתופעות הלוואי האפשריות של אמספאריטי
 - חלק מתופעות הלוואי החמורות שעלולות להתרחש כוללות זיהומים, סרטן ובעיות במערכת העצבים
 - אלו אינן כל תופעות הלוואי האפשריות של אמספאריטי

לפני הטיפול באמספאריטי

ספר לרופא שלך על כל בעיה בריאותית שיש לך ועל כל תרופה שאתה נוטל. זה יסייע לך ולרופא שלך להחליט אם אמספאריטי מתאימה לך.

ספר לרופא שלך אם:

- יש לך זיהום או תסמינים של זיהום (כגון חום, פצעים, תחושת עייפות, בעיות דנטליות)
- יש לך שחפת, או היית במגע קרוב עם אדם החולה בשחפת
- יש לך או היה לך סרטן
- יש לך חוסר תחושה או עקצוץ כלשהם או בעיה המשפיעה על מערכת העצבים שלך, כמו טרשת נפוצה

הרופא שלך צריך לבדוק אם יש לך סימנים ותסמינים של שחפת לפני תחילת השימוש באמספאריטי. ייתכן ותזדקק לטיפול נגד שחפת לפני שתתחיל לקחת אמספאריטי.

חיסונים

- תוכל לקבל חיסונים, למעט חיסונים חיים.
- אם הינך מטופלת באמספאריטי במהלך הריון, חשוב שתיידעי את רופא הילדים שלך לפני שהתינוק מקבל כל חיסון. אין לחסן את התינוק שלך ביחסון חי כמו BCG (משמש למניעת שחפת) למשך 5 חודשים לאחר הזריקה האחרונה של אמספאריטי במהלך ההריון

במהלך הטיפול באמספאריטי

על מנת לוודא שאמספאריטי פועלת כראוי ובאופן בטיחותי עבורך, עליך לבקר בקביעות אצל הרופא שלך בכדי לדון במצבך. ספר מיד לרופא שלך על כל שינוי שחל במצבך.

הקפד ליידע את הרופא שלך כיצד אמספאריטי משפיעה עליך.

- חשוב שתתקשר לרופא שלך באופן מיידי לגבי תסמינים חריגים כלשהם שאתה עלול לחוות. זה יסייע להבטיח שתקבל את הטיפול המתאים. בנוסף, זה יפחית את הסיכוי להחמרה של תופעות לוואי
- תופעות לוואי רבות, כולל זיהומים, ניתנות לטיפול הולם אם תספר מיד לרופא שלך.
- אם תחוה תופעת לוואי, הרופא שלך יחליט אם עליך להמשיך או להפסיק את הטיפול באמספאריטי. חשוב שתשוחח עם הרופא שלך כדי לברר מה נכון עבורך
- היות ותופעות לוואי עלולות להופיע לאחר נטילת המנה האחרונה של אמספאריטי, ספר לרופא שלך על כל בעיה שעשויה להיות לך עד 70 ימים לאחר הזריקה האחרונה של אמספאריטי

ספר לרופא שלך על:

- כל מצב רפואי חדש שיש לך
- תרופות חדשות שאתה נוטל
- כל ניתוח או פרוצדורה רפואית שאתה מתכנן לעבור

בעיות במערכת העצבים

- חוסר תחושה או עקצוץ, שינויים בראייה, חולשת שרירים, סחרחורת בלתי מוסברת

ספר לרופא שלך אודות כל התסמינים יוצאי הדופן שיש לך במהלך הטיפול באמספאריטי. אלו אינם כל התסמינים האפשריים של תופעות לוואי אלו.

מידע עבורך ועבור אנשי המקצוע הרפואי המעורבים בהשגחתך הרפואית או בטיפול בך

בדיקות וטיפול בשחפת (TB)

סמן תיבה זו אם עברת אי פעם בדיקת TB:
□ כן (בדוק עם הרופא שלך אם אינך יודע)

סמן תיבה זו אם אי פעם עברת בדיקה שהייתה חיובית ל-TB:
□ כן (בדוק עם הרופא שלך אם אינך יודע)

סמן תיבה זו אם נטלת אי פעם תרופות כלשהן לטיפול או למניעה של TB:
□ כן (בדוק עם הרופא שלך אם אינך יודע)

למידע נוסף אנא קרא את העלון לצרכן המצורף לאריזה של אמספאריטי.

אם יש לך שאלות נוספות כלשהן, שוחח עם הרופא שלך או איש מקצוע רפואי אחר.

חלק מהאנשים הנוטלים אמספאריטי עלולים לחוות תופעות לוואי חמורות, הכוללות:

זיהומים

אמספאריטי מסייעת לאנשים עם מחלות דלקתיות מסוימות. היא עושה זאת באמצעות חסימה של חלק ממערכת החיסון. עם זאת, חלק זה של מערכת החיסון עוזר גם להילחם בזיהומים. משמעות הדבר היא כי אמספאריטי עלולה להעלות את הסיכונים ללקות בזיהומים או להחמיר זיהום כלשהו שיש לך. זה כולל זיהומים כגון הצטננות או זיהומים חמורים יותר כמו שחפת

סרטן

אם אתה נוטל אמספאריטי, הסיכון ללקות בסוגים מסוימים של סרטן עלול לעלות

בעיות במערכת העצבים

חלק מהאנשים פיתחו בעיות חדשות או החמרה של בעיות במערכת העצבים עם אמספאריטי. זה כולל טרשת נפוצה

למידע נוסף אנא קרא את העלון לצרכן המצורף לאריזה של אמספאריטי. אלו אינן כל תופעות הלוואי האפשריות שעשויות להופיע במהלך טיפול באמספאריטי.

התקשר לרופא שלך או פנה לקבלת טיפול רפואי מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים של תופעות הלוואי החמורות האפשריות האלו:

זיהומים

- חום, צמרמורות, הזעה בלתי רגילה, הרגשה לא טובה או עייפות רבה מהרגיל, תחושת חולי או חולי (כגון בחילה או הקאה), שלשול, כאב בטן, אובדן תיאבון או ירידה במשקל, שיעול או שיעול דמי או עם ליחה, קוצר נשימה, בעיות במתן שתן, פצעים בעור, פצעים, כאבי שרירים, בעיות דנטליות

סרטן

- הזעות לילה; נפיחות של בלוטות הלימפה (בלוטות נפוחות) בצוואר, בבתי השחי, במפשעה או באזורים אחרים; ירידה במשקל; נגעים חדשים בעור או שינוי בנגעי עור קיימים (כגון שומות או נמשים); גרד חמור שלא ניתן להסבירו

بطاقة معلومات حول سلامة متلقي العلاج

أمسباريتيTM أداليموماب (مُثَبِّط $TNF\alpha$)

معلومات لك وللطاقم الطبي
المُشرف عليك وعلى علاجك.



פיזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח
טל': 09-9700500 פקס: 09-9700501

שם:

שם הרופא המטפל (אשר רשם את התרופה אמספאריטי):

מספר הטלפון של הרופא:

התוויה:

תאריך קבלת זריקת אמספאריטי הראשונה:

המינון של זריקת אמספאריטי שהוזרקה:

תאריך זריקת האמספאריטי האחרונה שלך (אם כבר אינך מקבל אמספאריטי):

אנא מלא את המידע עבורך ועבור אנשי המקצוע הרפואי המעורבים בהשגחתך הרפואית או בטיפולך. חשוב שאתה והרופא שלך תתעדו את שם התכשיר ואת מספר האצווה של התרופה שלך.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, כרטיס מידע זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, כרטיס המידע מיועד לבני שני המינים.

דיווח על תופעות לוואי: ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: <https://sideeffects.health.gov.il> או ע"י כניסה לקישור: [www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il) ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לפייזר במייל: isr.aereporting@pfizer.com

כרטיס זה ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות במרץ 2021 | גרסא 1.0

لا تشمل هذه البطاقة جميع الأعراض الجانبية المُحتملة. اقرأ رجاى نشرة دواء أمسباريتي المرفقة بالعبوة أو تحدث مع طبيبك للحصول على معلومات إضافية حول الأعراض الجانبية.

راجع طبيبك أو الممرضة إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص علاجك.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مُختارة ومهمة يتعين عليك معرفتها قبل وأثناء تلقيك العلاج بدواء أمسباريتي

- احمل معك هذه البطاقة طيلة الوقت ولمدة ٠٧ يوماً بعد تلقيك آخر حقنة من دواء أمسباريتي
- أبرز هذه البطاقة لكل طبيب أو أخصائي طبي تزوره
- قم بتوثيق معلومات على هذه البطاقة عن كل علاج تلقيته أو فحص أجرته لمرض السل.

مقدمة

- أمسباريتي هو دواء مخصص لمعالجة أمراض معينة لها تأثير على جزء من الجهاز المناعي. ومع أن دواء أمسباريتي يعالج تلك الأمراض بكفاءة فقد يظهر لدى بعض واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية. من المهم أن نتناقش مع طبيبك منافع الدواء المحتملة والأعراض الجانبية المُحتملة الناجمة عن تلقي دواء أمسباريتي، حيث تختلف تلك الأعراض والمنافع من شخص لآخر.
- الغاية من هذه البطاقة هي توضيح عدد من الأعراض الجانبية المُحتملة لدواء أمسباريتي
- بعض الأعراض الجانبية الشديدة التي قد تظهر تشمل العدوى، السرطان ومشاكل في الجهاز العصبي وهذه ليست جميع الأعراض الجانبية المُحتملة لدواء أمسباريتي.

قبل العلاج بدواء أمسباريتي

أخبر طبيبك عن أي مشكلة صحية تعاني منها وعن أي دواء تتناوله. حيث يساعدك ذلك ويساعد طبيبك على تحديد فيما إذا كان دواء أمسباريتي يناسبك.

أخبر الطبيب عما يلي:

- إذا كنت مصاباً بعدوى أو علامات عدوى (مثل الحرارة، البثور، شعور بالتعب، مشاكل في الأسنان).
- إذا كنت مصاباً بمرض السل أو إذا كان لك احتكاك عن قرب مع شخص مصاب بالسل
- إذا كنت مصاباً الآن أو إذا كنت مصاباً سابقاً بمرض السرطان
- إذا كان لديك انعدام في الحس أو شعور باللسع أو مشكلة تؤثر على الجهاز العصبي قبل البدء بتلقي دواء أمسباريتي
- يتعين على طبيبك أن يفحص فيما إذا كانت لديك علامات وأعراض مرض السل قبل بداية العلاج بدواء أمسباريتي. ربما تحتاج لتلقي علاج لمرض السل قبل أن تبدأ بتناول دواء أمسباريتي.

التطعيمات

- يمكنك تلقي تطعيمات، باستثناء التطعيمات الحية.
- إذا كنت تتلقين العلاج بدواء أمسباريتي بينما أنت حامل، فمن المهم أن تخبري طبيب الأطفال قبل أن يتلقى طفلك أي تطعيم. لا يجوز إعطاء طفلك تطعيم حي مثل BCG (يُستخدم لمنع السل!) لمدة ٥ أشهر بعد تلقيك آخر حقنة من دواء أمسباريتي أثناء الحمل

أثناء العلاج بدواء أمسباريتي

للتحقق من مفعول الدواء عليك بطريقة آمنة، يتعين عليك زيارة طبيبك بشكل منتظم لمناقشة حالتك. أخبر الطبيب فوراً عن أي تأثير طرأ على حالتك.

أحرص على إخبار طبيبك عن كيفية تأثير دواء أمسباريتي عليك.

- من المهم أم تتصل فوراً بطبيبك بخصوص أي أعراض غير عادية قد تشعر بها. وهذا يضمن لك أن تتلقى العناية المناسبة. كما ويقلل هذا من احتمال تفاقم الأعراض الجانبية
- كثير من الأعراض الجانبية، وبضمنها العدوى قابلة للمعالجة بطريقة لائقة إذا تحدثت عنها فوراً لطبيبك.

اتصل بطبيبك أو توجه فوراً لتلقي العناية الطبية إذا ظهرت لديك واحدة من العلامات التالية للأعراض الجانبية الشديدة:

عداوى

- حُمى، قشعريرة، تعرق غير عادي، شعور بتوعلك أو تعب أكثر من العادة، شعور بمرض أو مرض (مثل الغثيان أو التقيؤ)، إسهال، وجع بطن، ضعف الشهية أو هبوط الوزن، سعال أو سُعال مصحوب بدم أو نخاعة، ضيق النفس، مشاكل في التبول، بثور في الجلد، إصابات، آلام عضلات، مشاكل في الأسنان

سرطان

- تعرُّق في الليل؛ انتفاخ الغدد اللمفاوية (غدد منتقخة) في الرقبة وفي منطقة الإبط وفي قاع الفخذ أو في مناطق أخرى؛ هبوط الوزن؛ قروح جديدة في الجلد أو تغيير القروح الجلدية الموجودة من قبل (مثل الشامات والنمش)؛ حُكَاك شديد سببه غير معروف

مشاكل في الجهاز العصبي

- انعدام الحس أو شعر بالوخز، تغييرات في الرؤية، ضعف العضلات، دوار دون سبب واضح
- أخبر طبيبك عن كل العلامات الشاذة التي قد تظهر لديك أثناء تلقي دواء أمسباريتي. هذه ليست جميع العلامات المحتملة لتلك الأعراض الجانبية.

معلومات لك وللأخصاء الطبيين المشاركين في مراقبتك الطبية أو في علاجك

فحوصات وعلاج السلّ (TB)

ضع علامة في هذه الخانة إذا خضعت سابقاً لفحص TB:

نعم (استفسر مع طبيبك إذا كنت لا تعلم)

ضع علامة في هذه الخانة إذا خضعت سابقاً لفحص TB وكانت نتيجته إيجابية:

نعم (استفسر مع طبيبك إذا كنت لا تعلم)

- إذا شعرت بعرض جانبي فسيقدر طبيبك فيما إذا كنت ستواصل أو تتوقف عن استخدام دواء أمسباريتي. من المهم أن تتحدث مع طبيبك للاستفسار منه عن التصرف الصحيح بالنسبة لك
- بما أن الأعراض الجانبية قد تظهر بعد تلقي آخر جرعة من دواء أمسباريتي، فعليك أن تتحدث طبيبك عن أي مشكلة قد تحصل لديك حتى مرور ٠٧ يوماً من بعد تلقيك آخر حقنة من دواء أمسباريتي

تحدث مع طبيبك عن:

- أي حالة طبية جديدة تحدث لديك
- أدوية جديدة تتناولها
- أي عملية أو إجراء طبي ستخضع له
- قد يشعر بعض الأشخاص الذين يتناولون دواء أمسباريتي بأعراض جانبية شديدة ومنها:

العدوى

- يساعد دواء أمسباريتي الأشخاص الذين يعانون من أمراض التهابية مختلفة. ويقوم الدواء بمفعوله هذا من خلال إعاقة قسم من الجهاز المناعي. لكن هذا القسم من الجهاز المناعي يساعد أيضاً على محاربة العدوى. ما يعني أن دواء أمسباريتي قد يزيد من احتمال الإصابة بعدوى أو تفاقم عدوى موجودة لذلك. ويشمل ذلك عداوى مثل البرد أو عداوى أخطر مثل السلّ

السرطان

- إذا كنت تتلقى دواء أمسباريتي فقد يزيد ذلك من خطورة الإصابة بأنواع معينة من السرطان

مشاكل في الجهاز العصبي

- نتجت لدى بعض الأشخاص مشاكل جديدة أو تفاقت مشاكل سابقة لديهم في الجهاز العصبي مع تلقيهم دواء أمسباريتي ومن جملتها التصلب المتعدد
- للمزيد من المعلومات الرجاء قراءة نشرة المستهلك المرفقة بعلبة دواء أمسباريتي. لا تشمل هذه المعلومات جميع الأعراض الجانبية المحتملة التي قد تظهر أثناء تلقي دواء أمسباريتي.

ضع علامة في هذه الخانة إذا تناولت سابقاً أي أدوية لعلاج أو لمنع TB:

نعم (استفسر مع طبيبك إذا كنت لا تعلم)

لمزيد من المعلومات الرجاء قراءة نشرة المستهلك الموجودة في علبة دواء.
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى فتحدث مع طبيبك أو مع أي أخصائي طبي آخر.

اسمك:

اسم الطبيب الذي يعالجك (الذي كتب لك وصفة دواء أمسباريتي):

رقم هاتف الطبيب:

دواعي الاستخدام:

تاريخ تلقي أو حقنة من دواء أمسباريتي:

جرعة حقنة دواء أمسباريتي التي تلقيتها:

تاريخ تلقي آخر حقنة من دواء أمسباريتي (إذا كنت قد توقفت عن تلقي دواء أمسباريتي):

الرجاء تعبئة المعلومات لك وللأخصائيين الطبيين المشاركين في مراقبة حالتك أو معالجتك.

من المهم أن تقوم أنت وطبيبك بتوثيق اسم مستحضر دوائك ورقم دفعته الإنتاجية.

تمت صياغة بطاقة المعلومات هذه بلغة المذكر لغرض التسهيل فقط، غير أن هذه البطاقة مخصصة للجنسين.

التبليغ عن أعراض جانبية: يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال بوابة التبليغ عن الأعراض الجانبية على الصفحة الرئيسية لموقع إنترنت وزارة الصحة: www.health.gov.il

أو من خلال الدخول إلى الرابط التالي:
<https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية كذلك لشركة فايزر على البريد الإلكتروني: isr.aereporting@pfizer.com

صادقت وزارة الصحة على هذه البطاقة وعلى محتواها في شهر مارس من العام 2021 | نسخة 1.0

Please read the Amsparity package leaflet for more information.

If you have any other questions, talk to your doctor or another healthcare professional.

Your name:

Doctor's name (who prescribed Amsparity):

Doctor's phone number:

Indication:

Date of your first Amsparity injection:

Dose of your Amsparity injection:

Date of your last Amsparity injection (if no longer taking Amsparity):

Please fill out information for you and healthcare professionals involved in your medical care or treatment.

It is important that you and your doctor record the brand name and batch number of your medication.

Reporting of suspected adverse reactions

Adverse events can be reported directly to the Ministry of Health using the adverse events reporting portal which is available on the home page of the Ministry of Health website:

www.health.gov.il

or by this link: <https://sideeffects.health.gov.il/>

Side effects can also be reported to Pfizer by email:

isr.aereporting@pfizer.com

This card and its content have been approved by the Ministry of Health on March 2021 | Version 1.0

- Since side effects can happen after your last dose of Amsparity, tell your doctor about any problems that you may have up to 70 days after your last injection of Amsparity

Tell your doctor about:

- Any new medical conditions that you have
- New medicines you are taking
- Any surgery or operation that you have planned

Some people taking Amsparity may get serious side effects, including:

Infections

- Amsparity helps people with certain inflammatory diseases. It does this by blocking a part of the immune system. However, this part of the immune system also helps fight infection. This means Amsparity can make you more likely to get infections or make any infection that you may have worse. This includes infections such as colds or more serious infections like tuberculosis

Cancer

- If you take Amsparity, the risk of getting certain types of cancer may increase

Nervous system problems

- Some people have developed new or worsening nervous system problems with Amsparity. This includes multiple sclerosis

Please read the Amsparity package leaflet for more information.

These are not all of the possible side effects that may occur during treatment with Amsparity.

Call your doctor or get medical care right away if you have any of the following symptoms of these possible serious side effects:

Infections

- Fever, chills, unusual sweating, feeling unwell or more tired than normal, feeling or being sick (such as nausea or vomiting), diarrhoea, stomach pain, loss of appetite or weight loss, cough or coughing up blood or mucus, shortness of breath, problems urinating, skin sores, wounds, muscle aches, dental problems

Cancer

- Night sweats, swelling of the lymph nodes (swollen glands) in the neck, armpits, groin or other areas, weight loss, new skin lesions or change in skin lesions (such as moles or freckles) you already have, severe itchiness that cannot be explained

Nervous system problems

- Numbness or tingling, vision changes, muscle weakness, unexplained dizziness

Tell your doctor about any unusual symptoms that you may have during treatment with Amsparity. These are not all of the possible symptoms of these side effects.

Information for you and healthcare professionals involved in your medical care or treatment

Tuberculosis (TB) Tests and Treatment

Mark this box if you have ever been tested for TB:

- YES (Check with your doctor if you do not know)

Mark this box if you have ever had any test that was positive for TB:

- YES (Check with your doctor if you do not know)

Mark this box if you have ever taken any pills to treat or prevent TB:

- YES (Check with your doctor if you do not know)

Not all possible side effects are listed on this card. Please read the Amsparity package leaflet or talk with your doctor for more information about side effects.

If you have any questions, speak to your doctor or nurse about your treatment.

This card contains select important safety information that you need to know before and during treatment with Amsparity

- Keep this card with you at all times and for 70 days after your last injection of Amsparity
- Show this card to any doctor or healthcare professional that you see
- Record information about any tuberculosis tests or treatment you have had on the back of this card.

Introduction

Amsparity is a medicine that is intended to treat certain diseases that affect a part of the immune system. While Amsparity can be effective in treating these diseases, some people can have one or more side effects. It is important to talk to your doctor about the possible benefits and possible side effects of taking Amsparity. These can be different for each person.

- The purpose of this card is to tell you about some of the possible side effects of Amsparity
- Some of the serious side effects that could occur include infections, cancer, and nervous system problems
- These are not all of the possible side effects of Amsparity

Before Amsparity Treatment

Tell your doctor about any health problems you have and any medicines you take. This will help you and your doctor decide if Amsparity is right for you.

Tell your doctor if you:

- Have an infection or have symptoms of an infection (such as fever, wounds, feeling tired, dental problems)

- Have tuberculosis or have been in close contact with someone with tuberculosis
- Have or have had cancer
- Have any numbness or tingling or have a problem that affects your nervous system, such as multiple sclerosis

Your doctor should check you for signs and symptoms of tuberculosis before starting Amsparity. You may need to be treated for tuberculosis before you start Amsparity.

Vaccinations

- You may receive vaccinations except for live vaccines.
- If you receive Amsparity while you are pregnant, it is important that you inform your baby's doctor before your baby receives any vaccine. Your baby should not receive a 'live vaccine', such as BCG (used to prevent tuberculosis) within 5 months following your last Amsparity injection during pregnancy

During Amsparity Treatment

To make sure that Amsparity is working properly and safely for you, you should check in with your doctor regularly to discuss how you are doing. Tell your doctor right away about any changes in your condition.

Keep your doctor informed about how Amsparity is working for you.

- It is important to call your doctor right away about any unusual symptoms you may have. This will help make sure you get the right care. It will also lower the chance of a side effect becoming worse
- Many side effects, including infections, can be managed if you tell your doctor right away
- If you get a side effect, your doctor will decide if you should continue or stop your Amsparity treatment. It is important to talk with your doctor to find out what is right for you

**Patient safety
information card**

AMSPARITY[®]

**adalimumab
(TNF α inhibitor)**

**Information for you and healthcare
professionals involved in your
medical care or treatment.**



Pfizer Pharmaceuticals Israel Ltd., 9 Shenkar St., Herzliya Pituach, Israel.

Tel: 09-9700500, Fax: 09-9700501