

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В
СООТВЕТСТВИИ
С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ
СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986**

Препарат продается без рецепта врача

**КЛИРОЦИН ЛИМОН,
Таблетки для рассасывания
КЛИРОЦИН ВИШНЯ,
Таблетки для рассасывания**

Действующие вещества и их количества:
Каждая таблетка для рассасывания содержит:
1.00 мг Лидокaina (Lidocaine 1.00 mg)
4.00 мг Тиротрицина (Tyrothricin 4.00 mg)
2.00 мг Цетримония бромида (Cetrimonium Bromide 2.00 mg)

Список неактивных компонентов см. пункт 6.

Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Данный препарат выдается без рецепта врача. При продаже вне аптеки (GSL) - данный препарат предназначен для взрослых и детей старше 12 лет. Вам следует использовать препарат надлежащим образом. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков (симптомов) заболевания или отсутствии улучшения через 5-7 дней обратитесь к врачу.

1. Для чего предназначен препарат?
Клироцин является таблеткой для рассасывания, предназначеннной для облегчения сильных болей в горле и инфекций в ротовой полости.

Терапевтическая группа:
Клироцин содержит Лидокайн (местный анестетик), Тиротрицин (антибиотик) и Цетримония бромид (антисептик).

2. Перед применением препарата:

Не следует пользоваться препаратом, если:

- Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к действующему веществу (Лидокайн, Тиротрицин и Цетримонию бромида) или к одному из других компонентов препарата.

Особенные предостережения, касающиеся использования препарата

До начала приема Клироцина сообщите врачу, если:

- Вы страдаете в течение нескольких дней от болей в горле, сопровождаемых теплой температурой
- У Вас есть порез или рана во рту или в горле
- Нет облегчения симптомов или они продолжаются более 5-7 дней
- Боль в горле сопровождается высокой температурой, головокружением, рвотой или затруднением глотания

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Нельзя чистить зубы непосредственно до или после приема препарата, поскольку это может понизить его эффективность.

Использование препарата и прием пищи:

Нельзя использовать Клироцин непосредственно до или во время приема пищи или питья, поскольку местная анестезия может помешать глотанию или вызвать прикус языка. Избегайте приема пищи, пока существует ощущение анестезии.

Беременность и лактация:

Если Вы беременны, кормите грудью или планируйте забеременеть, необходимо проконсультироваться с врачом до начала приема препаратов.

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений Вам следует обратиться к врачу или фармацевту.

Допустимая дозировка, как правило:

Дети старше 12 лет и взрослые:

Легкая – средняя боль в горле: одна таблетка для рассасывания каждые 2-3 часа.
Сильная боль в горле: одна таблетка для рассасывания каждые 1-2 часа.
Дозировка не должна превышать 12 таблеток для рассасывания в день.

При продаже вне аптеки лекарство предназначено для взрослых и детей старше 12 лет.

Лекарство предназначено для использования в течение 5-7 дней.

Лекарство разрешено для использования больными сахарным диабетом.

Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.

Нельзя жевать или глотать таблетки для рассасывания.

Если Вы по ошибке допустили передозировку:

Если Вы допустили передозировку, или ребенок по ошибке проглотил это лекарство, немедленно обратитесь к врачу, взяв с собой упаковку лекарства.

Не принимайте препарат в темноте! При каждом приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся приема препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты:

Как и при приеме любого лекарственного препарата, прием Клироцина может привести к побочным эффектам у части потребителей. Не следует опасаться списка побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни от одного из них.

Необходимо прекратить прием препарата и срочно обратиться к врачу, если Вы чувствуете один из побочных эффектов, свидетельствующих об аллергической реакции:

- Сложность дышать или глотать
- Отек лица, губ, языка или горла
- Сильный кожный зуд, сопровождаемый

красной сыпью или неровностью кожного покрова

Дополнительные побочные эффекты:

Проявляются редко (с частотой в 1:1000):
Ощущение покалывания во рту или в горле (дискомфорт во рту)

Проявляются крайне редко (с частотой в 1:10000):
Тошнота

Если один из побочных эффектов обострился, или Вы страдаете от побочных эффектов, не указанных в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

5. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту, не получив на это четких указаний врача!
- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Хранить при температуре ниже 25°C и предохранять от света и влаги.

6. Дополнительная информация

В дополнении к действующему веществу препарат включает:

Клироцин таблетки для рассасывания со вкусом лимона:

Sorbitol, Citric Acid anhydrous, Talc, Lemon Flavoring powdered, Guar Gum, Quinoline Yellow Lake, Magnesium Stearate, Silicic Acid Colloidal, Saccharin Sodium, Green ZLT 601 Lake, Peppermint Flavoring powdered.

Клироцин таблетки для рассасывания со вкусом вишни:

Sorbitol, Guar Gum, Citric Acid anhydrous, Talc, Polyvinylpyrrolidone, Saccharin Sodium, Magnesium Stearate, Cherry Flavoring, Iron Oxide Pigment Red.

Как выглядит лекарство и что включает упаковка:

Клироцин Лимон является таблетками для рассасывания прямоугольной формы, покрытыми точечками, с покатыми краями, темно-желтого вплоть до лимонного цвета.

Клироцин Вишня является таблетками для рассасывания прямоугольной формы, покрытыми точечками, с покатыми краями, розово-красного цвета.

Владелец лицензии и его адрес:
«Деврис и Ко. ЛТД», ул. Хабарзель 32, Тель-Авив

Изготовитель и его адрес:
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения:
Клироцин Лимон: 1382731730
Клироцин Вишня: 1382931729
Обновлено в мае 2021 года.