

يسمى الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أسبريل 12.5, 25, 50 ملغ، أقراص

- يحتوي كل قرص على كابتوبريل (Captopril) بجرعة 12.5 أو 25 أو 50 ملغ على التوالي.
- المواد غير الفعالة والمستحارحة (المسببة للحساسية) - إنسولين 6 "معلومات إضافية" - بنيد 25 وبنيد 25 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".
- (المسببة للحساسية) - إنسولين 6 "معلومات إضافية" - بنيد 25 وبنيد 25 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".
- اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تتعامل مع الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الأدوية.
- إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
- وصف هذا الدواء من أجله. لا تعطه للأطفال. فهو قد يضر بهم حتى لو كان يبدو لك أن حالتهم الطبية مماثلة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج فرط ضغط الدم، فشل القلب، ارتفاع الكلى السكري (إصابة في الكلى بسبب السكري)، لعلاج هذه نوبة قلبية.

الفصلية العلاجية: مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE Inhibitors) تعمل مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين على توسيع الأوعية الدموية لديك، مما يسهل على قلبك ضخ الدم من خلالها.

2. قبل استعمال الدواء لا يجوز استعماله إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) لللدادة الفعالة (كابتوبريل) ، لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبنيد 6) أو لأدوية أخرى من ضغط الدم. ACE inhibitors عائلة.
- عانيت في أي وقت من رد فعل ذي يشمل انتفاخ اللبدين، الشفتين، الوجه أو للسان لسبب غير معروف.
- كنت تعاني من السكري أو من خلل في وظيفة الكلى وتعالج بنوع لخفض ضغط الدم الذي يحتوي على ليكسين.
- كنت حاملاً بعد الشهر الثالث (من الأفضل تجنب تناول أسبريل في بداية الحمل - انظري في بند "الحمل والإرضاع").
- لا يجوز تناول أسبريل إذا كان واحد أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه صحيحاً بالبنسبة لك. إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب قبل تناول أسبريل.
- تحدثت خاصة متعلقة باستعمال الدواء قبل العلاج بأسبريل، أخبر الطبيب:
- إذا كنت تعاني من مرض كلوي.
- إذا كنت تأخذ (أو تأخذت مؤخراً) أي دواء أو دواء آخر.
- إذا كنت تتخضع لعلاج ديل (غسيل الكلى).
- إذا كنت تعاني من مرض قلب، خاصة مشاكل في صمامات القلب.

أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

قد يحتاج الطبيب إلى تغيير الجرعة التي تأخذها وأو أخذ وسائل حذر إضافية: إذا كنت تأخذ حاصراً مستقبل الأجيوتنسين (ARB) أو الليكسين (انظر أيضاً المعلومات في بند 2) "أو يجوز استعماله إذا" وما في بند "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء".

إذا عانيت مؤخراً من كثرة الإسهال أو القيءات، إذا كنت تعاني من مرض كولاجيني مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو نسيج خضابية مخجوبة (Lupus) أو تصلب الجلد) الضام (تصلب الجلد).

إذا كنت تعاني من التهابات أكثر مثل ألم الحلق والسوخية، والتي يمكن أن تكون بسبب التغييرات في خلايا الدم الخاصة بك والتي يمكن رصدها من قبل الطبيب من خلال فحص دم.

إذا كنت تصعد الخضوع لعملية جراحية بالإنسان أو عملية جراحية كبرى تنطوي على التخدير.

إذا كنت تصدق تلقي علاج ضد الحساسية على سبيل المثال للتلقيح من رد الفعل التحسسي للسلعيات والأزواج والنمل.

إذا كنت تصدق الخضوع لعلاج لإزالة فاض الكوليسترول من الدم بواسطة آلة (تسمى فضاء LDL).

عليك إخبار الطبيب إذا كنت تعتقد أنك حامل أو قد تحمليين. أسبريل غير موصى به في بداية الحمل. لا تتناول أسبريل بعد الشهر الثالث من الحمل لأن استعمال أسبريل في هذه المرحلة قد يسبب ضرراً وخيفاً لطفلك (انظري للبنيد "الحمل والإرضاع").

قد تكون هناك حاجة لدمي قسم من المتعالمين من أصل أفريقي-كاريبي إلى جرعة أعلى من أسبريل للوصول لانخفاض كفاف في ضغط الدم.

إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية لعلاج فرط ضغط الدم:

- حاصرات مستقبل الأجيوتنسين II (ARBs) (مثل: اللسارتان، تيمسارتان، إربيسارتان) خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى المرتبطة بمرض السكري.
- ليسكربرين.

من المحتمل أن يوجهك طبيبك إلى فحوصات دورية لوظيفة الكلى، ضغط الدم ومستويات الكهارل (مثل البوتاسيوم) في الدم. انظر أيضاً للمعلومات في بند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

التفاعلات بين الأدوية إذا كنت تأخذ (أو أخذت مؤخراً) أي دواء أو دواء آخر يمكن أن تأخذ أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، أحيوي الطبیب إذا كنت ترخصين أو تحططين

لبدء الإرضاع، لا ينصح بارضاع حديثي الولادة (خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة) وخاصة الخدج في فترة تناول أسبريل. في حال كان الطفل أكبر سنًا، سيوم الطبيب تحظى الجرعة المناسبة واستمر كالمعتاد. لا يقدم المشورة لك بشأن فوائد ومخاطر تناول أسبريل أثناء الإرضاع وذلك مقارنة بعلاجات أخرى.

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء كان.

إذا كنت تصدق الخضوع لعملية جراحية قبل العملية الجراحية والتخدير (حتى عند طبيب الأسنان)، يجب أن تخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول أسبريل لأنه قد يكون هناك انخفاض مفاجئ في ضغط دمك.

القيادة واستعمال الآلات

أسبريل يمكنه أن يؤثر على قدرتك على القيادة بشكل عام في بداية العلاج أو إذا قام طبيبك بتغيير الجرعة التي تتناولها. إذا كنت تعاني من الدوخة أثناء تناول أسبريل، لا تقد أو تستعمل الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

أسبريل يحتوي على إيتانور. إذا قبل لك سابقاً من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب أن تستعمل الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب. يجب عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وكيفية العلاج بالدواء.

سيتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الصيدلي فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء ليس مخصصاً بشكل عام للأطفال والرضع.

يمكن تناول أسبريل مع أو بدون طعام.

استعمال الدواء والاحتياطات المحول

كميات متدنية من الحمول لن تؤثر على أسبريل، لكن ينبغي استشارة الصيدلي قبل استعمال المشروبات الكحولية.

الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت تعتقد أنك حامل أو قد تحمليين. بشكل عام، سوف يفحص طبيبك بالتوقف عن تناول أسبريل قبل دخولك للحمل أو فوراً بعد حملك بأنك حامل وسوف ينصحك بتناول دواء آخر بدلاً من أسبريل. أسبريل غير موصى به في بداية الحمل ويحظر استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل لأنه قد يسبب ضرراً وخيفاً لطفلك إذا تم أخذه بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت ترخصين أو تحططين

إذا نسيبت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، خذها فوراً عند تذكرك ثم استمر كالمعتاد. إذا كان الوقت قد حان تقريباً للجرعة القادمة، تحظى الجرعة المنسية واستمر كالمعتاد. لا تطخو تناول جرعة مضاعفة لتعويض عن جرعة منسية.

يجب الدوامية على العلاج كما أوصى به من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق في المصنع والجراحة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال أسبريل أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تقزع عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب عند ظهور:

3. **كيف تستعمل الدواء؟**

يجب أن تستعمل الدواء دائماً وفقاً لتعليمات الطبيب. يجب عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وكيفية العلاج بالدواء.

سيتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الصيدلي فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء ليس مخصصاً بشكل عام للأطفال والرضع.

يمكن تناول أسبريل مع أو بدون طعام.

استعمال الدواء والاحتياطات المحول

كميات متدنية من الحمول لن تؤثر على أسبريل، لكن ينبغي استشارة الصيدلي قبل استعمال المشروبات الكحولية.

الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت تعتقد أنك حامل أو قد تحمليين. بشكل عام، سوف يفحص طبيبك بالتوقف عن تناول أسبريل قبل دخولك للحمل أو فوراً بعد حملك بأنك حامل وسوف ينصحك بتناول دواء آخر بدلاً من أسبريل. أسبريل غير موصى به في بداية الحمل ويحظر استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل لأنه قد يسبب ضرراً وخيفاً لطفلك إذا تم أخذه بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت ترخصين أو تحططين

الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) الذي يوجه إلى الإستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف تخزن الدواء؟

- تحبب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي وأجر في الأماكن للأطفال /أو الرضع وتلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون إبلاغك صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يظهر على العبوة). تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من شهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.
- لا يجوزلقاء الأدوية في صرف المياه أو في سلة القمامات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف يتخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. بعد، سوف تساهم هذه الوسائل بالحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, starch pregelatinized, stearic acid

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص بلون أبيض، مستدير، محذب من كلا الجانبين، مع خط إشارة.

أحجام العبوات المصداق عليها: 10, 20, 28, 56, 84, 90, 100 أو 500 قرص.

من المحتمل أن يتم تسويق العبوات بجمع أحجامها.

زمت التتقيق في شباط 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في وزارة الصحة:

أسبريل 12.5: 100-29063-09

أسبريل 25: 106-50-29062-00

أسبريل 50: 106-51-29063-00

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "DUI" www.dui.gov.au

للا توفسول لالو: نكوب سيول تروفن

الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) الذي يوجه إلى الإستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف تخزن الدواء؟

- تحبب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي وأجر في الأماكن للأطفال /أو الرضع وتلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون إبلاغك صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يظهر على العبوة). تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من شهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.
- لا يجوزلقاء الأدوية في صرف المياه أو في سلة القمامات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف يتخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. بعد، سوف تساهم هذه الوسائل بالحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, starch pregelatinized, stearic acid

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص بلون أبيض، مستدير، محذب من كلا الجانبين، مع خط إشارة.

أحجام العبوات المصداق عليها: 10, 20, 28, 56, 84, 90, 100 أو 500 قرص.

من المحتمل أن يتم تسويق العبوات بجمع أحجامها.

زمت التتقيق في شباط 2021 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومية في وزارة الصحة:

أسبريل 12.5: 106-50-29063-09

أسبريل 25: 106-50-29062-00

أسبريل 50: 106-51-29063-00

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "DUI" www.dui.gov.au

للا توفسول لالو: نكوب سيول تروفن

دكسل م.ض.

شارع دكسل 1، أور عيكفا 3060000، إسرائيل