

ليتورقا 40, 20, 10 ملء، أقراص

كل قرص يحتوى على أتورفاستatin كلح الكالسيوم (as calcium) بجرعة 40، 20، أو 10 ملء على التوالي. مسحوق انتظامي يحتوى على الكالسيوم (Atorvastatin) (40، 20، أو 10 ملء على التوالي). ومسحبات الحساسية في الدواء - انظر للبند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مرکبات الدواء".

أقرأ النشرة بالمعانى حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تتحوى هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلى. لا تطعه إلى أحدك. لا تطعه إلى آخرن. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك أن جاثهم الطيبة مشابهة.

1. لأى غرض مخصص الدواء؟

- لخض نسبة الدهنيات في الدم (كوليستيرون وتريجيلايريدات) ورفع بذلك. حرصوا إذا كنت تأخذ: ادوية بدون وصفة طبيب وأضافات تغذية، أخير الطبيب أو الصيدلى أو ربيبة القلب والأوعية الدموية (مثل: احتشاء عضلة القلب أو سكتة دماغية) لدى متعالجين لديهم احتضار (احتضار خطير) مرتفع حدث أولى.
- لدى مرضى لديهم مرض قلب تاجي، سكتة دماغية المكوث في المستشفى ظهرور احتشاء عضلة القلب، سكتة دماغية المكوث في المستشفى نتيجة قصور قلبى، نوبة صدرية و/أو الحاجة للفسطرة، الفصيلة العلاجية: ستاتينات - مثبطات الإنزيم HMG-CoA ريدوكاتاز.

2. قبل استعمال الدواء إذا:

- كنت حسانتاً (أرجي) الماء الفعالة (أتورفاستatin) أو لأى واحد من المركبات الأضافية التي يحتويها الدواء (انظر للبند 6).
- كنت تعانى من مرض كبد نشط أو عند حوث ارتفاع مستمر في مستوى إنزيمات ناقلة الأمين (transaminase) في الدم.
- كنت حالماً، ظرفتاك اتك حامل، أو خططين الحمل.
- كنت مرضعة.
- كنت تتناول سيكلوسبورين، تيلابريلير (العلاج التهاب الكيد C) أو توقف الأدوية بين انفقوف، ريبتونافير (العلاج فيروس الإيدز).

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

- قبل العلاج ليتورقا، أخير الطبيب إذا: كثت شرب أكثر من كاسين من الكحول في اليوم.
- كثت تعانى من السكري.
- كثت تعانى من مشاكل في الكلى.
- عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد.
- هذا الدواء غير مخصص بشكل عام للأطفال دون جيل 10 سنوات، وللمقيمات اللواتي لم يلقين الدورة الشهرية بعد.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول أثناء العلاج بالدواء لا يجوز شرب أكثر من كاسين من الكحول في اليوم (انظر للبند 2 - تحت بند "قبل العلاج بليتورقا، أخير الطبيب إذا").

الحمل، الإرضاع والخصوبة لا يجوز استعمال الدواء إذا كانت حاملاً، ظرفتاك اتك حامل أو خططين للحمل أو إذا كنت مرضعة. إذا حلت أثناء استعمال الدواء، توقي عن تناوله وتجهي فوراً إلى الطبيب.

الفحوصات والمتابعة

يوصى بإجراء فحص وظائف، الكبد قبل بدء العلاج بليتورقا. قد تكون هناك حاجة لإعادة إجراء هذه الفحوصات خلال العلاج بالدواء. يحتوى هذا الدواء على اللكوتين. إذا أخير الطبيب ينك تعانى من عدم تحمل سكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

3. كافية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تتبعق من الطبيب أو الصيدلى إذا لم تكن متأكداً بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. قبل بدء العلاج بالدواء، يجب محاولة السيطرة على فائض الكوليستيرون يتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

عليك بلع الفرسن كاملاً مع القليل من الماء. يمكن تناول الفرسن في أي ساعة من اليوم، يفضل في ساعه ثانية.

لا يوجد خطر على جهازك الكبد، إلا في حالة اتك اتك لا يوجد خط شطر. لا توجد معلومات بخصوص موضع/سحق الفرسن.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر من اللازم إلى الكبد أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخذت عبوة الدواء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بدأ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى الطبيب أو إلى الطبيب أو إلى الطبيب أو إلى الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة فوراً تذكرك. لا يجوز تناول الجرعة في حال مضى أكثر من 12 ساعة من سيناتين للجرعة على آية حال، لا يوجد تناول جرعة مفرطة.

يجب إعادة العلاج على الحال كما أوصى من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

دوية التي بالدم مع ليتورقا نقل من تركيزه في الدم:

إيفايربيز، ريفامبين (مضاد حيوى)

أدوية التي بالدم مع أتورفاستatin نقل من تركيزه في الدم:

ديوكسيكين (القلب)، حروب من العمل التي تخونى على نوريثينرون وإينثيل إستردابول،

أدوية التي بالدم مع أتورفاستatin تؤثر على عمل هرمونات معينة في الجسم:

كتوكازول، سيربرونا، وسميندين

لا يوجد تناول ليتورقا سوية مع الأدوية التالية: سيكلوسبورين،

تيلابريلير (العلاج التهاب الكيد C) أو توليفة الأدوية تيرافير،

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو من دون وجة طعام.

أثناء العلاج بالمستحضر لا يجوز شرب كميات كبيرة من عصير البريب فروت (أتك من لتر في اليوم).

يجب الحرص على تناول اطعمه منخفضة الكوليستيرون خال

لا يوجد تناول ليتورقا في ظلام! يجب التحقق من الملحق والجرعة في

ارتفاع في مستوى الكرياتينين كياز، ارتفاع في مستوى السكر في الدم أو الصيدلى.

لا يوجد تناول ليتورقا في ظلام! يجب التتحقق من الملحق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء ضد التقارب الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أستنة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلى.

أدوية التي بالدم مع أتورفاستatin تؤثر على عمل هرمونات معينة في الجسم:

كتوكازول، سيربرونا، وسميندين

لا يوجد تناول ليتورقا سوية مع الأدوية التالية: سيكلوسبورين،

تيلابريلير (العلاج التهاب الكيد C) أو توليفة الأدوية تيرافير،

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو من دون وجة طعام.

أثناء العلاج بالمستحضر لا يجوز شرب كميات كبيرة من عصير البريب فروت (أتك من لتر في اليوم).

يجب الحرص على تناول اطعمه منخفضة الكوليستيرون خال

استعمال الدواء.

في العضلات."

مشائل في الكبد مثل: شعر بالتبغ أو الضغط، فقدان النهيف، الالم في الجزء العلوي من البطن، أصبح لون البول داكنًا أكثر (لون عيني)، اصغرار الجلد وباض العينين.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا: كنت تعانى من مشاكل في العضلات مثل الضعف، الحساسية أو الالم، التي يبداً دون سبب واضح، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بسخونة أو إذا شعرت بتعذر أكثر من المتاعن. يختفى أن تكون تلك علامة على مشكلة اصحابات نادرة.

كذلك تعانى من مشاكل في العضلات التي لا تزال حتى بعد أن أوصاك الطبيب بإيقاف تناول الدواء. قد يوجه الطبيب لفصول إضافية لاستيضاح الذي هو سبب المشاكل في العضلات.

أنت تعانى من مشكل في العضلات التي يتسبّب انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة الذي قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع. قد تكون هناك حاجة إلى إللاج فوري.

أنت تعانى من غثيان أو نausea، أنت تعانى من انتفاخ البطن، أنت تعانى من انتفاخ البطن.

أنت تعانى من انتفاخ البطن، أنت تعانى من انتفاخ البطن.

أعراض جانبية شائعة: التهاب الأنف والحنجرة، تبتس، اسهال، الام في الرأس، ارتفاع، ارتفاع في السالك الوريدي، صعوبات في الهضم، غثيان، الام في العضلات والمفاصل، شفاعة العضلات، أرقة وآلام في البطن والحنجرة.

أعراض جانبية إضافية: ارتفاع، تعب، خوف، ارتفاع في الجهاز الهضمي: ازتعاج في البطن، انتفاخ، غازات، التهاب الكبد (hepatitis)، روكد صفاراوي (cholestasis)، حالة يهدى فيها انسداد تدفق الصفار داخل الكبد وقد تؤدى إلى برقان وضرر للكلب.

أعراض في الجهاز الهضلي البولي: الام في العضلات والمفاصل، بالذينية (بما في ذلك طفح، اضطرابات في المفاصل، وتأثيرات على خلايا الم).

تأثيرات في فحوصات الدم - ارتفاع مستوى انزيمات ناقلة الأمين، تغيرات في مستوى إنزيمات الكيماز، ارتفاع في مستوى البوتاسيوم، ارتفاع في مستوى الكرياتينين، تغيرات في مستوى السكر في الدم من أجل التبسيط وتيسير القراءة، تبت صياغة نشرة المعلومات هذه بصياغة المذكرة، بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لأنباء كلا الجنسين.

أعراض في كل دواء، استعمال ليتورقا قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تزعم عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن تظهر عرض جانبى لم يذكر في النشرة، عليك استشارة طبيبك.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في النشرة، عليك استشارة طبيبك.

يمكن الت Billing عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "DIA" على توضيحة لآلام علاج بـ"Topical Pain Relief" (www.health.gov.il) يوجه إلى الاستمارة الإلكترونية للتبلغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

صاحب التسجيل:

دكسل فارما تكنولوجيا م.ض،
شارع دكسل 1، أور عيًّا 3060000، إسرائيل