

# رسالة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة (مستحضرات) - 1986

ريفاستيجمين دكسل 1.5, 3, 4.5, 6 ملغ

## كبسولات

المادة الفعالة:

تحتوي كل كبسولة على ريفاستيجمين (على شكل هيدروجين تارترات) Rivastigmine (as hydrogen tartrate) بجرعة 1.5 ملغ، 3 ملغ، 4.5 ملغ أو 6 ملغ على التوالي.

مواد غير الفعالة ومؤثرات في الدواء - انظر بند 6 "معلومات إضافية".

## 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

علاج مرض بدرجة سبطة حتى متسطوخيمة من الخرف (dementia) من نوع الأذهاب المسمى أيضاً مرض الأذهاب.

لعلاج عراض الخرف لمرض الأذهاب درجة سبطة حتى متسطوخيمة.

ينتمي ريفاستيجمين إلى فصيلة مواد تسمى مثبات كولين استيراز. لدى مرضى الخرف معينة في الدماغ، يؤدي لإخاض مستويات الناقل العصبي استيراز كولين (مادة تسمى بالاتصال بين الخلايا العصبية). ريفاستيجمين يعمل عن طريق حجب الإنزيمات التي تفكك استيراز كولين.

ريفيستيجمين دكسل يحسن بارتفاع نسب استيراز كولين في الدماغ، ويساعد على تقليل أعراض مرض الأذهاب.

ريفيستيجمين دكسل مخصص لعلاج مرض الأذهاب درجة سبطة حتى متسطوخيمة (dementia) الناجم عن مرض الأذهاب أو مرض باركنسون. تموت خلايا عصبية بالاتصال بين الخلايا العصبية. ريفاستيجمين دكسل يحسن بارتفاع نسب استيراز كولين في الدماغ.

ريفيستيجمين دكسل يحسن بارتفاع نسب استيراز كولين في الدماغ، ويساعد على تقليل الأذهاب.

ريفيستيجمين دكسل مخصص لعلاج مرض الأذهاب درجة سبطة حتى متسطوخيمة (dementia) من مرض الأذهاب الذي يؤثر بالتدرج على الذاكرة، القدرة الذهنية وعلى السلوك. يمكن أن يستعمل الكبسولات أيضًا لمعالجة الخرف لدى الكبار المصابين بمرض باركنسون.

## 2. قبل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الرجيم) لل المادة الفعالة (ريفيستيجمين)، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (باركيتسون).

• كان لديك رد فعل جاهي أدت إلى انتصار لصفة ريفاستيجمين الذي انتشر بما يتجاوز حجم المقدار المأهولة.

• ليس معروفاً فيما إذا كان ريفاستيجمين يؤثر في حليب الأم، لذلك لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج بريفيستيجمين دكسل.

• إذا كانت تلك الحالات تتحقق عليك، يجب إعلام الطبيب ولا يجوز أخذ ريفاستيجمين.

## 3. كثرة استعمال الدواء:

قبل العلاج بريفيستيجمين دكسل، أخير الطبيب إذا:

• يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي نقص غير منظم أو نقص بطيء.

• يوجد لديك، أو كانت لديك في الماضي قرحة معوية شديدة.

• يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي صعوبات في التبول.

• يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي احتقانات.

• يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي رو أو مرض تفقيسي شديد.

• يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي حل في وظيفة الكبد.

كنت تعاني من رغفان.

• وزن جسمك مختنق.

• يوجد لديك رد فعل للجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ وإسهال. قد يحصل لديك جفاف (جرا).

• الجرعة الأعلى التي يمكن أخذها هي 6 ملغ مرتبين في اليوم.

فقدان السوائل أكثر من اللازم، في حال إستمرار التقيؤ أو الإسهال.

إذا كانت أخذ تلك الحالات تحشك، فمن الجائز أن يحتج الطبيب لاستعمالك للدواء.

إذا لم تتناول ريفاستيجمين دكسل أكثر من ثلاثة أيام، فلا تتناول المقدار الدوائي التالي حتى تستثير طبيبك.

إذا لم تتناول ريفاستيجمين دكسل لفترة أطول من ثلاثة أيام، فلا تعود تناول الدواء بدون استشارة الطبيب المعالج.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

• أخير الشخص الذي يتعين به بذلك تناول ريفاستيجمين دكسل.

• الحصول على القائمة من الدواء، خذ الدواء كل يوم.

• خذ ريفاستيجمين دكسل مرتبين في اليوم، في الصباح وفي المساء مع الطعام.

طريقة التناول

• مشاكل في نبض القلب مثل: نبض سريع أو بطيء.

• نفف في الأمعاء - بدو على ذلك مد في البازار أو عند التقيؤ.

• لا تقم بفتح الكبسولات ولا تمتصها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى من المطلوب من ريفاستيجمين دكسل، عليك

أن تجرب تناول ريفاستيجمين دكسل بنفس الوقت مع أدوية ذات تأثير مشابه لريفيستيجمين.

ريفيستيجمين قد يعرقل تأثير الأدوية المضادة للغفل الكليني (أدوية تستعمل للتخفيف من تشنجات أو انتفاخات المعدة، المعالجة داء باركنسون أو منع دوار السفر).

لا يجوز تناول ريفاستيجمين دكسل بنفس الوقت مع أدوية ذات تأثير مشابه لريفيستيجمين.

إذا تناولت ريفاستيجمين دكسل بفتح الكبسولات، فالدواء يستعمل للتخفيف من تشنجات أو انتفاخات المعدة، المعالجة داء باركنسون أو منع دوار السفر.

بالخطأ توجه فغاز الغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عورة الدواي معك.

ذلك لأن ريفاستيجمين ومسنواً بعنان، تقتو، أسهال، ارتفاع ضغط الدم وهنباين. من الجائز أن يحدث أيضًا تباين بالتبني وأعماق.

تجفاف (فقدان سوائل كثيرة)

• اضطرابات في الكبد (اصفار الحlad، اصفار بياض العينين، بول داكن بشكل شاذ أو غثيان، تقيؤات، ارهاق وفقدان شهية غير مبررة)

• عدوانية الشعور بแรง راحمة

إذا تناولت ريفاستيجمين دكسل، عليك إنجزه على إجراء عملية جراحية خالى فترة تناول ريفاستيجمين دكسل، لا يجوز تناول

جرعة متساوية للتغيير في العرض المنشية في الوقت المختار. خذ الجرعة التالية في الوقت المختار.

يجب إدخال الدواء على العلاج كما أوصل من قبل الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن في وضعك

دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استخدام ريفاستيجمين دكسل أعراض جانبية لدى جزء من

ال使用者. لا تغدو من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتصاب بأية واحدة منها.

ما تزال الأعراض الجانبية بالتدريج، لأن الجسم سيتعود على الدواء.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

للامساك أو فقدان الوعي.

إذا تناول الدوائي سوية قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

إذا تناولت دose مرتفعة، قد يسبب مشاكل مثل تباين نص القلب (تباطر القلب) التي تؤدي

لإرهاق والإرهاق الشديد، والنفاس المتقطع والتشنجات.

## صاحب التسجيل: دكسل م.ض.

شارع دكسل 1، أور عكفا 3060000، إسرائيل