

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ריבסטיגמין מדבקה דקסל 4.6 מ"ג/24 שעות ריבסטיגמין מדבקה דקסל 9.5 מ"ג/24 שעות

מדבקה טרנסדרמלית למתן דרך העור

כל מדבקה מכילה:

ריבסטיגמין מדבקה דקסל 4.6 מ"ג/24 שעות: מדבקה בגודל של 4.6 ס"מ² למתן דרך העור מכילה 6.9 מ"ג ריבסטיגמין (Rivastigmine). קצב שחרור התרופה הוא: 4.6 מ"ג ב-24 שעות.

ריבסטיגמין מדבקה דקסל 9.5 מ"ג/24 שעות: מדבקה בגודל של 9.2 ס"מ² למתן דרך העור מכילה 13.8 מ"ג ריבסטיגמין (Rivastigmine). קצב שחרור התרופה הוא: 9.5 מ"ג ב-24 שעות.

חומרים בלתי פעילים-ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 'מידע נוסף'.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ליטפול בבעיות זיכרון-שיטיון (דמנציה) קלות עד בינוניות מסוג אלצהיימר.

קבוצה תרופתית: מעכבי האנזים כולינאסטראז (anticholinesterases).

ריבסטיגמין שייך לקבוצת חומרים בשם מעכבי כולינאסטראז. במטופלים עם שיטיון (דמנציה) הנובע ממחלת האלצהיימר, תאי עצב מסוימים במוח מתים, וגורמים לרמות נמוכות של המוליך העצבי (ניורוטרנסמיטור) אצטילכולין (חומר המאפשר לתאי עצב להקשר זה עם זה). ריבסטיגמין פועל על ידי חסימת האנזימים שמפרקים אצטילכולין: אצטילכולינאסטראז ובוטירילכולינאסטראז. על ידי חסימת אנזימים אלה, **ריבסטיגמין מדבקה דקסל** מאפשרת לרמות האצטילכולין במוח לעלות, ומסייעת בהפחתת התסמינים של מחלת האלצהיימר.

ריבסטיגמין מדקסל מיועדת ליטפול בחולים מבוגרים עם דמנציה קלה ובינונית, מחלה מתקדמת (פרוגרסיבית) של הפרעות מוח אשר משפיעה בהדרגה על הזיכרון, היכולת האינטלקטואלית וההתנהגות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (ריבסטיגמין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- הייתה לך אי פעם תגובה אלרגית לסוג דומה של תרופה (גדורות של קרבאמט).
- הייתה לך תגובה עורית אשר התפשטה מעבר לגודל המדבקה, אם הייתה תגובה מקומית חזקה (כגון שלפוחיות, התגברות של דלקת עור, נפיחות) ואם מצב זה לא השתפר תוך 48 שעות לאחר הסרת המדבקה.
- אם מצבים אלה רלוונטיים לגביך, יש לייעד את הרופא ואין להשתמש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל**.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בריבסטיגמין מדבקה דקסל, ספר לרופא אם:

- יש לך, או היה לך בעבר דופק לא סדיר או איטי
- יש לך, או היה לך בעבר כוב קיבה פעיל
- יש לך, או היו לך בעבר קשיים בהטלת שתן
- יש לך, או היו לך בעבר פרקוסים
- יש לך, או היו לך בעבר אסתמה או מחלה נשימתית חמורה
- אתה סובל מרעד
- משקל גופך נמוך
- יש לך תגובות של מערכת העיכול כגון בחילה, הקאה ושלושל.
- אתה עלול להתייבש (קעב איבוד נוזלים רב מדי) אם ההקאה או השלשול מתמשכים
- יש לך תפקוד לקוי של הכבד
- במקרים אלה, ייתכן שהרופא שלך יעקוב אחר מצבך באופן צמוד יותר במהלך הטיפול בתרופה.

אם לא השתמשת ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** למשך יותר משלושה ימים, אל תדביק את המדבקה הבאה מבלי היוועץ ברופא המטפל.

ילדים ומתבגרים

ריבסטיגמין מדבקה דקסל אינה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

תגובות בין תרופתיות: אם אתה לוקח, או לא אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין להשתמש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** באותו הזמן עם תרופות אחרות בעלות השפעה דומה ל**ריבסטיגמין מדבקה דקסל**.
ריבסטיגמין עלול להפריע לתרופות אנטיכולינרגיות אשר חלקן הן תרופות שמשמשות להקלת עוויתות או התכווציות של הקיבה (כגון דיציקלמין), ליטפול במחלת פרקינסון (כגון אמאנטאדין) או למניעת מחלת הנטינה (כגון דיפנהידראמין, סקופולאמין או מקליזין).

אין להשתמש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** באותו זמן עם מנוקולופרמיד (תרופה המשמשת להקלה או למניעת בחילות והקאות). שימוש בשתי התרופות יחד עשוי לגרום לבעיות כגון קישיון גפיים ורעד בדידים.
אם אתה עומד לעבור ניתוח במהלך הטיפול ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל**, יש לדווח לרופא שלך על השימוש בתרופה זו.
שכן **ריבסטיגמין מדבקה דקסל** עשויה להגביר את השפעתם של מופי שרירים מסוימים במהלך הרדמה.
יש לנקוט זהירות בשימוש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** ביחד עם חוסמי-בטא (תרופות כגון אטנולול המשמשות ליטפול בירת לחץ דם, תעוקת חזה ומצבים לבביים אחרים). השימוש בשתי התרופות יחד עשוי לגרום לבעות כגון האטת קצב הלב (ברדיקדיה) שעלולה להוביל לעילפון או איבוד ההכרה.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת היריון, היוועצו עם הרופא שלך או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו. אין מידע לגבי שימוש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** בנשים בהריון. אם את בהריון, יש לשקול את היתרונות של **ריבסטיגמין מדבקה דקסל** לעומת ההשפעות האפשריות על העובר. אין להשתמש ב**ריבסטיגמין דקסל מדבקה** בזמן היריון אלא אם ברור שהשימוש בה הורח.

אין להניק במהלך הטיפול ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל**. לא ידוע אם ריבסטיגמין מופרש בחלב אם.

נהיגה ושימוש במכוונות
הרופא שלך ייעץ לך אם מחלתך מאפשרת לך נהיגה ברכב והפעלת מכוונת בצורה בטוחה. **ריבסטיגמין מדבקה דקסל** עשויה לגרום לעילפון או בלבול חמור.

אם אתה מרגיש תחושת עילפון או בלבול, אין לנהוג ברכב או להפעיל מכוונת. יש להימנע מכל פעילות הממייבת ערנות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להנאות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

התחלת הטיפול והפיקוח על הטיפול ייעשו על ידי רופא המנוסה באבחנה ובטיפול בדמנציה במחלת אלצהיימר. יש לערוך אבחנה לפי הנהיית עכשוויות. בדומה לכל התחלת טיפול במטופלים עם דמנציה, יש להתחיל טיפול בריבסטיגמין רק אם ישנו מטפל זמין למתן וניטור סדירים של הטיפול.

- יש להסיר את המדבקה הקודמת לפני שמדביקים מדבקה אחת חדשה.**
- יש להשתמש רק במדבקה אחת בכל יום.**
- אין לחתוך את המדבקה לחתיכות.**
- בעת ההדבקה יש ללחוץ על המדבקה בחוזקה למשך 30 שניות לפחות בעזרת כף היד.**
- אין לעבור על המנה המומלצת.**
- לישימוש חיצוני בלבד.**

כיצד להתחיל את הטיפול?

הרופא שלך יציין בפניך איזו **ריבסטיגמין מדבקה דקסל** מתאימה ביותר עבורך.

• בדרך כלל מתחילים את הטיפול עם **ריבסטיגמין מדבקה דקסל 4.6 מ"ג/24 שעות**.

המנה היומית הרגילה המומלצת היא של **ריבסטיגמין מדבקה דקסל 9.5 מ"ג/24 שעות**. אם הסבילות טובה, הרופא עשוי להעלות את המינון ל-13.3 מ"ג/24 שעות (לא ניתן להגיע למינון של 13.3 מ"ג/24 שעות באמצעות **ריבסטיגמין מדבקה דקסל**. במצבים בהם יש להשתמש במינון זה, יש להשתמש בתכשירי ריבסטיגמין אחרים, אשר עבורך קיימות מדבקות למתן דרך העור במינון 13.3 מ"ג/24 שעות).

• יש להשתמש רק במדבקה אחת בכל פעם ולהחליף את המדבקה במדבקה חדשה לאחר 24 שעות.

במהלך הטיפול ייתכן שהרופא יתאים את המנה כך שתתאים לצרכיך האישיים.

אם לא השתמשת ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** במשך יותר משלושה ימים, אל תדביק את המדבקה הבאה לפני שתתייעץ עם הרופא שלך.

ניתן לחדש את הטיפול במדבקה באותה מנה, אם הטיפול לא הופסק ליותר משלושה ימים. אחרת, הרופא יחדש את הטיפול ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל 4.6 מ"ג/24 שעות**.

היכן יש להדביק את ריבסטיגמין מדבקה דקסל?

לפני הדבקת **ריבסטיגמין מדבקה דקסל** יש לוודא שהעור: נקי, יבש וולא שיער, נקי מכל אבקה, שמן, מלחלח (קרם לחות) או תחליב העלולים להפריע להיצמדות המדבקה לעור בצורה תקינה, עור ללא חתכים, פריחות/ואו גירויים.

• **יש להסיר בזהירות מדבקה קיימת לפני הדבקת מדבקה חדשה.** אם מודבקות על גופך מספר מדבקות, גופך עלול להיות חשוף לכמות עודפת של התרופה, מצב שעלול להזיז מוסך.

• יש להדביק מדבקה **אחת בלבד** ליום, **באחד** מהאזורים הבאים

- **בלבד** המוצגים באיורים להלן:


- החלק העליון של הזרוע השמאלית או הימנית

- צד שמאל עליון של החזה או צד ימין עליון של החזה (**יש להימנע מהדבקה על השד**)

- צד שמאל עליון של הגב או צד ימין עליון של הגב

- צד שמאל של הגב התחתון או צד ימין של הגב התחתון

כל 24 שעות, יש להסיר את המדבקה הקיימת לפני הדבקת מדבקה חדשה אחת על אחד המוקמות הבאים בלבד:



כאשר אתה מחליף את המדבקה, אתה חייב להסיר את המדבקה של היום הקודם לפני שאתה מדביק את המדבקה החדשה, בכל פעם במקום אחר על העור (למשל על הצד הימני של הגוף ביום אחד ובצד השמאלי ביום הבא, בחלק העליון של הגוף ביום אחד ובחלק התחתון של הגוף ביום הבא).

אין להדביק מדבקה חדשה באותו מקום בעור פעמיים בתוך 14 ימים.

כיצד יש להדביק את ריבסטיגמין מדבקה דקסל?

המדבקה דקה, בצבע חום בהיר ונדבקת לעור. כל מדבקה ארוזה בשקית סגורה המגנה עליה עד שאתה מוכן להדביקה. אין לפתוח את השקית או להוציא את המדבקה אלא רק ממש לפני ההדבקה שלה.

	יש להסיר בזהירות מדבקה קיימת לפני הדבקת מדבקה חדשה.	
	מטופלים המתחילים את הטיפול בפעם הראשונה ומטופלים שמתחילים את הטיפול מחדש אחרי הפסקת הטיפול, יש להתחיל באיור השני.	
	כל מדבקה ארוזה בשקית סגורה המגנה עליה. יש לפתוח את השקית רק כשאתה מוכן להשתמש במדבקה. יש לזרוז את השקית בשני סימוני המספריים, אך לא מעבר לקו המצוין. לפתיחה, קרע את השקית. אין לגזוז לכל אורך השקית, עד מנת להימנע מגרימת נזק למדבקה. הוצא את המדבקה מתוך השקית.	
	הסר את שכבת הכיסוי מהצד העליון של המדבקה שצבעו חום בהיר והשלך את הכיסוי. קיימת שכבה המגנה על הצד הדביק של המדבקה. יש להסיר צד אחד של השכבה המגנה, אין לגעת בחלק הדביק של המדבקה עם האצבעות.	
	יש להניח את הצד הדביק של המדבקה על אזור הגב העליון או התחתון, בחלק העליון של הזרוע או על החזה ואז להסיר את הצד השני של השכבה המגנה.	
	לאחר מכן, יש ללחוץ על המדבקה בחוזקה למשך 30 שניות לפחות בעזרת כף היד כדי לוודא שהקצוות הדוביק כראוי.	

עליך לרוחוץ ידיים עם סבון ומים אחרי הסרת המדבקה. במקרה של מגע עם העיניים או אם מופיע אודם בעיניים לאחר הטיפול במדבקה, יש לשתוף מייד את העיניים עם הרבה מים. במקרה שהתסמינים לא חולפים פנה לייעוץ רפואי.

האם ניתן להשתמש בריבסטיגמין מדבקה דקסל בזמן רחצה, שחייה או בזמן שחייה בשמש?
רחצה באמבטיה, שחייה או מקלחת לא אמורות להשפיע על המדבקה. יש להשגיח כי המדבקה לא תתרופף בזמן פעילויות אלה.

- אין לחשוף את המדבקה לכל מקור חום חיצוני (כגון אור שמש רב, סאונה, תא שיזוף) לתקופות זמן ארוכות.

מה יש לעשות אם המדבקה נופלת?

אם המדבקה נופלת, יש להדביק מדבקה חדשה לשארית היום, ולאחר מכן להחליפה ביום הבא בזמן הקבוע.

מתי ולמשך כמה זמן יש להשתמש בריבסטיגמין מדבקה דקסל?

כדי להפיק תועלת מהתרופה שלך עליך להשתמש במדבקה חדשה כל יום, עדיף להחליף מדבקה באותה השעה בכל יום.

• יש להשתמש רק במדבקה אחת בכל פעם ולהחליף אותה במדבקה חדשה לאחר 24 שעות.

אם השתמשת בטעות בריבסטיגמין מדבקה דקסל יותר מהנדרש

אם בטעות השתמשת ביותר ממדבקה אחת, יש להסיר את כל המדבקות מעורך ולאחר מכן להודיע לרופא המטפל שבטעות השתמשת ביותר ממדבקה אחת.

ייתכן שתדזקק להשגחה רפואית. חלק מהאנשים שבטעות לקחו יותר מדי ריבסטיגמין הרגישו בחילה, הקאה, שלשול, לחץ דם גבוה והזיות. דופק איטי ועילפון גם עלולים לקרות.

אם ילד בטעות הדביק **ריבסטיגמין מדבקה דקסל**, יש לפנות מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה.

אם נסחת להשתמש בריבסטיגמין מדבקה דקסל

אם גילית כי נסחת להשתמש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל**, הדבק מדבקה חדשה מייד. ניתן להשתמש במדבקה הבאה בזמן הרגיל ביום שלמחרת. אין להשתמש בשתי מדבקות יחד כדי לפצות על זו שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם הפסקת להשתמש בריבסטיגמין מדבקה דקסל

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

פנה וספר לרופא או לרוקח אם הפסקת להשתמש במדבקה.

אין ליטול תרופות בחושך! בודק תהויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**ריבסטיגמין מדבקה דקסל** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

שכיחות תופעות לוואי גבוהה: יותר בזמן התחילת הטיפול או כאשר מעלים את מינון התרופה.
במרבית המקרים תופעות הלוואי ייעלמו בהדרגה, שכן הגוף מסתגל לתרופה.

הסר את המדבקה ויידע את הרופא המטפל מייד, אם אתה מרגיש אחת או יותר מתופעות אלו אשר עלולות להיות חמורות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-11 משתמשים מתוך 100):

- איבוד תיאבון
- תחושת סחרחורת
- תחושת נסערות או ישנוניות
- אי שליטה במתן שתן (חוסר יכולת לאצור שתן כיאות)
- תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- בעיות עם פעימות הלב שלך כמו האטה בפעימות הלב
- ראיית דברים שלמעלה לא קיימים (הזיות)
- כיב קיבה
- התייבשות עגולה. השכבה החיצונית בצבע חום בהיר עם הסימון: הפיראקטיביט (רמת פעילות גבוהה, חוסר מנוחה)
- תוקפנות (אגרוסיביות)

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- נפילות

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- ידיים או רגליים נוקשות
- רעד בדידים

תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- תגובה אלרגית במקום ההדבקה של המדבקה, כגון שלפוחיות ועור מודלק
- החמרה בתסמיני מחלת פרקינסון (רטט) – כגון רעד, נוקשות ודשדוש בהליכה
- דלקת בלבלב – התסמינים כוללים כאב חמור בבטן העליונה, לרוב מלווה בבחילות והקאות
- פעימות לב מהירות ולא סדירות
- לחץ דם גבוה
- התקפי פרקוסים
- הפרעות בכבד (עור צהוב, הצהבה של לובן העיניים, שתן כהה באופן לא רגיל או בחילה, הקאה, עיפות ואיבוד תיאבון בלתי מוסברים)
- שינויים בתוצאות הבדיקות המצביעות על רמת תקינות תפקודי הכבד
- תחושת חוסר שקט
- סיוטי לילה

הסר את המדבקה ופנה לרופא שלך מייד, אם אתה חש באחת מתופעות הלוואי לעיל.

תופעות לוואי נוספות שדווחו לגבי ריבסטיגמין כמוסות ועלולות להתרחש עם מדבקות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- עודף רוק
- איבוד תיאבון
- תחושת אי שקט
- הרגשה כללית רעה
- רעד או תחושת בלבול
- הזעת יתר

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

• קצב לב לא סדיר (כגון קצב לב מהיר)

- קשיי שינה
- נפילות מקריות

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- התקפי פרקוסים
- כיב במעי

• כאב בחזה שעלול לנבוע מעווית בלב

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- לחץ דם גבוה
- דלקת של הבלבל – התסמינים כוללים כאב חמור בבטן העליונה, לרוב מלווה בבחילות והקאות
- דימום במערכת העיכול – צואה דמית או קיא דמי
- ראייה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- חלק מהמטופלים שסבלו מהקאות חמורות סבלו מקרע בצינור הוושט שמחבר בין הפה לקיבה

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס ההקאות.
תופעות לוואי, או על ידי כינוס הקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- תנאי אחסון:** אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-C°25. אחסן באריזה המקורית.
- שמור על המדבקה בתוך השקית שלה עד שתשתמש בה.
- אין להשתמש במדבקה אם היא פגומה או אם יש סימנים של פתיחת האריזה.

- לאחר הסרת המדבקה, קפל אותה לשניים כשהצדדים הדביקים מופנים כלפי פנים, יש ללחוץ ולהדקם יחד. החזר את המדבקה המשמשת לשקית שלה והשלך אותה כך שילדים לא יוכלו לגעת בה. אין לגעת בעיניים באצבעותיך, יש לטטוף את הידיים בסבון ומים אחרי הסרת המדבקה. יש אלא הרוקח כיצד לפנות מדבקות משומשות או כאלו שאינן בהן צורך. מדבקות משומשות רצוי לפנותן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Polyester film, fluoropolymer-coated, polyethylene/thermoplastic resin/aluminum coated polyester film, poly [(2-ethylhexyl)acrylate, vinylacetate), high molecular weight polyisobutene, paraffin light liquid, medium molecular weight polyisobutene, silica colloidal anhydrous, orange printing color.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

מדבקה עגולה. השכבה החיצונית בצבע חום בהיר עם הסימון:

h" 4.6 mg/24 "RIV-TDS 4.6 mg/24 h" עבור **ריבסטיגמין מדבקה דקסל**

4.6 מ"ג/24 שעות

h" 9.5 mg/24 "RIV-TDS 9.5 mg/24 h" עבור **ריבסטיגמין מדבקה דקסל**

9.5 מ"ג/24 שעות

כל מדבקה ארוזה בשקית סגורה. כל אריזה מכילה 30 שקיות.

שם היצרן וכתובתו: לוייה פארמה א.ג., מיסבאך, גרמניה